



3 1761 07550694 9

RJ
390
R33
1881

پردہ کو چیر دین۔ یا کے۔ پنولا۔ اور ٹرو۔ کارسی او سکو چہید دینی سی ہی اگر رکھیں۔
 انٹری قریب ہی تو براز نخل پڑیکا جب انین سی کوی ہی ترکیب کارگر نہیں ہوتی ہی
 تب اور مقام سی سوراخ کو کے پاخانہ کا رستہ کرنا پڑتا ہے جسکی دو ترکیبین میں ایک
 جو بنام ڈاکٹر۔ ۱۔ میو۔ سٹ کی مشہور ہوئی اور دوسری بنام ڈاکٹر لیٹر کی معروف ہے
 پہلی ترکیب میں ایسا کرتے ہیں کہ کو او۔ ری۔ ٹس۔ لمبو۔ رم۔ مسل۔ کی باہر کی
 جانب پر ایک سوراخ کر دیتی ہیں جتنی براز ہمیشہ نکلتا رہتا ہے اور دوسری میں
 بائیں جڈی میں کو لون انٹری کی نیچر کی جانب ایک سوراخ کرتی ہیں۔ ان لون
 میں سی بھی ترکیب بہتر ہے اگرچہ اس میں پردہ۔ پی۔ ری۔ ٹو۔ ٹیم۔ کو شق کرنا
 پڑتا ہے جو بات پہلی میں نہیں ہوتی۔ یہ عمل اسطور پر کیا جاتا ہے کہ۔ پو۔ پارٹس
 لی۔ گی۔ منٹ سکی قریب ایک پنچ اوپر اور او سکی لبناسی سی ایک ٹخاف قریب
 ڈٹائی پنچ لبنا کر کے خفایت احتیاط سی مسلوں کی اندر چیرتی جاوین۔ جب تک پی۔ ری۔
 نظرائی دیوی اور وقت بھری ہوئی انٹری ہی پردہ کے اندر سی دیکھلائی دیگی
 تب اس پر کو خفایت ہو شیار سی چیر ڈالیں۔ بعد ازاں انٹر کو بکڑ کر زخم
 کے کناروں سے بذریعہ ٹانگوں کے اتناھی اٹکاویں۔ جتنا بڑا سوراخ کرنا منظور
 ہو۔ جب یہ ہو چکے تب ایک چہر میسی انٹری کو چیر ڈالیں۔ اس سوراخ سی براز نخل
 پڑے گا۔ وٹا پر ہمیشہ ایک گدی باندھ رکھیں۔ تاکہ انٹری سی میل ہمیشہ نہ نکلتا رہی
 اور اس مقام کو خفایت صاف رکھیں۔ اگر سچہ جیٹا رہا تو جراح کو بہتری ترکیبین
 ایسی سوچہ جائیں گی کہ جسی بدبو اور ہمیشہ براز نکلیں کی تکلیف سی سچہ بری رہے گا
 رفتہ رفتہ انٹری کا سوراخ مثل سفنگٹر مسل کے ہو جاتا ہے + فقط

کتبہ لام مصطفیٰ خوشنویس غفرلہ

اس ترکیب سے بھی نہ نکلے نوکان کے اندر رہنے دین سب بڑ کر اب بھی نکل آویں گی *

۱۲۔ بند پیدا ہونا مقعد کے سوراخ کا

یہ ایک نقص تولیدی ہے جس کے کئی اقسام ہیں جنہیں اول انٹری۔ سیگ۔ فائید فلکسٹر۔ تک پیدا ہو کر آخر ہو جاویں اور ریگٹم بالکل پیدا ہی نہ ہو + یا دوم۔ ریگٹم انٹری پیدا ہو مگر سکر م ہڈی کی کسی مقام تک آکر آخر ہو جاویں۔ ان دونوں صورتوں میں مقعد کی سوراخ اور انٹری کی مابین۔ سی۔ لیو۔ لر۔ ٹی۔ شیو۔ بہرہوا ہوتا ہے سیوم ریگٹم انٹری مقعد تک آ جاویں مگر مقعد کا سوراخ پیدا نہ ہو چارم۔ ریگٹم انٹری مثانہ نائیزو یا فوج کی اندر آکر آخر ہو جاویں اس صورت میں مقعد بند رہتا ہے۔ پیدائش کے بعد ہی نقص معلوم نہیں ہوتا بلکہ جو بیس گھنٹہ بعد جب بچہ کو پاخانہ نہیں آتا ہی تب بچہ کی والدہ کے توجہ اس طرف ہوتی ہے اور اس وقت جراح کی صلاح لی جاتی ہے اور ان صورتوں میں کہ جب مقعد کا سوراخ بالکل نہیں ہوتا تو دیکھیں کہ ریگٹم انٹری کسی اور مقام میں نہ کہلی ہو جنہیں دیکھیں کہ پشیا ب سی براز کی بو آتی ہے یا نہیں یا اگر لڑکی ہو تو اس کی اندام نہانی کی اندر فضلہ ہے یا نہیں۔ یہ حالات اکثر لا علاج ہوتی ہیں۔ لیکن ٹائٹلر صورت میں کہ جب مقعد کا سوراخ نہیں ہوتا اور ریگٹم انٹری نیچے آکر آخر ہوتی ہے تب البتہ عمل جراحی سے قوی امید فائدہ کی ہوتی ہے۔ تشخیص اس کی یہ ہے کہ بچہ کو جب پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے تب مقعد کا مقام بھول جاتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقعد کی ج مین ایک گہرا داغ بھی موجود رہتا ہے ایک جو بہا بخا شکاف اس مقام پر کہ نیسی براز نکل آتا ہی تب ہفتوں یا مہینوں تک مقعد کی اندر دھنیں دو دفعہ۔ بو۔ جی۔ داخل کرنا چاہیے اور مقدار اس بوجی کی تدریج بڑھانی چاہی۔ لیکن جب مقعد کے مقام پر سوراخ ہی تو اور تب بھی پاخانہ نہ آویں تو اس حالت میں اس عمل کے مفید ہونے میں شک ہے اس وقت ایسا کرنا چاہیے کہ سوراخ کے اندر ایک چھوٹا اسپری۔ کیو لم۔ داخل کر کے بذریعہ بٹری کے

علاج کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب بچہ کو اتنی تکلیف ہو کہ بڑھتا جاوے + علاج اس مرض کا کئی طور پر کرتے ہیں مثلاً اگر نیوس تنگتا ہو۔ یا لپایعورت کو اندام نہانی کی لبو بڑھو یا دس قسم کا ہو کہ جسمین زیادہ خون نکلیں گا اندیشہ ہو تو اسکو کاٹ ڈالنا چاہیے۔ بعض دفعہ گدھی باندھ کر دبا دیتی ہیں مہینوں کی تکلیف میں رفع ہو جاتا ہے اور کبھی کاٹک دو مثلاً ٹائٹریٹ اف سلور یا آئیوڈین بھی لگا یا کرتے ہیں بعض دفعہ نیوس کو اندر پر کلورائیڈ اف ایرن کی پکاری کرتے ہیں جسکی ترکیب یہ ہے کہ پہلے ایک دو دناری چیری لیکر نیوس کو اندر داخل کریں تباہ اسکو چاروں طرف پھیر کر ریشونکو کاٹ دیں بعد ازاں ایک چھوٹی سی پکاری میں جا یا پانچ قطر کلورائیڈ اف ایرن کی لیکر داخل کریں اس ترکیب سے خون جم جاتا اور ٹیوم سخت ہو جاتا ہے تب بتدریج حل ہو کر مفعود ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ نیوس کو ریشم سے باندھ کر دیتی ہیں

4۔ ٹڈی کا ٹوٹ جانا

اصطلاح میں اسکو فریکچر بولتے ہیں۔ بچہ کی ٹڈی مثل جو انوکھی ٹوٹ کر دو ٹکڑی نہیں ہو جاتی بلکہ نرم کھار آدھی چنچ جاتی ہے اور آدھی بل کہا جاتی ہے۔ علاج اسکا معمولی طور پر کریں اور اسپلنٹ کوٹیا میں ہفتہ باندھ کر کہیں مگر چٹری یا موٹی کاغذ کا اسپلنٹ بہ نسبت لکڑی کو

۱۰۔ ٹڈی کو چوڑا کرنا

اصطلاح میں اسکو ڈیسلوکیشن بولتے ہیں۔ بچہ کا چوڑا کم اکڑا کر تباہ اور جب اکڑتا تو کوہنی کا چوڑا زیادہ اکڑتا ہے علاج بچہ کو کلورافارم سنگھا کر چوڑا کو ٹیبلٹ دین

۱۱۔ کانچو اندر کسی چیز کا کہس جانا

بچہ کو اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ جس چیز سے کہلتی ہیں اسکو کانچو اندر بہر لیتی ہیں مثل کوئی بیج یا کنکر یا مشر وغیرہ علاج اسکا اس طور پر کریں کہ پہلے کانچو کو خوب طح دیکھ کر اگر ممکن ہو تو اس چیز کو ایک چھوٹی فارسیس یا ڈائی۔ رکڑ کر چھچھو سی نکال لیں اور اگر اس ترکیب سے تھ نہ لگی تو پکاری کریں کہ جیسو وہ ڈھیلی ہو کر نکل آوے گی اور جو

انٹری باہر نکل آتی ہے علاج قسم اول یعنی خفیف کا علاج ہلکی ٹینٹات سو کرین مثلاً روہرب سوڈا اور کلینا کا استعمال کرین اور صابون اور بائینو آب دست کرادین۔ دوسرے قسم کی بیماری کا علاج بھی اسی طور پر کر سکتے ہیں مگر اس صورت میں جب دلوں کی بعد مقویات مثلاً فولادیا کو مین کا استعمال کرنا چاہیے۔ قبل از داخل کرنا انٹری کو مقویات قابض مثلاً زنگ بھگری وغیرہ سو دھوڈالین۔ تیسرے قسم کی بیماری کو اسٹرکینیا سی فائیدہ ہوتا ہے مثلاً چار سال کے بچے کو مین دو یا تین دفعہ ایک گرین کا ساٹھواں حصہ (۱/۶) دی سکتے ہیں اور نکلے ہوئی انٹری پر ہر روز خشک نائٹریٹ آف سلور لگا کر مین سے روک دینا ہوتا۔ اگر ممکن ہو تو تبدیلی آب و ہوا کرادین۔ ایک گدی جسکی بیچ میں سورخا ہو یا خانہ کی مقام پر باندھ رکھیں۔ اگر اس علاج سے فائدہ نہ ہو تو چند ہیل ٹیٹری میوکس مبرین اور جبرٹی کی ترشاش کر ہیک دین مگر بچہ نہیں اس علاج کو کرنا چاہیے کیونکہ مین بلوغت میں معتدلی سورخا کو تنگ ہو جائیگا اندیشہ ہے۔

۸۔ فی۔ وس

یہ جو فی ٹیوس مختلف شکل اور مقدار کو ہوتی ہیں اور مختلف مقامات جسم پر پیدا ہوتے ہیں ہر اکثر سینہ شکم یا اطراف کی نبت سر اور گلی پر زیادہ تر پیدا ہوتی ہیں بعض دفعہ ہیک سینہ ٹیوس ہوتی ہیں کہ کسی ماتہ یا پاؤں کو ساری پر پھیل جاتی ہیں یا جسم کے قریب آدھون آدھون چھا جاتی ہیں اور بعض دفعہ صرف ایک سر سون برابر ہوا کرتی ہیں اور ساری عمر تک معتدل کرتی ہیں اور کبھی بیا بھی ہوتا ہے کہ جون جون عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے یہ بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ ٹیوس اکثر اسطور پر شروع ہوتا ہے کہ جب بچہ کی عمر قریب ہینہ کی ہوتی ہے تب ایک نقطہ اودا یا نیوٹنگ کا پیدا ہوتا ہے اور اکثر جون جون بچہ کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے یہ بھی تیرج بڑھتا جاتا ہے اور اس میں خون کی رگیں بھی پیدا ہونی لگتی ہیں جب نیوس جلد پر ہوتا ہے بقوت رنگ نکاحا خوب سرخ ہوتا ہے جب جلد کی بچی پیدا ہوتا ہے تب خفیف نیوٹنگ ہوتا ہے انہیں درد نہیں ہوتا علاج یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ ہر حالت میں نیوس کا علاج کیا جائے صرف یہ

وہ غذا کو۔ استہ میں پنس جاتا ہی اسے لعین اگر علاج فوراً کیا جاوی تو سچہ دم بند ہو کر مر
جاتا ہی۔ علاج اسکا اسطورہ یہ کہ رین کہ اپنی انگلی کو حلق کو اندر خوب نیچو داخل کریں اگر وہ
شتر محسوس ہو تو اسکو انگلی سے نکالو کی کو کشش کریں اگر ریز کسب ہو نہ نکلی تو حلق کو اندر ایک
پہر و بنگ کو داخل کر کو اسکو معده کو اندر ٹھیل دیں +

۷۔ کاپنج نکلتا

اصطلاح میں اس مرض کو۔ پیرولپ۔ سس۔ انا می۔ بولتی ہیں۔ جب یہ بیماری خفیف
ہوتی ہے تب ریکٹم انٹریکٹا صرف۔ میوکس۔ ممبرین ہی باہر نکلتا ہی مگر جب شدید ہوتی ہے
تب بہت ساحہ یا وہ ساری انٹری باہر نکل پڑتی ہے **علامات** پہلی علامات اکیلی
ہیں کہ سچہ بہت دیر تک پاخانہ میں بیہار رہتا ہی اگر وجہ اسکی پوچھی جاوی تو کہتا ہی کہ میں نے
اتیک فراغت نہیں پائی۔ اسوقت اگر پاخانہ کی جگہ کو دیکھا جاوی تو تھوڑی سی ریکٹم
انٹری باہر نکلی ہوئی نظر آوی گی۔ مگر یا تو یہ فوراً خود اندر چلی جاتی ہے یا باسانی
اندر کر دی جاسکتی ہے۔ یہی حالت مفتون یا مہینونک رہ سکتی ہے اور سچہ کو تھوڑی بہت
سوزش یا پچھن ہوتی ہے یا بعض فضا مثانہ میں ہی خراش پیدا ہوتی ہے اگر سچہ کو طاقت
آجاوی یا بواسٹ اس مرض کے رفع ہو جاوے تو یہ بیماری ہی بالکل دفع ہو جاتی ہے۔
لیکن جب یہ بیماری شدید ہوتی ہے تب انٹری نکور کا میوکس ممبرین دو یا تین انچ ہر سچہ
بعد نکل پڑتا ہی اسوقت اسکو اندر داخل کر نیکی لہو یا تو عقلند کہلائی یا جراح کی ضرورت
پڑتی ہے بیماری کو اس قسم میں اگر انٹری اندر داخل کی جاوی تو اس میں بہانسی لگ جاتی ہے
اور تب علامات خوفناک پیدا ہوتی ہیں۔ مٹیری قسم اس بیماری کو وہ ہے کہ صید انٹری ہمیشہ
نکلی ہی رہتی ہے چنانچہ جب اسکو اندر کر دیا جاتا ہی تو وہ فوراً پھر باہر نکل پڑتی ہے اسباب جب
انٹریوں میں کوئی شتر فاسد یا کرم ہوتا ہی یا مثانہ کو اندر جب تھری ہوتی ہے تب یہ بیماری
پیدا ہوتی ہے اور یہ مرض کمزور سچہ کو اکثر ہو جاتا ہی کہ انٹری روتی یا کو تھنوں کے وقت

وہ موزا کم ہو جاتی ہیں اور تب خفیف علامتیں شروع ہوتی ہیں وجہ اس اختلاف کی
یہ ہے کہ کبھی تو وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے اور کبھی بڑی اور کبھی تو خلق یا ٹری کیا
کر اندر ڈھیلی بڑی رہتی ہے۔ اور کبھی دھنوی بڑا نکس میں جا کر نہیں جاتی ہی +
یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ جن بچوں کی ہوا کی نالی کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی ہو
اور وہ لیٹنا چاہتا ہے تو ہمیشہ دھنوی ہی کر دٹ پر لیٹا ہے۔ یہ واردات اوس وقت
ہوتی ہے کہ جب بچہ زور سے دم کھینچتا ہے اور بچہ دگھس جانا اوس چیز کے شدت سے
کہاںسی ہوتی ہے اوس وقت بچہ اگر خوش قسمت ہو تو اسی کہاںسی کو ذریعہ وہ چیز
نکل آتی ہے۔ لیکن جب وہ اندر چلی جاتی ہے تو اکثر نہیں ہی جاتی ہے تب دم
لیٹو میں نہایت تکلیف ہوتی ہے اور بار بار کہاںسی اٹھتی ہے اور ہوا کی نالیوں کی سبب
پیدا ہونے بلغم کے خراٹے کی آواز آتی ہے اور اوس وقت بچہ کو کمال تکلیف ہوتی ہے۔ چہرہ
فکرمند اور نیلگون مبض کمزور اور اطراف سرد ہو جاتی ہیں اور بچہ قریب المرگ جاتا
ہے یہ ساری علامتیں رفع ہو جاسکتی ہیں اور بچہ بالکل تندرست بھی معلوم ہو سکتا
مگر یہ قدر بچہ میں رہتا ہی اور بعض دفعہ ایسا کہتا ہے کہ میری خلق کے اندر کوئی شے اور بچہ
جاتی ہے اور پرہیز کر رہتی ہے۔ لیکن یہ خفیف علامتوں کو ہٹا دینا ہی عرصہ تک رہتی ہے
کیونکہ وہ چیز بچہ چھوٹی نالیوں میں چلی جاتی ہے تب بچہ کو یا تو برا نکا بیٹس نیو۔ مونی یا
بعض دفعہ سل کی بیماری بھی ہو جاسکتی ہے۔ پس یاد رہے کہ جب کوئی غیر شے بچہ
کے اندر رہتی ہے تب کبھی نہ کبھی وہ ضرور مہلک ہو جاتی ہے۔ علاج اسکا اور کچھ
نہیں ہی سوای اسکو ٹر کیا کو چیر کر اوس چیز کو نکال ڈالیں +

۶ کسی چیز کا خلق یا ایسا۔ فی گیس

یعنی مری گیس جانا

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی بڑا لقمہ گوشت یا کسی اور چیز کا جلدی سے نکل جاتا ہو اور

جب اوس بن کو نکالا جاتا ہو تو اون مقاموں پر آئیں جو سامنے دو داغ رہ جاتے ہیں جو
چہرہ بد شکل نظر آتا ہے۔ پس بہتر ترکیب یہ ہے کہ سوچو نہ کہ کسی زخم کی لبوں کو جوڑ
دین۔ سوئین کو پنج سو داخل کریں۔ تاکہ ٹانگوں کی پنج سو اوپر کی طرف پہنچی جاوے
ہر ایک ٹانگوں کو آدھی آدھی پنج تفاوت پر ہونا چاہئے اور ہر بار سوئین کو داخل
کریں کہ وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ لب کا بہت سا حصہ ٹانگوں میں آ جاوے ورنہ
جوڑا جہانہ بیٹھو گا۔ اگر لب کی دو نو طرف شکاف ہوں تو اسی عمل کو اسی وقت
دو نو طرف کر دیں۔ اگر ساتھ ہونٹہ کے تالو کی ہڈی میں بھی شکاف ہو تو ہونٹہ کے
شکاف کو جس وقت بچہ نہایت ننھا ہو۔ فوراً جوڑ دیں اسی یقین ہے کہ تالو کی ملائم
ہڈی از خود جوڑ جائیگی۔ اگر دیکھیں کہ پہلے عمل میں شکاف نہ جوڑا جوے تب ٹانگوں کو
یا تو چند ہی اور بھی رہی دیں یا اونکی عوض اور ٹانگوں لگا دیں +

۴۔ ٹنگ۔ ٹامی

یہ مرض ہے جس میں زبان کی نوک میو کس ممبرن کو ایک باریک لیشہ سے پنجویں
طرف بند ہی رہتی ہے۔ اسلئے بچہ پنجویں دودہ نہیں پے سکتا۔ بچہ کی مالو استیثا کو
بڑا خیال ہوتا ہے۔ مگر یہ بیماری بہت کم ہوتی ہے۔ شاید اسکا اگر شبہ ہو تو ایک کام پرن
کہ بچہ کو تاڑ تو رہیں کہ وہ اپنی زبان کو لبوں کو باہر نکال سکتا ہے یا نہیں اگر نکال سکتا ہے
تو علاج کی کچھ ضرورت نہیں ورنہ ایک ہونٹہ کی نوک کی قینچی سے اوس بندہن کو اوپر
پنجویں طرف کاٹ دیں اوپر زبان کی طرف ہنہن بعد ازاں زبان کو پیچھو کی طرف
پھیل دیں تاکہ وہ بندہن پنجویں جڑ جاوے +

۵۔ کسی جنیر کا ہونے کی نالی کو اندر گھسنانا

کسی چیز کا ٹریکیا۔ یا لارنکس۔ کو اندر گھسنانا ایک بڑی خوفناک بات ہے اور اسکی تشخیص
بھی نہایت مشکل، کیونکہ اسکو ابتدائے میں تو علامتیں شدید ہوتی ہیں لیکن بعض دفعہ

تو دوسری سال کی عمر میں کر دین +

عمل اگر ایک طرف کا ہونہ کٹا ہوتا۔ پہلے بچہ کو کلو فارم سنگھار بہوش کر دین بعد
ایک ایک شخص کو اس کا سر کٹ کر کہیں اور ایک یا دو کٹی ہوئی ہونہ کو بکڑی کے لئی موجود ہیں
تاکہ کو۔ رو۔ نہی۔ ارٹری۔ سی خون نکلنے نہ پادی در کہنا چاہو کہ ارٹری مذکور
لب کی میوکس ممبرین کے نیچے ہی ہوتا ہے اور جلد کی نیچے نہیں جب یہ سارا بند ہوتا
ہو چکے تب لب کو بذریعہ چہری کے سوڑون سی آدھی انچ تک علیحدہ کر دین۔
بعد ازاں شگاف کے ایک کنارے کو ارٹری۔ فارسیس۔ سی پکڑ کر ایک تیز
لوک کی چہری کو شگاف کے اوپر کی گوشہ میں داخل کر کے لب کی گوشت بٹ
اور میوکس ممبرین کو کاٹتی ہوئی نیچے کی طرف چلاؤ بن اور جب شگاف کی نیچے کے
کنارے کے پاس آجاؤ بن۔ تب چہری کو کسی قدر شگاف کی طرف موڑ کر تراشیدہ
کٹری گوشت کو علیحدہ کر دین۔ تراشتی وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ
شگاف کی کنارے جقدر موٹی ہوں اوسقدر گوشت اتر آوی اگر موٹا ہی سی گوشت
کم اترے گا تو جوڑ اچھا نہیں بیٹھے گا۔ اب ایک شخص کو فوراً اوس لب کو بکڑنا
چاہئے تاکہ کارو۔ نہی۔ ارٹری سی خون بہو نہ پاوے۔ جب شگاف کا ایک
کنارا کٹ جاوے تب اوسیلو۔ پر دوسرا کنارہ بھی تراش دین اور دوسرا شخص
اوس کٹی ہوئی کنارے کو فوراً پکڑ لے تاکہ خون بہو نہ پاوے۔ اب دونوں کٹی
ہوئی کنارے ونگوٹانی میں بڑی استادی چاہے تاکہ کنارے ٹھیک مل جاوین
یہ بات دو تہہ کیب سی ہو سکتی ہے ایک تو پن کو وسیلہ سی اور دوم۔ ان۔
ٹی۔ رپ۔ ٹڈ۔ سوچو کہ ذریعہ۔ جراحان حاذق فی اگلی ترکیب کو بالکل ترک
کر دیا ہے وہی کہتی ہیں کہ جب یہ زخم پیون کی ذریعہ۔ جوڑا جاتے۔ تب جس
مقام سی پن داخل ہوتی ہے اور جہاں وہ پہوٹ کر نکلتی ہے بعد جڑ جانی زخم کے

توانی ناک یا کان کر اندر او کو ڈال دیتی ہیں۔ والدہ یا دای کو اس بات کی خبر بھی نہیں
 ہوتی کیونکہ جب تک ناک سوچ نہ جاوی یا اس میں درد نہ ہو تب تک بچہ اسکی شکایت نہیں کرتا۔
 چند روز بعد یہی علامتیں مفقود ہو جاتی ہیں اور تب ناک سے صرف ایک رطوبت بہتی رہتی
 ہے اور یہ بات مفتون یا مہنون یا برسوں تک بلا معلوم ہوئی اسکی سبب کی جاری رہ سکتی
 ہے۔ **علاج** چونٹی یا ڈاکٹر کی چھچھ سے اس چیز کو نکال لیں یا ناک کر اندر صرف
 بچکاری کریں۔ استی ہی وہ نکل آتی ہے۔ اگر ناک کا پردہ بہت سوچ گیا ہو تو چند روز
 توقف کریں تاکہ ورم رفع ہو جاوی۔

۲۔ نکسیر۔

اس مرض کو اصطلاح میں۔ ایس۔ ٹیک۔ سنس۔ بولتی ہیں۔ ادنی سبب بھی بچوں کے
 ناک سے خون ٹپکتا ہے۔ مثلاً خفیف صدمہ یا بعض دفعہ بلا کسی صدمہ کے بھی خون ازخود
 بہنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ یہ بیماری موروثی ہوتی ہے۔ **علاج** کسی علاج سے یہ خون
 اکثر نہیں رکنا۔ ناک پر سرد پانی رکھیں معمولی خون بند کر نیوالی دوا لگا دیں۔

۳۔ پیار۔ لب۔

اردو میں اس بیماری کو ہونٹہ کٹا بولتی ہیں۔ ٹیہہ ایک نقص تولیدی ہے جسم میں بچہ کا
 ہونٹہ پیدائش ہی سے کٹا ہوتا ہے اور اسکی اقسام کئی ہیں چنانچہ کبھی تو صرف ایک طرف
 شگاف ہوتا ہے اور کبھی دو طرف کا ہونٹہ کٹا ہوتا ہے اور یہ کہ بعض دفعہ
 تو صرف ہونٹہ ہی کٹا ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ شگاف تالو کی ٹہی کی بجائے
 بھی پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات لب کا شگاف نہتو نگو بھی شامل کر لیتا ہے۔
 اسوقت نہتہ پیل جاتی ہیں۔ اور چہرہ بد وضع ہو جاتا ہے۔ مثل اور نقص تولید
 کو اکثر خاندان میں یہ بھی موروثی ہوتا ہے۔ **علاج** اسکا عمل جراحی سے کرتے ہیں
 اور وہ عمل نہتہ بچہ کرنا بہتر ہے۔ نسبت زیادہ عمر کے اگر والدین اس بات پر رضی ہو

اف لڈ لیکر ایک آنوس جربی مین ملالین۔ اس مریم کو صبح شام لگا دین اور ہر دفع بعد
اٹھانی ٹپی کر سر کو اگلی طور پر کار بونٹ اف پوٹاش کے عرق سے دھو ڈالین، اگر دیکھیں
کہ اس مریم سے کسی قدر انفلامیشن پیدا ہوا ہے۔ تو اسکو چند روز کر کے نہ لگا دین مگر سر کو
کار بونٹ اف پوٹاش کے عرق سے دن میں تین یا چار دفعہ دھوا کرین جب یہ پہلی
دفعہ کا انفلامیشن رفع ہو جاتا ہے۔ تو پھر نین لوٹتا اگرچہ مریم مذکور کو مہینہ تک
لگا ہی جاوین۔ بعد پندرہ دن کی مقدار آئیوڈائیڈ اف لڈ کی ٹیٹا دین۔ اور اگر
بیاری پر ظاہر ہو تو مقدار کو دو فی کر دین۔ جب تک مرض رفع نہ ہو گا پھر چہرے سر کو
برابر ڈا پی رکھیں۔ جب اس علاج کو تین مہینہ یا ایک مہینہ ہو جاوے تب خارجی دوا لگا
لگانا موقوف کر دین۔ اور بالونکو ٹیٹا دین تاکہ دیکھا جاوے کہ یہ مرض پھر ظاہر ہوتا
یا نہیں۔ اگر ظاہر ہو ٹیٹا تو پھر اون دو کو لگا دین اور آئیوڈائیڈ اف لڈ کا استعما
تتک جاری رکھیں جب تک اس بات کا اطمینان نہوے کہ مرض بالکل رفع ہو گیا ہے
غذا بیا کی ملکی ہونی چاہیے مثلاً دودھ ساگو دانہ اراروٹ چاول کچری اور اگر ضرورت
ہو تو تخمین جلاب سے تخمین کرین + فقط

حصہ چہارم

امراض متعلقہ جراح

آ۔ کسی چیز کا ناک اندر گھسن جانا +

اکثر بچوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ جب وہی بیجون یا چوٹے چوٹے کنکروں سے کھیتی ہیں

اور جب ان دوا کو خشک دینا منظور ہو تو اس نسخہ کا استعمال کریں +

لکسنہ آئیوڈائیڈ اف ارسنک + ۱۔ گرین + سخت شیر خشت + ۶۔ گرین +

میو سلج حسب ضرورت + سبکو ملا کر ۱۲ گولیوں میں تقسیم کریں۔ اور اوسکی ایک گولی

دو تین تین دفعہ کہلا دیں یہ نسخہ ۱۰ سال کے لڑکے کو موزوں ہے یہ نسخہ بہت مجرب

ہے اگر اسکے پانچ چھ ہفتوں کو استعمال ہو در دہر اور منہ اور علق خشک ہو جاوی

تو چند روز موقوف کر کے پھر شروع کریں۔ ان دوا کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں

ایک عرصہ دراز تک کہلا نا چاہی اور انکی خوراک کو تبدیل کرنا نا چاہی اور جب چاہی

بالکل رفع ہو جاوی تب بھی چند روز تک انکو جاری رکھنا چاہی۔ اگر بچہ کا مزاج ہلکا

افیوس ہو تو آئیوڈائیڈ اف ارسنک کو ہمراہ کاڈلیور آئیل کے دینا چاہی اور اگر کسی

سبب سے شکایا ناموافق پڑے تو صرف آئیوڈین کو مقدار بارہویں حصہ ایک گرین

کو ہمراہ کاڈلیور آئیل کے پلا دیں دوم علاج خاہر جس کو بالو کو چٹوادیں سر

کی منڈوانی کی کچھ ضرورت نہیں بعد ازاں سر پر ایک بڑی سی تیشی کر پولٹس بارہ

گھنٹہ تک باندھ رکھیں تاکہ کھرنڈ ملائم ہو جاویں اگر ضرورت ہو تو دو یا تین مرتبہ اس

پولٹس کو باندھیں فوراً بعد اٹھا لینی پولٹس کے سر کو کاربونٹ اف پوٹاش کو عرق سی

لنٹ سی آمستہ مل ملکر دھوین (ایک ہائینٹ ڈیٹلمڈ وائٹر مین ایک ڈرام کاربونٹ

اف پوٹاش کافی ہے) بعد ازاں کاربونٹ اف پوٹاش کا مرہم مل دیں۔ چنانچہ

جزبی ایک آنوس + گلائی سیرین ایک ڈرام + کاربونٹ اف پوٹاش ایک ڈرام +

سبکو ملا کر لنٹ پر بچا کر لگا دیں اور اس ٹپی کو گٹا پرچہ یا موم جامہ سی ڈمانب

دیں۔ اس ٹپی کو دن میں دو دفعہ بدلنا چاہی۔ اس علاج سے دو یا تین دن کے

اندر سارا کھرنڈ صاف ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات ہو جاوی۔ تب کاربونٹ اف پوٹاش

کو عوض آئیوڈائیڈ اف لڈکی مرہم کا استعمال کریں چنانچہ آدھا ڈرام آئیوڈائیڈ

اکثر چھ یا ساتویں سال کی عمر میں بچہ نکوستا ہوا اور اس بیماری کی چھوت بہت جلد لگ جاتی ہے مثلاً اگر کسی مدرسہ میں کسی لڑکے کو یہ بیماری ہو تو فوراً اور بچہ ہی اسکی چھوت لگ جاتی ہے۔ اس مرض کی اقسام بہت ہیں چنانچہ بعض بچوں کو سر پر سرخ رنگ کی اونچا اونچا دانہ نظر آتے ہیں اور انسی پیپ پتی رہتی ہے اور جب وہ پیپ خشک ہو کر جم جاتی ہے تب اس مقام پر زردی مائل کھنڈ پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی وہی کھنڈ موٹی اور مضبوط اور مدور ہوتے ہیں اور بعض دفعہ وہی انیسیم لکڑی سا رہی سر کو ایسا چھالیتی ہیں کہ گویا کسی فی ٹوپی پہنا دی ہو اور کبھی وہی باریک یا ہوسے کے طور پر ہنکر آسانی سے چڑھ جاتے ہیں اس صورت میں بال گر پڑتے ہیں اور بچہ گنجا ہو جاتا ہے اور سر کی جلد سفید چکنی اور چمکیلی ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں اس قدر شدت سے خارش ہوتی ہے کہ گویا گلیان پیو لکڑی انہیں پیپ پڑ جاتی ہے اور کبھی یہ بیماری ایسی شدت کی ہوتی ہے کہ اگر بوقت اسکا علاج نہ کیا جاویں تو کھوپڑی تک زخم پھیل جاتا ہے۔ یہ بیماری اس قدر مہیلی ہوتی ہے کہ اکثر علاج سے اسکو فائدہ نہیں ہوتا اور مہینوں بلکہ برسوں تک برابر قائم رہتی ہے۔

علاج یہ مرض اسقدر مہیلا ہے کہ علاج کو قابو میں جلد نہیں آتا۔ اگرچہ اسکے رفع کرنے کی کوئی بہتری دوائیں اور مرہم اور عرقیات کا ذکر کتابوں میں ہی پر ہم اوسے علاج کا بیان کرنے کے جکومنی اپنی تجربہ میں مفید پایا ہے وہ یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج دو حصہ منقسم ہے۔ اول داخلی دواؤں خارجی + داخلی علاج میں صرف یہی دوا اس مرض کو مفید پڑتی ہیں۔ ایک تو سنگھیا دوسری آئیوڈین۔ اور انکی استعمال کرنے کی دو ترکیبیں ہیں ایک عرق کے طور پر دوا خشک چنانچہ جب عرق کا استعمال کریں تو فائدہ کریں۔ سولوشن۔ ہمراہ آئیوڈائیڈان بوتل کے بلادیں۔

موجب جانتی ہیں۔ غذا مقوی اور سریع الہضم دیوین مگر کوئی خشک گرم یا سردی جو ترش ہو نہ کھلاوین +

پنجم۔ ہرپس۔ سرسی۔ فی۔ ٹس

اگر نیری مین اس مرض کو۔ رنگ۔ ورم۔ اور اور دو مین داد کہتی ہیں۔ بعد دو سال کی عمر کے یہ بیماری بچوں کو اکثر ہو جا یا کرتی ہے۔ اور بعض کو نوبت بنوبت ہر سال یہ مرض ہو جا یا کرتا ہے۔ دانی اسکے بہت چوٹی چوٹی اور جگر کے طور پر پیدا ہوتی ہیں ان چکروں کی سچ کی جلد صیح ہوتی ہے اور کبیر انکا آدھی سچ سو دو پنج تک ہوتا ہے ان دانوں مین ایک شفاف مادہ ہوتا ہے اور انکی سچ کی جلد سرخی مائل ہوتی ہے جب دانی ٹوٹ جاتی ہیں تب نہایت خارش اور جلن ہوتی ہی با سچو مین یا چٹو دن دانے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور دسویں یا پندرہویں روز اپنی سبوسہ جھرن لگتا ہے اس مرض مین دانوں کی کئی چکر مین یا تو ایک ہی دفعہ پیدا ہوتی ہیں یا ایک دفعہ ہوتی ہے اور تب دوسری پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طور مہفتوں تک یہ بات ہوتی رہتی ہے۔ اکثر یہ مرض پشانی مانتھوں کی پشت بچوں جو ٹروں اور کھائی پر پیدا ہوتا ہے +

علاج ابتدا مین دانوں پر پانی مین کپڑا کر کے رکھ دین اگر اسکی خارش موقوف نہ ہو تو انپر عرق ناٹیرٹ آف سلور کا لگا دین۔ ہلکی مسہلات سے تھین رکھیں اور جس وقت سبوسہ جھرن لگیں۔ اوس وقت گرم بانی مین نمک ڈالکر اوس مقام کو دن مین کئی بار دھو ڈالکر مین۔ جب یہ بیماری ایک مدت دراز تک رہی تب کسی الٹریٹو واکا استعمال کریں مثلاً سنکھیا یا مرکبات آپٹوڈین فقط

ششم۔ فی۔ نیا کی۔ بی۔ ٹس۔ یا پورائی۔ گو

اس بیماری کو اور دو مین گنج بولتے ہیں۔ اور یہ مرض بچوں کو کم ہوتا ہے کیونکہ

چھارم - کرسٹا - لکٹیا

بعضوں نے اس مرض کا نام - ام - بی - ٹائی - گو - لار - وی - لس - یا کر - پی -
 ٹس - بھی رکھا ہے - یہ بیماری بچہ کو اکثر دانت نکلنے کے ایام میں ہوتی ہے اور
 اکثر یہ مثنیٰ سی شروع ہوتی ہے چنانچہ پہلے اس مقام پر چوٹی چوٹی زردی نکل
 کم و بیش متوصل دانی نکلتی ہیں - اور کئی بچہ کی جلد سرخ ہوتی ہے - دانوں میں نہایت
 خارش ہوتی ہے - چنانچہ اس واسطے دی جلد ٹوٹ جاتی ہیں اور تب انہی ایک گاڑی
 رطوبت نکل کر خشک کھرنڈ کی طور پر جم جاتی ہے رنگ اس کھرنڈ کو زرد یا نیکل سبزی
 ہوتا ہے - تھوڑے عرصہ بعد اس کھرنڈ کو کنارہ پیر اور دانی پیدا ہو کر سر اور چہرہ پر
 پھیل جاتی ہیں - تب گلی گلیاں بھولکر بڑھ جاتی ہیں اور بعض دفعہ انہیں پیپ
 بھی پڑ جاتی ہے - کافون گردن اور سینہ پر بھی دانی پیدا ہوتی ہیں جب سہرے
 یہ بیماری پھیلتی ہے تب اسکی پیپ بالوں میں جمع ہو کر چٹین بن جاتی ہیں
 سبب خارش کو جو اس مرض میں شدت پیدا ہوتی ہے کچھ سو نہیں سکتا - اور ہمیشہ
 بچہ صین اور چڑچڑا رہتا ہے - اس مرض کی چھوت نہیں لگتی +

علاج - صین ابتدا میں اگر انفلامیشن کی شدت ہو اور نیز رطوبت بہتی رہے تو بچہ کو
 دینین کئی مرتبہ گرم پانی یا پوست کی گرم پانی سے غسل کرا دیں اور جب پیپ جم کر
 کھرنڈ پیدا ہو جاوے تو انہر پولش باندھیں اور جب کھرنڈ جڑ جاوے تو انفلامیشن
 کی شدت گھٹ جاوے اور بیماری کا بڑھنا مو قوف تب زخموں پر بہت آمستہ سی
 خشک نائٹریٹ آف سلور کی قلم پیر دیں یا انہر اس دوا کا عرق لگا دیں اس سے
 خارش بہت جلد رفع ہو جاتی ہے - اور بچہ کو صین اور غنید آجاتی ہے - ساتھ اس
 علاج خارجی کے بچہ کو ادویات مقوی اور الٹریٹو کھلا دیں چنانچہ آئیوڈائیڈان
 پوٹاسیم - یا اگر ضرورت ہو تو فولاد کا استعمال کریں - بعض اس مرض میں سیکمیا کو

دوم۔ ارٹھی کے۔ ریا

اردو میں اس بیماری کو پت اچھلنا بولتی ہیں۔ چھوٹی بچہ اکثر اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں موسم گرما میں یہ بیماری زیادہ تر ہوتی ہے اور بدھتی اس مرض کے اکثر سو فی وقت نخل پڑنے میں کہ جب بچہ بے چین اور چنچتا ہوا جاگ پڑا وقت امتحان کرنے سے ٹہری شیکے پکڑ کے طور پر پہلی رنگ کر کے قدر اونچی اونچی دھتی نظر آتے ہیں۔ انہیں عینیت خارش ہوتی ہے سبب اس کا بدھنسی ہے اور علاج مختصر چنانچہ کو آب گرم سے غسل دلو اورین اور ایک ہلکا سہل دیدین *

سیوم۔ اسکی۔ بیزر

اردو میں اس بیماری کو گیلی کہتی بولتی ہیں۔ یہ مرض چھوٹ سی پیدا ہوتا ہے چنانچہ دائمی کو اگر یہ بیماری ہو تو بچہ کو بھی اسکی چھوٹ لگ جاتی ہے۔ پہلی پہل یہ مرض چوڑوں پاؤں اور گردن کے پیچھے ہوتا ہے۔ بعد اسکے مانتوں کی انگلیوں پر پہل پڑتا ہے۔ بچہ کی خلد چونکہ نازک ہوتی ہے۔ اسکی نسبت جوانوں کی اس مرض میں بچہ نکو انفلامیشن زیادہ ہوتا ہے اور دائمی بھی خلد پیدا ہو کر پھوٹ جاتی ہیں تب انپر زخم ہو کر کھرنڈ بن جاتا ہے +

علاج اسکا مختصر ہے بچہ کو صاف ستھرا کہین اور ہر روز رات کی وقت تھوڑا سا گندک کامریم دانو پیرل دیا کریں اور صبح کو گرم پانی سے غسل دلو اورین یا ایا کرین کہ ہوزن چوبنگا بانی اور میٹھاتیل لیکر انکو خوب پھینٹیں اور جب وہ مثل گھی کے ٹکڑا ہو جاوی تب روئی کر پھاسی اسمن تر کر کے دانو پیر لگا دیں اور لڑکا اگر بڑا ہو تو ہر دوسری رات ادما ڈرام گندک کا حلو اکھلا دیا کریں لیکن بچہ اگر ننھا ہو تو اسکے انا کو ہر روز رات کی وقت ایک ڈرام فلا درس۔ اف سلفر اکھلا دیا کریں *

اگر رات کو وقت پہونے جر جاوین تو انپر سٹرن۔ یا زنگ آیت منٹ گلا دیا کریں۔
 اگر بیماری پرانی ہو جاوے تو کن پٹی یا کانون کر پیچھ چوٹے چوٹے لٹیر گلاوین اگر
 پیوٹون کے اندر کی سطح دانہ دار ہو جاوے تو انپر سلفٹ اف کا پیریاٹائیٹ اف
 سلور گلاوین فقط

مقالہ ششم

امراض جلدی

جلد کی بیماریاں بہتری قسم کی ہوتی ہیں جبکا ذکر ہمیں بحرحکمت میں نہایت تشریح
 کے ساتھ کیا ہے۔ پس اس موقع پر ہم صرف انہیں بیماریوں کا ذکر کریں گے جنہیں سچ
 کی حکیم کو واقفیت کرنی پر ضرور ہے اور جو بہ نسبت جوانوں کے بچوں ہی میں زیادہ
 تر پائی جاتی ہیں +

اول۔ اری۔ تہیا۔ انٹر۔ ٹرائی گو

یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے۔ معنی اس لفظ کی ہیں رگڑنے کی مثلاً جو بچہ میلے
 کچیلے رہتی ہیں۔ اکثر اونکی بغل جلدی سیونکا مقام کل کی ارد گرد چوڑوں کی درمیان
 کا مقام کانون کر پیچھ کا مقام اور وی مقامات جنکے مقابلہ کی جلد اسٹیم رگڑتی ہیں
 سبب جم جانی میل کے چیلے ہوئے ہوتی ہیں اور اولسی ایک رطوبت ہی پیدا ہوتی
 رہتی ہے۔ اس میں خفیف بخار ہوتا ہے بچہ کا مزاج جڑہ چڑا رہتا ہے اور بعض دفعہ
 نہایت شدت سے خارشاں بھی ہوتی ہے۔ اگر اس بیماری کا علاج نکلیا جاوے تو جلد
 وٹان کی سخت ہو کر باجیاسی پٹ جاتی ہے۔ علاج اسکا آسان ہے۔ بچہ کو صاف تھرا
 اور اون مقاموں کو خشک رکھیں۔ اگر انفلامیشن زیادہ ہو تو اونکو پوسٹ کر
 پانی سے دھو کر انپر میداچرک دین اور اگر ضرورت ہو تو کلمسہل ملوٹین کریں

ہلکی مہل سے تلخین کریں بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ تبدیل ہو یا تبدیل نہ
سی یہ بیماری فوراً رفع ہو گئی ہے *

دوم اسکر ایفولس فہتال میا

یہ بیماری اکثر اون بچوں کو ہوجاتی ہے جنکا مزاج اسکر ایفولس ہوتا ہے
علامات اس مرض کی یہ ہیں کہ پٹوں کی کنارے پہلے کسی قدر سرخ اور موٹے
ہوجاتی ہیں اور انہی ایک گاڑی رطوبت نکلتی رہتی ہے اور انکو جوڑ دیتی ہے اور انکو
کہو لکڑی کی طرح سے دیکھنے سے دیکھ کر سرخ نظر آتی ہیں اور انکے کا ڈھیلا بھی رفتہ رفتہ سرخ
ہوجاتا ہے انکو کھنسی آشوب جاری ہوجاتا ہے اور روشنی برسی معلوم ہوتی ہے
جس باعث بچہ ہمیشہ سر کو چکا رکھتا ہے تاکہ انکو نکور روشنی نہ پہنچے۔ چون جون بیماری
بڑھتی جاتی ہے پھوٹ پر دانی پیدا ہو کر زخم بن جاتی ہیں۔ علاوہ اس مقام کے پردہ
کارینا پر بھی دانے پیدا ہوجاتی ہیں۔ جس باعث پردہ مذکور کدھر ہوجاتا ہے اور
جو دانی پھوٹ جاوین تو اس پردہ پر زخم پیدا ہو کر یا فورہ مگر ہوجاتا ہے
یا انکے جاتی رہتی ہے *

علاج اس مرض کو خارجی علاج سے ہرگز فائدہ نہوگا جب تک داخلی علاج ہی اسکی تہ
نہ کیا جاوے گا۔ پس بچہ کو ادویات مقوی مثلاً گاڈ لیور آئیل اور کو مین کھلاوین
یا آئیوڈائیڈ اف ایرن کا استعمال کریں صاف ستھرا کھین اور غذا مقوی کھلاوین
اور صبح و شام ہوا خور یا تبدیل آب دھو کر دین *

علاج خارجی اس مرض کا اسطور سے کریں کہ بچہ کی انگوٹھ پر ایک سبز پردہ باندھیں
تاکہ انکو روشنی ہی تکلیف نہو اگر انفلاشن کی شدت ہو تو انگوٹھ کو پوست کے پانی
سے سینک کر انپر پولٹس باندھ دین اور انگوٹھ میں زنگ یا پٹنگری کا عرق ڈالیں

انہی ایک گاڑھی سینہ پیپ کے طور پر ایک رطوبت نہایت کثرت سے بہتی رہتی ہے
 اور اس وقت انگھون کی کہو لہو کا قصد کیا جاوی تو پھوٹوں کی میر تلے ہی رطوبت
 کی ایک دمار بہتی ہے اور پھر کا پھوٹا اکثر الٹ جاتا ہے اور سوکھ اندر کا پردہ نہایت
 سرخ نظر آتا ہے۔ بعض دفعہ روشنی کی برداشت اس قدر کم ہوتی ہے کہ بچہ
 انگھین بالکل کہول نہیں سکتا۔ درباب بوجھ اس مرض کے بعض یہ کہتے ہیں
 کہ کوئی خاص زہر ہدایش کے وقت بچہ کی انگھون میں سما جاتا ہے اور بعض کہ
 یہ مرض دبا ہی ہے اور کوئی یہم بھی کہتے ہیں کہ سبب سردی یا زہر
 روشنی کے یہم بیماری پیدا ہوتی ہے اور آوی درست کہ یہ باریق ب خاص ہر کو پیدا ہوتی ہے کوئی نہ
 بار اسیا دیکھا گیا ہے جس عورت کو سوزاک یا لیو کو ریا۔ کی بیماری ہوتی ہے پیدائش
 کے وقت اس کے بچہ کی انگھون میں دن امراض کا زہر سرایت کر جاتا ہے
 بت اس کو یہم بیماری ہوتی ہے۔ اگر اس مرض کا علاج عین ابتدا میں کیا جائے
 تو نتیجہ نیک نکل سکتا ہے مگر انوس ہے کہ بچہ کا علاج اکثر اس وقت شروع کیا
 جاتا ہے کہ جب یا تو پردہ کا ریتا میں زخم پڑ جاتا ہے یا جب وہ پردہ مکرر
 ہو جاتا ہے *

علاج ہر روز دین و دیا میں دفعہ انگھون کو گرم بافی سے دھواوین اور
 پوست کی نمکد کرین بعد ازاں عرق پھنگری یا زنگ کا استعمال کرین چنانچہ
 ۶۔ گرین پھنگری کو ایک آنوس گلاب میں حل کر لین۔ یا نین گرین سلفٹ
 اف۔ زنگ کو اسی مقدار گلاب میں حل کر لین یا نائٹریٹ اف سلور کا
 کاعرق (۳ گرین ایک آنوس میں) ڈالین۔ اگر اندام میں نہایت شدت کا ہو
 اور پھوٹی ہو لکڑ جڑ جاوین تو ہر دفعہ دھونے کے بعد انگھون پر آئی کی پوسٹر
 باندھین ساتھ اس علاج خارجی کے بچہ کی شکم کا خیال رکھین۔ اگر قبض ہو تو

دودھ دنگو ہلکے مرگیو۔ ریٹل آئیٹ منٹ کی مابٹل کریں۔ زخمون پر ہلاک۔ ویش
 لگا دیں اور مقعد کے گرد کان۔ ڈی۔ لو۔ ما۔ ہون تو اپنر ٹیٹل اف سلور۔
 کی قلم پھیر دیا کریں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہارے کے استعمال سے جب آشک کی
 علامتیں سرف ہو جاتی ہیں۔ تو سچ بالکل تندرست ہو جاتا ہے اگر ایسا ہو تو کچھ
 ٹماٹو کا استعمال کرنا چاہیے مثلاً سارسا پر بلا ہمراہ ہٹوڑی ہٹوڑی مقدار
 آئیوڈائیڈ۔ اف پوٹاسیم کے پلاوین لیکن سچ اگر بہت لاغز اور کمزور ہو۔
 اور بہت دن سے اس مرض میں مبتلا ہو یا بار بار اسکی علامتیں لوٹیں تو اس
 صورت میں کوئی دوا ایسی معینہ نہیں پڑتی جیسی آئیوڈائیڈ اف ایرن کا پتر

مقالہ پنجم

امراض چشم

ہم صرف انہیں مرضوں کا ذکر کریں گے جو بچوں کو اکثر ہو جا یا کرتی ہیں باقی
 اور بیماریاں انکھ کی جو شاخوں میں اور جو کرتی ہیں اور شاخوں کے سر جری اور علاج
 الامراض کے درسون میں بخوبی ہوتا ہے پس اول

پیو۔ ریو۔ لنٹ۔ افتیال میا

یہ بیماری نو پید ا بچوں کو اکثر ہو جا یا کرتی ہے۔ اس میں آنکھوں کے اندر انگلیں
 ہو جاتا ہے اور پیپ بینی لگتی ہے اگر اسکا علاج جلد نہ کیا جاوے تو پردہ کلپنا
 میں زخم پڑ جاتا ہے یا پردہ مکرر ہو جاتا ہے۔ جبکو او۔ با۔ سی۔ ٹی۔ انڈی
 کا سینا۔ بولتی ہیں یہ بیماری اکثر دوسرے یا تیسری دن بعد پیدائش کے
 شروع ہوتی ہے انکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور سپوٹی ہو لکڑ بند ہو جاتی ہیں تب

اور بعض دفعہ مہینوں تک زندہ رہتا ہے اس صورت میں معتبر علامتیں مرض کی تہوڑی عرصہ کے لئے مفقود ہو جاتی ہیں پر آتشک کے باعث جو لاغری پیدا ہوتی ہے وہ برابر یکساں رہتی ہے چنانچہ بچہ کبھی تندرست نہیں رہتا جسم کی گلیٹیاں بڑھ جاتی ہیں اور بت وہ باتو مسلول ہو کر مر جاتا ہے یا اگر بچہ رہتا تو کسی اور بیماری مثلاً نیو۔ مونیہ۔ یا اسہال سے راہی عدم کا ہو جاتا ہے۔

علاج۔ اگرچہ نتائج اس مرض کے بہت بُرے ہیں تاہم اگر ایسا علاج کامل طور پر دو یا تین مہینہ یا تینک کیا جاوے جب تک اس مرض کا کوئی بھی اثر جسم پر نہ ہو تو بچہ کو صحت کامل ہو سکتی ہے کیونکہ اگر کوئی بھی نشان اس مرض کا مثلاً جسم پر کوئی دانہ یا معورہ پر کوئی۔ کان۔ ڈھی۔ لو۔ ما۔ باقی رہ جاوے اور علاج چھوڑ دیا جاوے تو یہ بیماری نئی نئی ساری علامتوں کو ساتھ پہر پیدا ہوگی اور علاج سے ظاہر ا مرض اگر رفع بھی ہو جاوے تاہم علاج کو جلد ترک کرنا چاہئے کیونکہ مثل جو انوکھی بچوں میں بھی اس مرض کی کوٹھی کا مختاب اندیشہ رہتا ہے۔ بدون استعمال باری کر اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے۔ بعض حکما ایسا کرتے ہیں کہ بچہ کو بار بار نہین کہلاتے بلکہ اوسکی ما پر اس دوا کا اثر پیدا کر کے بچہ کو آرام کرنا جاتی ہیں۔ مرض اگر خفیف ہو تو صرف یہی ترکیب اسکو رفع کرنے کی کافی ہو سکتی ہے لیکن ہر حالت میں مناسب یہ ہے کہ اوسکی ما اور بچہ کو بھی بار بار کہلاوین۔ مہینہ یا دو مہینوں کے بچہ کو چوتھا ہی گرین کیا تو مل ہر اذہ دو یا تین گرین جاگے دین دفعہ کہلاوین۔ چند روز بعد استعمال اس دوا کی بعض دفعہ بچہ کو یہ موافق نہیں پڑتی اوس صورت میں دو یا تین دفعہ تک اسکو موقوف کر کے پھر شروع کرین اور بتا بھی اگر موافق نہ پڑے تو بعد مصل کہلانے کے رانوں اور پٹلوں

گر جاتا ہے اور اونکی نیچر کی جلد زخمی ہو جاتی ہے بعد اُسکے جو نیا اپنی ڈر۔ مس
 پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسطور پر مٹا ہو کر چڑ جاتا ہے یا سفید اور باریک رہ کر
 ایسا سکڑ جاتا ہے جیسے پانی میں تھوڑے عرصہ تک مانتہ رکھنی سے سکڑ جاتی ہیں۔
 بعد ایک عرصہ کے اوسکی چوٹی چھوٹے ٹکڑی کرنے لگتی ہیں اور بت نیچر کی جلد خاصکر
 انگلیوں کی نوک کے چمکے سرخ ہو جاتے ہیں اور ذرہ سی صدرہ سے اوسنوخون پھری
 لگتا ہے ساتھ ان علامات بیرونی کے اثرات شک کو نہ ہر کا بچہ کے اعضا اندرون
 میں بھی نمایاں ہوتا ہے چنانچہ بچہ بہت جلد لاغر ہونے لگتا ہے اوسکو بار بار
 قہر ہوتی ہے یا دست لگ جاتی ہیں ہمیشہ بے چین اور چڑچڑاہٹا ہی ہڈیاں
 سخت نہیں ہونے پاتین۔ سہر پلپلا معلوم ہوتا ہے اور سامنی کایا فوخ فراخ
 رہتا ہے خون ہٹلا پڑ جاتا ہے تب بچہ کا رنگ نہایت پیکا ہو جاتا ہے۔
 اگر علاج سی یہ مرض بالکل رفع نہ ہو تو علاوہ نادرستی صحت کو ہر مرض کو اور آثار
 موجود رہتی ہیں چنانچہ بچہ روز بروز دبلا اور رنگ اوسکا پیکا رہتا ہے۔ بعض دفعہ
 یہ علامتیں تھوڑے عرصہ کے لئے رفع ہو جاتی ہیں اور بلا کسی سبب کے پہلوٹ پڑتی
 ہیں چنانچہ بعض مقامات جسم پر تانبے کے رنگ کے داغ پیدا ہوتی ہیں بال چڑ جاتا
 ہیں خفیف زکام رہتا ہے اور اعضا تناسل پر ایک یا دو اونچے اونچے زخم
 بھی رہتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منہ کے اندر صرف چھوٹے چھوٹے زخم
 ہی رہتی ہیں اور کوئی علامت نہیں پائی جاتی یا مقعد کی جواروں طرف پڑتی
 اور ملائم کان۔ ڈی۔ لو۔ ما۔ پیدا ہوتے ہیں اور بعض دفعہ صرف ماتہ پاؤں
 کی انگلیوں کے بیچ میں زخم پڑ جاتے ہیں۔ مگر یہ علامت آتشک کی پیشہ درجہ
 کی ہے۔ مدت بیماری کی اور کسطور سی یہ مرض مہلک ہوتا ہے ان باتوں میں
 اختلاف ہی چنانچہ بعض دفعہ تو ابتدائی علامات کو ظاہر ہوتی ہی بچہ مر جاتا ہے

اور تپت رطوبت خشک ہو کر نہ ہو لگو بند کر دیتی ہے تب بچہ کو دم لینی اور دودھ
پینی میں تکلیف ہوتی ہے۔ شروع سے آواز بھی بیماری ہو جاتی ہے اور ہر کی
لب کی جلد پر چوناک کی رطوبت بہتی ہے اسلئے وہ چمٹ جاتی ہے اور رنگ
اوسکا بھورا ہو جاتا ہے اور تھوڑے عرصہ بعد چہرہ اور پیشانی کی جلد پر بھی ایسے
ہی رنگ کی دھبے پڑ جاتے ہیں شروع مرض سے دو نوں لبیں بہٹ جاتی ہیں
اوس وقت بچہ کو دودھ پینی میں تکلیف ہوتی ہے اور اون شقوں سے خون نکلنے
لگتا ہے اور دہن کے کو نوں میں بھی چھوٹی چھوٹی زخم پیدا ہوتی ہیں جو تڑ و ہنر
اور اونکی بیچ میں بھی چھوٹی مدور جکلیں اور تانبو کے رنگ کی دھبے پڑ جاتی ہیں
اور مفعد کے گرد چھوٹے چھوٹے ملائم زخم پیدا ہوتی ہیں پیندا اونکا کھنسی
اونچا ہوتا ہے اور مفعد کی سوراخ جا بجا سی بہٹ جاتی ہے اور فوط اور
انوں کے درمیان کی جلد چمک چمک کہیں کہیں سے بہٹ جاتی ہے انکھیں کمزور
اور پٹھوں کی کناروں پر زخم پڑ جاتے ہیں اور انسی پیپ کے طور پر تھوڑے
تھوڑے ایک گاڑی لسا رطوبت بہتی رہتی ہے اور بعض دفعہ سر کے بال
بھی جڑ جاتے ہیں اور ساری سر پر چھوٹی چھوٹی سرخ رنگ کی دھبے پیدا ہوتی
ہیں جب یہاں تک فوبت پہنچتی ہے تب بچہ نہایت کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے
لیکن اگرچہ یہ بیماری مہلک بھی ہو جاوے تاہم مثل جو انوکھی اس بیماری کا
اثر بچہ کی بدبودہ نہیں ہوتا۔ اگر اس درجہ تک بھی بچہ جیبا رہا تو اوسکی منہ
بچہ کی لب اور تھوڑی پر چھوٹی چھوٹے دانے پیدا ہوتی ہیں اور جس وقت
یہ یک کر بہٹ جاتی ہیں۔ تب وہاں پر سخت داغ زخم کے رہ جاتی ہیں اور
جن بچوں کو یہ مرض شدت سے ہوتا ہے اونکی ماتہ اور بالوں کا۔ اپنی ڈوسر
اودھڑ جاتا ہے مگر اکثر وہ جبراً موتا ہو کر سخت ہو جاتا ہے تب جا بجا سی بہٹ

زخم ہوتا ہے یا اوس ایام میں جبکہ جسم پر علامات دوسرے وجہ آتشک کی پھوٹ
 پڑتی ہیں۔ پس یہ بات قرین قیاس ہے کہ عورت کا زہریلا خون اوسکی شکم کے
 بچے کے خون کو بگاڑ دیتا ہے اور اس سبب ہی وہی علامتیں اوس بچے میں ہی
 پائی جاتی ہیں کہ جو اوسکی ما کے جسم پر ظاہر ہوئی تھیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہی
 وقوع میں آتا ہے کہ بچہ اپنی باپ سے آتشک کا اثر حاصل کرتا ہے اگرچہ اوسکی ما کو
 کبھی یہ بیماری نہ ہوئی ہو۔ چاہے ان میں سے کسی باعث بچہ آتشکی ہو جاوے وہی علامات
 اس میں وہی معمولی پائی جاوے گی چنانچہ بعض بچوں کو عین ابتدائے زکام ہو
 جاتا ہے۔ کیسکی جسم پر دانی نکل آتے ہیں اور کیسکی لبون معتد یا اندام ہنانی پر
 زخم پیدا ہوتے ہیں اور جب ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ سبب سرایت کر جاتی ہے آتشک
 کی بچہ شکم سے گر پڑتا ہے تو یہ بھی بات ممکن ہے کہ پیدائش سے بچہ کی جسم پر علامت
 آتشک کی پائی جاوے گو معمولی وقت اونکی ظاہر ہو نیچا چودھوان دن ہو مگر ایسا
 شاذ و نادر ہوا کرتا ہے اگرچہ بچوں کی جسم میں آتشک کا زہر ہی ہوا اور نارائیکو
 جلد ظاہر ہو پھرین تاہم ایسی بچہ اکثر موٹی نازہ پیدا ہوتی ہیں غرض جب آتشک و
 عورت کی لڑکا ہوتا ہے تو دو یا تین ہفتوں تک وہ تندرست ما باپوں کی بچہ کے طور
 رہتا ہے مگر بعد اوس مدت کی علامات زکام کی پیدا ہوتی ہیں چنانچہ تنفس خرابی
 سے لپٹا ہے اور دودھ پنی میں قدری تخلیف ہوتی ہے بعض دفعہ یہ علامتیں
 رفع نہیں ہوتیں۔ تاوقتیکہ بچہ کو بارہ نہ کھلایا جاوے کہ جس علاج سے یہ صاف
 ثابت ہوتا ہے کہ سبب زکام کا آتشک ہی مگر بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ
 صرف زکام کی علامات بہت دن تک نہیں رہتیں بلکہ ساتھ اونا بچہ کے
 ناک اور ساری جسم پر آتشک کی زخم پھوٹ پڑتے ہیں چنانچہ ناک سے ایک طوب
 تیز اور زرد رنگ کی بہتی ہے بعض دفعہ ان میں خون کی دھاریاں بھی ہوتی ہیں

ہوتے جاوین انپر صدہک بطرح کا پہنچنے نہ پاو سے فاصکہ چٹھی یا ساتوین ونسی
بر تقدیر گر گڑیا کہی سبب سی دانون کو گر دکا مقام سوج جاوی یا واپز انفلٹیشن
پیدا ہو جاوی تو اسپر سرد پانی یا گولار ڈس کو شن لگا وین یا پولٹس باندھین *

مقالہ چھامر آتشک

اصطلاح انگریزی میں اس بیماری کو سفلس بولتی ہیں۔ بچوں اور جوانوں کی
آتشک میں بڑا فرق ہے۔ اور اسمین کچھ تعجب بھی نہیں۔ کیونکہ ان دونوں کو
جسم میں نہر آتشک کا مختلف طور سے سراپت کرتا ہے چنانچہ جوانوں میں سبب
مجامعت کی یہ نہر جسم پر پھوٹ پڑتا ہے مگر بچوں میں نثار ہی یہ بات ہو کرتی
ہی۔ سابق میں ایسا قیاس کرتے تھے کہ پیدا ہوتی وقت یہ بیماری بچہ کو اوسکی
مادی ہو جاتی ہی مگر تجربہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت
ہی کم۔ اور تجربہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ دائمی کا دودہ پنی سی بچہ کو آتشک نہیں
ہو سکتی مگر کہی کہی ایسا ہو جاتا ہے کہ جس بچہ کے جسم میں آتشک کا نہر ہوا تو
وہ کسی تندرست دائمی کا دودہ پتا ہوا اور اوس باعث دائمی کے بھٹی میں زخم
پڑ جاوی تو اوسکے اپنی بچہ کو اوس بھٹی کے پوسنی سی آتشک ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر
ایسا ہی ہوتا ہی کہ شکم مادر ہی میں بچہ کے شکم کے اندر نہر آتشک کا سراپت کر جاتا
اور علامات اسکی اکثر کم سی کم چود ہوین دن کے بعد جسم بچہ پر ظاہر ہونے میں
اور ایسا انہیں عورتوں کے بچہ کو ہوتا ہے کہ جہلی یا تو اندام نہانی پر آتشک کا

کی شام کو دانے گرے۔ ایک سرخ مالہ بن جاتا ہے جو دو روز تک بڑھتا رہتا ہے۔ شکل
اس مالہ کی گول اور قطرا کا ایک انچ سین انچ تک ہوتا ہے۔ یہ مالہ دسویں روز
اپنی کمال کو پہنچتا ہے اور سوقت اونسے قریب کے مقام نہایت سخت ہو کر پھول جا
مین۔ گیارہویں روز وہ مالہ درمیان سے باہر کی طرف سر جانے لگتا ہے اور کبھی
ایسا ہوتا ہے کہ دو یا تین اودے رنگ کے چکرین پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور دسویں روز
وہ دانہ خود بھی سر جانے لگتا ہے پھلے تو نوک کی سی بیوری رنگ کی ہو جاتی ہے
اور تب سارا خشک ہو کر گہری بادامی رنگ کا کھرنڈ بن جاتا ہے اور قریب گیارہویں
دن وہ کھرنڈ جڑ جاتا ہے۔ تب اس مقام پر ایک گول داغ رہ جاتا ہے غرض
اسی طریقہ سے۔ ویکسی۔ فی۔ مشن کا دانہ پیدا ہو کر خشک ہو جاتا ہے۔ اگر اگلے دن
بیوری کو سی بھی باقی رہ جاوے یا چھوٹے طور پر ظاہر ہو اور خاص کر وہ سرخ مالہ۔ اگر پلید ہو
تو دوبارہ ویکسی۔ فی۔ مشن کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ایک یا دو دانہ چوڑ دین اور تھوڑے
چھیرین تاکہ دیر اپنے کمال کو پہنچ جاوین۔ اگر دوسری بار وہ تھوڑا ہو تو انسی سواد
لیکر اور دنگو ٹپکا دین۔

علامات جسمی اور ادھکا علاج + بٹکا دینے سے بعض بچوں کی طبیعت ذرہ ہی نہیں
بگڑتی مگر یہ کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے یہ سمجھا جاوے کہ ویکسی۔ فی۔ مشن
درست اور کارآمد ہوا ہے۔ اگر کوئی بھی علامت جسمی ظاہر ہوتی ہے تو وہ قریب
ساتویں یا آٹھویں دن کے پیدا ہوتی ہے چنانچہ اس وقت بچہ کا جسم گرم اور
وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اور شکم میں تھوڑی سی ہیبت خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایام
ویکسی۔ فی۔ مشن۔ مین علاج داخلی کی ضرورت شاذ ہی پڑتی ہے بجز اسے کہ کبھی کبھی
ہلکی سہل مثلاً کٹر ایل سے تیلین کر دین۔ اور جو بخار ہو تو اس کا علاج معمولی
دوا میں کرین مگر ان اس بات کی ضرورت عطا رکھنی چاہی کہ جن جن دوائی پڑے

تاکہ مخزن نکلا ہو وہ خشک ہو جاویں۔ اگر اوس مواد سے ٹیکا دنیا منظور ہو کہ جو چو گوشتی
 ششون میں ہوتا ہے تو پہلے انپر ایک قطرہ پانی کا ڈالکر نشتر سے مواد کو رگڑ کر
 کرڈالیں بعد ازاں اس سے ٹیکا دین جیسے تازہ مواد سے دیتی ہیں۔ اگر مانتی دانت
 کی تیلیوں کا مواد لگانا منظور ہو تو پہلی نشتر سے پچھنا لگا دین جیسا اوپر بیان کیا گیا
 بعد ازاں تیلیوں کو کہو لکر انپر منہ کا بہا پ دین تاکہ انپر جو مواد چٹا ہوا ہو
 وہ مرطوب ہو جاویں تب اوسکی نوک کو زخم کے اندر داخل کر دین اور ایک یا
 دو منٹ تک وہیں رکھ کر کینچ لیں۔ اور تب دو تین دفعہ زخم پر اوسکو پونچھ دین
 اسی طور پر چاروں بانچوں پچھنوں میں مختلف تیلیوں کا مواد علیحدہ علیحدہ
 داخل کرنا چاہیے اگر باریک شیشی کی تیلیوں کا مواد کام میں لانا چاہیں تو اوسکی
 نوک کو توڑ کر گھنڈھی دار جانب کو بتی کی آنج یا منہ کے اندر رکھنے سے اندر کا
 نکل پڑے گا۔ اسکو ایک شیشہ پر لیکر ٹیکا دین جیسے تازہ مواد سے دیتی ہیں
 اگر کہنڈھی ٹیکا لگانا چاہیں تو یہ کام کرین کہ انکو ایک کھل میں رکھ کر تھوڑا
 سا سرد پانی اسمین ڈالکر کرڈالیں اور جب تھلا لعاب کے طور پر بن جاویں
 تب اسی ٹیکا لگا دین۔ اس صورت میں اکثر کئی پچھنے لگاتی ہیں +

تعریف ایک تندرست دانے دیکسی۔ فی۔ شن۔ کی + اگر ٹیکا درست لگایا
 گیا ہو اور بچہ تندرست تو پچھنے کا مقام دوسری دن اونچا معلوم ہوگا۔ اور
 تیسری یا چوتھے روز اسپر ایک چوٹا سا سنج دانہ نظر آئیگا اور اوسکی گرد اگر بالکل
 سی دیکھیں تو ایک ہلکا سفید اور بہت خفیف بخار سا دیکھلائی دے گا۔ بانچوں میں
 ایک اچھا گول دانہ نظر آتا ہے جسکے کنارے اوپر اور نوک دہی ہوتی ہوتی ہے
 اور آٹھویں روز وہ ایک سفید مادہ سے پُر ہو جاتا ہے جسکو لف کہتی ہیں اور
 موتی کے طور پر جھمکنی لگتا ہے اور اسوقت اپنی کمال کو پہنچ جاتا ہے اوسی روز

رکہ دین۔ مواد سیوف خود بخود شیشو کی اندر چڑھ جائیگا تب جلدی سی پتی پر
 اوس شیشہ کی نوک کو گھملا کر منہ اوسکا بند کر دین۔ علاوہ ان ترکیبوں کے گہرندھی بھی
 یٹکا دیتی ہیں۔ انکو خوب بند شیشہ کی اندر رکھنا چاہئے۔ جس بچہ سی مواد لین۔ اوسکی
 طبیعت اور صحت کا بھی خیال رکھیں۔ مثلاً ایسی بچہ سی مواد لینا چاہئے کہ جو ہر طرح
 ندرست ہو جبکو کسی قسم کی جلد کی بیماری نہ ہو اور جبکی طبیعت مین کوئی بیماری مثلاً
 اسکرافیولیا آتشک یا سل نہ ہو ورنہ ان مرضوں کا تخم بچہ یٹکا یا فٹہ مین سرائیت کر
 جائیگا + سیوم ترکیب یٹکا دینو کی + نہایت عمدہ جگہ یٹکا دینو کی وہ ہے کہ جہان
 ڈل۔ ٹائیڈ۔ سل۔ آخر ہوتا ہے غرض اوس کوئی آدھی انچ بچہ اور کس قدر
 باہر کی جانب پر یٹکا لگاتے ہیں اور آگ یٹکا لگانے کا ایک معمولی نشتر ہوتا ہے
 اسکو نہایت تیز اور صاف ہونا چاہی اور نوک اسکی نہایت باریک ورنہ یٹکا نا
 درست ہوگا کیونکہ نشتر کی نوک اگر باریک اور تیز نہ ہو تو جلد کی اندر وہ وقت
 سرخ و لہو کی آواز دوری داخل کرتی وقت مادہ یٹکا کا نوک سے بچھوٹ آئے گا اور زخم کے اندر نہیں
 پیوست ہوگا۔ ترکیب یٹکا دینو کی یہ ہے کہ بچہ کے بازو کو بائیں ہاتھ سے مضبوط
 پکڑ کر اور نشتر کے نوک پر مواد لگا کر دہنی ہاتھ کے صرف انگلی اور انگلیوں کی زور سے
 جلد کے اندر ترچھا داخل کر دین اور چند لمحہ تک نشتر کو مین رہتی دین بعد ازاں اسکو
 نکال کر کئی بار زخم پر پونچھ دین۔ بازو کے چار پانچ مقام پر پھینا لگانا چاہی اور ہر
 یک پچھنی کو اس قدر دور ہونا چاہی کہ انپر جو دانی پیدا ہوں وہی گہنے کے وقت آہستہ
 مل نہ جاوین۔ پچھنیوں کو اکثر تھوڑا بہت خون نکلا کرتا ہے اور اگر بچہ کے جسم مین زیادہ
 خون ہو تو بہت نکلتا ہے۔ لیکن مواد اگر خوب تازہ اور اچھا ہو اور جلد کے اندر
 جو عروق جا ذہ ہیں اونکو مقابلہ مین آجاوی تو چاہے زیادہ خون نکلے باکم یٹکا ہرگز
 خطا نہیں کرتا بعد پچھنی لگانے کے چند منٹ تک بازو کو ہوا مین کھلا رکھیں۔

جانتک ممکن ہو سچ کو تندرست ہونا چاہیے۔ اگر اسکو کوئی بیماری ہو یا وہ دہشت
نکالتا ہو اگر اس کے شکم میں کسی طرح کی خرابی ہو یا اس کے جسم پر کسی طرح کی دانے
نکلی ہوں تو دیکھی۔ فی۔ شش کو چند روز کی لٹو ملتوی رکھنا چاہیے لیکن اشد ضرورت
کے وقت ان باتوں کا لحاظ نہ کریں +

دوم کس قسم کے مواد سے بٹکا دینا چاہیے مواد کو خوب تازہ ہونا چاہیے ورنہ اگر
کچھ فائدہ ہوگا یعنی بعد دیکھی۔ فی۔ شش کی کسی خاص تاریخ کو دانے سے مواد
لینا چاہیے ورنہ بٹکا دینا بجا فائدہ ہے۔ چنانچہ دیکھی۔ فی۔ شش کی باخوبی و دسویں
آٹھویں دن تک کا مواد کارگر ہو سکتا ہے بعد اس تاریخ کے مواد پر اعتماد نہ کرنا
کیا جاسکتا۔ جس دانہ کا مواد لینا منظور ہو اسکی نوک پر خوب تیز نشتر کی نوک سے
تین چار جگہم بھنا لگا دیں اس ترکیب سے چند چھوٹے چھوٹے قطری شفاف مادہ
کی شکل آویں گے اور نشتر کی نوک پر بھی وہ مادہ لگ جائے گا پس فوراً یا پھر
ہی عرصہ بعد ٹیکا دی دینا چاہیے ورنہ مادہ بیکار ہو جائے گا اور نشتر رنگ پڑ جائیگا
اگر مادہ کو کچھ عرصہ بعد استعمال کرنے کے لئے جمع کرنا منظور ہو تو نہایت احتیاط سے
اسکو جمع کریں کیونکہ فی احتیاطی سے یہ بگڑ جاتا ہے اور تب اسکا اثر بھی جاتا رہتا
ہے چند ترکیبیں مادہ کی جمع کرنے کی ہیں چنانچہ یا تو اسکو ایک پنج مربع شیشون پر
بیکرا تنی ہی بڑی شیشون سے اسکو ڈھانپ دیتی ہیں اور بعد ازاں اسکو پتھر سے
مڑھ دیتی ہیں یا مٹی دانت کی نوکیل تیلیو پر جمع کرتے ہیں اگر اس ترکیب سے مادہ
کو جمع کرنا منظور ہو تو ہر ایک تیلی کو دو تین دفعہ دانہ کے مواد میں تر کر کے خشک
کر لیں بعد ازاں پتھر سے مڑھ کر اسکو رکھ چھوڑیں یا اس شکل کی لی بار گیشٹ
کی تیلیو میں بھی جمع کر سکتے۔ ترکیب اسکی یہ ہے کہ نلی کی گھنٹی اور جانب کو قدرے
گرم کر کے جس وقت ہوا اسکی اندر کی ساری شکل جاوے فوراً اسکو دانے کے اوپر

تہنو پر جو چپک نکلتی ہے اسکا سوا دیکر ایک تندرست آدمی کے جسم میں پوستانہ کر دیتی
 میں جبکو اصطلاح انگریزی میں - ویکسی - فی - شن - بولتی ہیں غرض یہ ترکیب بہت
 پایا - کیو - لی - شن - کی بہتر ہے دلیل اسکی یہ ہے کہ جس شخص پر پایا - کیو - لی - شن
 کیا جاتا ہے اگر چہ چپک کی بیماری سے وہ محفوظ رہتا ہے مگر اس میں برائی یہ ہے کہ
 اسکی بیماری رکھنے سے چپک کی وبا پہنچتی ہے لیکن ویکسی - فی - شن میں یہ بات نہیں
 پائی جاتی کیا معنی کہ جس شخص کو چپک مادہ گاؤں سے لٹکا دیا جاتا ہے وہ تو خاص
 چپک کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے بلکہ اس ترکیب سے چپک کی وبا کا استیصال
 بھی ہوتا رہتا ہے کیونکہ چپک مادہ گاؤں اور ہون میں وبا پھیلتی نہیں ہونی پس جو کہ
 ہر حکیم کو وبا پھیلاؤں کی بیخ کنی میں کوشش کرنی چاہیے اسلئے اپنی مرض سے
 کہ انڈیکویشن کو ترک کر کے ویکسی - فی - شن - کو جاری کریں جسکی ترکیب
 نہایت شرح و بسط کے ساتھ ہم نیچے بیان کرتے ہیں ایسا ہرگز خیال نہ کریں جیسا
 اس ترکیب کے موجد ڈاکٹر خبر صاحب فی لوگوں میں مشہور کر دیا تھا کہ اس ترکیب کے
 جاری کرنے سے چپک کی وبا صفحہ دنیا سے مٹ جائے وہ جو باسی گی کیونکہ اس ترکیب
 کو ایجاد ہوئی ۵۰ برس کا زمانہ گزرا ہے اور سب سے پہلے دیکھتی ہیں کہ ویکسی -
 فی - شن - فی چپک کو دنیا سے معدوم نہیں کیا مگر اس عرصہ کے تجربہ سے جبکہ یہ تو
 ضرور ثابت ہو گیا کہ جبکہ ویکسی - فی - شن - کیا جاتا ہے وہی چپک کی مرض سے
 محفوظ رہتی ہیں اور اگر چپک انکو نکلتی ہے تو وہ نہایت خفیف اور بظاہر
 ہوتی ہے لیکن اسلئے ویکسی - فی - شن سے فائدہ ہوگئی باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے
 چنانچہ اول بچہ کی حالت اور عمر - سب سے بہتر وقت بچہ کو لٹکا دینے کا چھ ہفتہ سے
 چار مہینے تک کی عمر ہے - لیکن قرب و جوار میں اگر چپک کی وبا پھیلی ہو تو اس
 عمر کا انتظار نہ کریں بلکہ فوراً پیدا ہونے کے بعد ہی بچہ کو لٹکا دیں دینے کی وقت

کمال تکلیف ہوتی ہے سینہ پر مسٹر دپلا سٹر کو لگانے سے اور بچہ کو آب گرم میں نہلانے سے یہ علامت اکثر رفع ہو جاتی ہے اور اس ترکیب سے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانے ساری جسم پر بخوبی نکل پڑتے ہیں۔ اگر اس علاج سے فائدہ نہوا اور بچہ کو دم لینی میں کمال تکلیف ہوتی ہو اور دانی بہت کم نکلیں اور جو نکلی بھی ہون وی سیاہ یا اودی رنگ کر ہون تو اس صورت میں مضد لینی چاہیے۔ اگر برانکائٹس یا نیو۔ مونیو۔ کی علامتیں بہت شدت سے ظاہر ہوں تب بھی مضد کی ضرورت پڑتی ہے اور بعد مضد کر ٹار ٹار امٹک کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس مرض کو حیر میں سبب برانکائٹس۔ یا نیو۔ مونیو کے شام کو وقت بچہ کو اگر دم لینی میں تکلیف ہو تو وہ تکلیف مسٹر دپلا سٹر کے لگانے سے رفع ہو جاتی ہے۔

ٹیکا وینا

یعنی۔ ویکسی۔ نی۔ شن

چھپک علاج دو حصہ میں منقسم ہے اول خاص مرض کے پیدا ہونے کے وقت جب کایا بخوبی ہو چکا ہے اور دوم علاج حفظ ماقدم یعنی قبل از پیدا ہونی بیماری کے ایسی تدبیر کریں کہ جس سے یہ مرض پیدا ہی نہو سکی چنانچہ اب ہم اوسکا بیان کرتے ہیں۔ حکماء سابق اور اب بھی دی لوگ جو سبب نادانی اور تعصب کی حکمت کی ترقی کو بظرف حشارت دیکھتے ہیں اس مرض کا علاج حفظ ماقدم اس طور پر کرتے ہیں کہ مواد خاص مرض چھپک کے دانی کا لیکر ایک تندرست آدمی کے جسم میں پوسٹ کر دیتی ہیں چنانچہ اس ترکیب سے اوسکی جسم پر چند دانے چھپک کی نکل پڑتے ہیں اس ترکیب کو اصطلاح انگریزی میں۔ انا۔ کیو۔ لی۔ شن۔ بولتی ہیں مگر دانیانے رنگ فی ایک نئی اور بہتر ترکیب اس مرض کے روکنے کی یہ نکالی ہے کہ مادہ گاؤکو

یا پندرہویں روز سے مریض کو صحت ہونی لگتی ہے۔ جب اس بیماری میں کسی اور مرض کا دخل نہیں ہوتا تب اسے طور پر ظاہر ہو کر رفع ہو جاتی ہے کہ جس طور اوپر بیان کیا گیا ہے لیکن جب ساتھ اسکے اور اعضا میں شامل ہو تو میں تب یہ بیماری خوفناک ہو جاتی ہے چنانچہ جب دماغ اس مرض کا شریک ہوتا ہے تب اکثر قبل از نکلنے دافون کے بچہ کو نولوشن ہو جاتا ہے لیکن نسبت پیپٹرون کے دماغ اسمین کم شریک ہوتا ہے چنانچہ مریض کو اکثر یا تو براکھائیٹس - یا - نیو - مونی - کی بیماری ہو جاتی ہے اور یہ بیماریاں نسبت اور وقتوں کے دافون نکلنے کی تیسری یا چوتھے دن سے شروع ہوتی ہیں اور بعد رفع ہو جانے میں لیس کے بھی موجود رہتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میں لیس کی بیماری رفع ہو جاتی ہے تب ایک مدت تک بچہ یا تو اسہال یا پھیش کی مرض میں مبتلا رہتا ہے +

علاج اگر اس مرض کو ساتھ کوئی اور بیماری نہ ہو تو علاج اسکا آسان ہے چنانچہ بیمار کو گرم رکھیں غذا ملکی دیں اور ہلکی انٹی - فلو - جیک دواؤں کا استعمال کریں کہاںسی اگر بہت تکلیف دہتی ہو تو پیہ برابر ایک بسٹر ٹریکیا کو اوس مقام پر کہ جو اسٹریم ٹری کی اوپر سے تین یا چار گھنٹہ تک لگا رکھیں اس سے جہالا نہیں پیدا ہوتا مگر کہاںسی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اسے طور پر ساری ایام بیماری میں بسٹر کئی دفعہ لگا سکتے ہیں کہاںسی کے لئے اگر اسنی بھی زیادہ ضرورت پڑتی تو معمولی کہاںسی کی دواؤں کا استعمال کریں کہ بڑے چہرنے کے وقت اگر زیادہ کھلی ہو تو رات کو تھوڑا سا ڈورس یا ڈور کھلا دیں اور ہر روز شام کو وقت بچم کو آب گرم کا غسل دیدیں - اگرچہ یہ علاج اکثر موقع کے لئے کافی ہے تاہم بعض دفعہ کہ جب سینہ کو اندر کوئی بیماری ہوتی ہے اوس وقت اور علاج کی بھی ضرورت پڑتی ہے چنانچہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دافون بخوبی نہیں نکلے میں کہ بچہ کو دم لینے میں

بری معلوم ہوتی ہے بار بار چنگین آتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد رنگ
 کہاںسی تکلیف دیتی ہے اکثر ان علامتوں کے شروع ہونی سے چوتھوں چہرہ پر دانے
 نمودار ہوتے ہیں وہاںسی یہ گھنٹہ کے اندر ساری مین اور پاؤں پر پھیل جاتی ہیں مگر
 ہمیشہ پہلے دانے اور پسیدہ ہو کر ہنچ کی طرف آتی ہیں دانے کے نہایت چھوٹے خوب
 سرخ مدور اور کسی قدر اونچے مثل پتو یا چھپرے کا گٹھ کے طور پر غٹھوں میں ہوتے
 ہیں اور اگرچہ یہ ایک دوسرے کو نہایت قریب ہوتے ہیں تاہم فرق فرق ہوتے
 ہیں اور انکی مابین کی جلد کا رنگ حالت اصلی پر رہتا ہے رخسار و نہر و دانے
 بعض دفعہ ملکر دھبوں کے طور پر جلوئے ہیں کبھی لمبائی ایک انچ کو پہنچتی اور
 چوڑائی اوسکی آدھی ہوتی ہے جسم کے اور مقاموں پر وی خوشی بلالی شکل کے
 ہوتے ہیں۔ یہ دانے اوسی قرینہ سے مر جاتی لگتی ہیں کہ جس قرینہ سی وی ظاہر ہوئی ہو
 اور انکی ظاہر ہونیکی چوبیس گھنٹہ بعد کہ جس عرصہ میں چہرہ کے دانے مر جاتی لگتی ہیں
 دیگر مقامات جسم پر اونکا عروج ہوتا ہی مگر بیماری کے ساتویں دن ساری جسم کو دانے
 مر جاتی ہیں اور آٹھویں یا نویں دن بالکل مفقود ہو جاتی ہیں تب ان مقاموں کی
 جلد یا تو سرخ رہتی ہے یا انہر صرف چہرے پر داغ رہ جاتی ہیں یہ بات قابل یا کہنہ کی
 ہو کہ چھپک کی بیماری میں ایسا ہوتا ہے کہ بعد نخل پڑنے والوں کو ساری جسمی علامات
 فوراً رفع ہو جاتی ہیں مگر اس مرض میں ایسا نہیں ہوتا دانوں کو نکالنے سے بھی
 علامات بدستور قائم رہتے ہیں بلکہ بعض دفعہ جو میں یا یہ گھنٹہ بعد بخار اور کہاںسی
 بنسبت چھپک کی زیادہ ساتی ہے اور آواز بھی زیادہ ترہ بیٹھ جاتی ہے اور سبب الفلین
 حلق کے بخار کا گلابی آجاتا ہے۔ یہ علامتوں کی یہ شدت بہت عرصہ تک نہیں رہتی
 بلکہ اکثر چھپک روز انہیں تخفیف ہو جاتی ہے چنانچہ بخار کم ہو جاتا ہی کہاںسی کم آتی لگتی ہے
 غرض اسی طور پر روز بروز بخار کو افاقہ ہوتا جاتا ہے اور بیماری کے دسویں

دویم حکین پاکس

اس بیماری کو اصطلاح میں - وی - رمی - سلا - اور مہندی میں پن گوٹی - بولتی ہیں یہ مرض خاصکر بچوں ہی کو ہوتا ہے اسکا ابتدائی سنجار ہمیشہ خفیف اور بعض دفعہ بالکل ہوتا ہی نہیں اور کبھی شدت سی ہو کر چوبیس بلکہ ۶ گھنٹہ تک رہتا ہے بچہ کی طبیعت بگڑنے سے بعض دفعہ ۴۴ اور کبھی ۳۶ یا ۴۸ گھنٹہ بعد دانی منہ دار ہوتی ہیں اور کبھی ابتدا ہی سے دانی نکلنے لگتی ہیں - دانی اسکی چوٹی چوٹی مدور اور بہت کثرت سی ہوتے ہیں اور اونکی اندر ایک شفاف رطوبت رہتی ہے یہ دانی اکثر چہرہ سر کند ہوں اور سینہ پر نکلتی ہیں اور شاذ و نادر پاؤں پر اور بہت کم متعلقہ ہوتے ہیں - دو یا تین دن تک وہ بڑھتی جاتی ہیں اور بتاؤنگر اندر کے رطوبت گدلی اور دودھ کے طور پر ہو جاتی ہے اور جوتی یا پانچویں دن وی مری جاتی لگتی ہیں اور تب خشک ہو کر انپر ایک باریک گہر ٹہ بندہ جاتا ہے اور بیماری کے آٹھویں یا نوین دن وہ جڑ جاتا ہے - شاذ آسا ہوتا ہے کہ بعد چہرے گہر نڈک حلیہ پر داغ رہ جاتا ہے - یہ بیماری اسقدر خفیف ہے کہ علاج کی کچھ ضرورت نہیں پڑتی سوا اسکے کہ بچہ کی غذا کم کر دیں اور اسکو صاف ستھرا رکھیں فقط

سیوم - می - زلس

اس بیماری کو اصطلاح میں - رو - بیولا - اور اردو میں کہہرا کہتی ہیں + علامات پہلی اس میں زکام کی علامتیں نہایت شدت سے ظاہر ہوتی ہیں جبکہ ایک بچہ صحیح و سالم دفعتاً بی چین ہو جاتا ہے اسکو پیاس معلوم ہوتی ہے سنجار اور درد سر ہوتا ہے آنکھیں سرخ اور اوسنی آنتوب جاری رہتا ہے اور روشنی

کہلاوین اور ایسا ہی علاج اوسوقت کرنا چاہی کہ جب سی کنڈری - فیور - ملائی
 فائید بخار کی شکل پکڑ جاوی اور چاہی کوئی علامت خوف ناک پیدا ہو یا نہ ہو اگر دوا
 بہت کثرت سے ہون تب ہی بعد نکلنے دانوں کی باخچوں چٹے و سفی غذا معوی سے
 بیمار کی طاقت کو فایم رکھیں یہ وقت ابتدائی بیماری سے اٹھوان یا نو ان دن ہوتا
علاج خارجی - ابتدا مرض میں دانوں نہ لگانے کے لیے بہتری چیزیں تجویز کی گئی
 ہیں تاکہ وہی بخوبی اہرنے نہ پاویں اور اوس باعث ان مقاموں میں غار پڑ کر
 بیمار بد شکل ہونے والی جانچ بعض تو ہر ایک دانوں پر ٹائپرٹ اف سلور لگاتے ہیں
 اور بعض مرکب پر ٹیل پلاسٹ پر مار مرکب پر ٹیل آئیٹ منٹ اپر ملتی ہیں مگر چونکہ ٹائپرٹ
 اف سلور کے لگانے میں نہایت وقت ہے اور اس سے فائدہ بھی کم ہوتا ہے اسلی
 دانوں کو نکلنے سے پیشتر دن انہر مرکب پر ٹیل پلاسٹ لگا دیں - اسی بڑا فائدہ ہوتا
 انہوں کا بہت خیال رکھیں کیونکہ جس وقت دانے پختہ ہونے لگتی ہیں اوسوقت
 پھوٹی ہو لکڑ جڑ جاتے ہیں پس انکو آب گرم سے دھو دیا کریں اور اگر انہر کوئی
 دانہ چھک کا ہو تو اوسکو ٹائپرٹ اف سلور سے داغ دیں وہیں اور حلق کا بھی خیال
 رکھنا چاہی جانچ لڑ کا اگر بڑا ہو تو اوسکو انفیوژن اف روز کی کلی کر دیں اور
 جو چھوٹا ہو تو اوسکے منہ کو آب گرم کی پچکاری سے دھو کر اوسکی حلق میں ایک ہلکا
 عرق کلورائیڈ اف لائیم کا لگا دیں جب ٹریکیا اور لارنکس کی اندر دانوں کے
 نکلنے کو باعث بچہ کو دم لینی میں تکلیف ہو تب وہ اکثر لا علاج ہو جاتا ہے +
 دانوں کو پختہ یا خشک ہونے کی وقت اگر کمال کھلی ہو تو انہر موم روغن یا کوئی
 پٹھا تیل لگا دیں ہر اکثر انہر کھلی نہیں ہوتی اوس وقت بچہ کا منہ باندھ دینا
 پڑتا ہے تاکہ دانوں کو نوچ کر زخم نہ کر دیں - اس مرض کے تیاج کا علاج معمولی
 طور پر کریں +

ہو کر بیہوشی طاری ہو تو فصد بھی لی سکتی ہیں کیونکہ چیچک کے ابتدائیں دماغ کو اندر جو
 اجتماع خون کا ہوتا ہے اگر وہ جلد رفع نکلیا جاوے تو بیمار نہایت جلد مر جاتا ہے۔ مگر
 اسکا خلاف بھی وقوع میں آسکتا ہے کہ قبل از نکلنے دانوں کے بیمار اس قدر کمزور ہو جاتا
 کہ او کو گرم رکھنا اور گرم ادویات دینا کی ضرورت پڑتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب
 دان نکل لیتی ہیں تب ایک عرصہ تک سارے علائقہ کو تخفیف ہو جاتی ہے پس اس وقت
 بیمار کو طبیعت پر چھوڑ دینا چاہئے بعض دفعہ یہ بابت متوصلہ میں بھی ہوتی ہے کہ
 دانوں کی نکلنے سے سارے علائقہ کو تخفیف ہو جاتی ہے مگر یہ ایک دکھا ہی اور اس پر اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ ایک
 دور در بعد سی کنڈری فیور ظاہر ہو سکتا اگر دانوں کی تعداد کم ہو۔ اور سی کنڈری فیور خفیف تو غیر ضرر
 کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور اس وقت علاج کی بھی چند ان ضرورت نہیں ہوتی صرف
 ملکی معمولی دوائیں مثلاً لائیوڈ اور ایمونیا۔ اسی۔ ٹی۔ ٹس۔ وغیرہ کافی ہیں۔ لیکن
 جس حالت میں دان کی بکثرت نکلیں اور اس باعث سی کنڈری۔ فیور۔ بھی زور و شور
 سے ہو جاوے تب انٹی فلو۔ جیک علاج ضرور کرنا چاہیے اور کمال درجہ کی کورس کرنا
 کوئی (جو دانوں کی بچت ہو نیکی درجہ میں اکثر ہوتی ہے) ڈورس۔ پاؤڈر یا کوئی اور
 اینون کی دوا دن میں ایک یا دو دفعہ ضرور دینی چاہیے چیچک متوصلہ میں دانوں کو
 بچتہ ہونے کا وقت آجاوے تب نہایت محتاط رہنا چاہئے کیونکہ اس وقت کے
 دورے یا تیسری دن بعض دفعہ بیمار دفعتاً پست ہو جاتا ہے چنانچہ حالت بستی کی علامت
 بی ہیں کہ بیمار بے نسبت چلو کے زیادہ تر بے چین ہو جاتا ہے۔ چہرہ اور ناک تھکے سابق
 کا ورم مفقود ہو جاتا ہے۔ دانوں کے مابین کا مقام ہیکہ پڑ جاتا ہے اور وٹھلنے
 خود بھی دب جاتی ہیں تب جسم سرد اور غرض نہایت کمزور ہو جاتی ہے غرض اس
 حالت میں گرم دواؤں کا استعمال خوب کرنا چاہیے بیمار کو برانڈ می اور ایمونیا۔
 بلاوین اور بعض ملکی غذا کے جو ابتدائے میں تجویز کی تھی اب افذیہ مقوی

کہ بیماری رو بصحت لانی والی ہوتی ہے تو اس میں یہ علامتیں دانوں کے نکلنے سے پہلے
یا چونہ دن شروع ہو کر اور آٹھویں یا نویں دن تک بڑھ کر تھوڑے گھٹنے لگتی ہیں پر
جب یہ مرض خوف ناک ہوتا ہے تب وہی رفتہ رفتہ بڑھتی لگتی ہیں آواز بند ہو جاتا
ہے نکلنے میں نہایت تکلیف ہوتی ہے اور آخر کار ہمارے دم بند ہو کر مر جاتا ہے اور
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیمار کی ناک اور منہ سے خون جاری ہو جاتا ہے اور دانے
بے نسبت پڑے ہو جانے سے سیاہ ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ پاؤں یا کوئی حصہ جسم کا
مردار بھی پڑ جاتا ہے

نیاچ بعد صحت کی کبھی تو بیمار کو ڈایا - ریا - اور کبھی ڈی سنٹری ہو جاتا ہے
اور بعض دفعہ ایک عرصہ تک اس کا منہ بکڑا رہتا ہے اور اکثر جب آنکھ میں دانہ
نکلتا ہے تو آنکھ بہوٹ جاتی ہے اور بیمار اندھا ہو جاتا ہے +

علاج سابق میں اور اب بھی ویسی حکیموں میں یہ علاج جاری ہے کہ بیمار کو
گرم چیزیں دیتی ہیں اور اس کے مکان کو بند رکھتی ہیں اس لیے کہ ہوا اندر نہ جاسکے
اور مریض خوب گرم رہے تاکہ دانی کثرت سے نکلیں کہوں کہ ان کو یہ خیال ہے کہ دانوں کے
کثرت نکلنے سے سارا فاسد مواد نکل جاتا ہے اور بیمار کو طبع صحت ہو جاتی ہے
بہرہ کی حکما جنکو وسیع تجربہ اور تشریح کا علم خوب حاصل ہے ان باتوں پر عمل نہیں کرتے
کیونکہ تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ زیادہ دانوں کے نکلنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور
اوس باعث بیمار اکثر مر ہی جاتی ہیں پس اس واسطی ابتدا درجہ میں وہی سرد چیز دیتی
علاج کرتے ہیں اور بیمار کا مکان کھلا رکھتی ہیں تاکہ تازہ ہوا کا گذر ہو اور دانے
اگر ممکن ہوں تو کم پیدا ہوں چنانچہ اس واسطی ہلکی مسہلات دیتی ہیں غذا کم اور ہلکی
اشی - فلو حب شک دھکا استعمال کرتے ہیں - فصد لینا اس مرض میں اگرچہ منع ہی
تاہم جس وقت دماغ کی علامتیں شدت سے ظاہر ہوں اور بچہ کو بار بار کنو لشن

ہو جاتا ہے نبض سبب جلد چلنی لگتی ہے۔ بلی چینی اور تشنگی اور ساری علامات شدید بخار
 کی ظاہر ہوتی ہیں اور انکی شدت کم و بیش مین روز تک رہتی ہے جب دانے
 پھٹ جاتی ہیں اور خشک ہونی لگتی ہیں تب وی علامات بتدریج کم ہو کر بالکل
 مفقود ہو جاتی ہیں لیکن صرف چھپک متفرقہ مین ایسا ہوتا ہے کہ علامات -
 سی۔ کنڈری۔ فیور۔ اسقدر خفیف ہوتی ہیں کہ چونکہ چھپک متوصلہ مین سی۔
 کنڈری۔ فیور۔ بہ نسبت متفرقہ کی زیادہ تر شدید ہوتا ہے اور دیر سی آتا ہے
 کیونکہ اس قسم کی چھپک کے دانی دیر سی بختہ ہوتے ہیں اور یہ بخار اکثر ٹائی
 فائیڈ۔ فیور کی شکل پکڑ لیتا ہے اسمین نبض نہایت جلد اور کمزور ہو جاتی ہے
 زبان خشک اور بہوری اور بیارہ حالت ہڈیاں مین مرجاتا ہے بعض دفعہ ایسا
 ہی ہوتا ہے کہ چھپک متوصلہ مین دانون کے پختہ ہونی کی ایک یا دو روز تک
 بخار نہایت خفیف ہوتا ہے اگر اسمین بیارہ کی جانکا خطرہ نہوتا تو ہم اسکو ایک نیک
 علامت کہہ سکتے لیکن دفعاً نبض کمزور ہونی لگتی ہے اور دانی جو پیشتر بہ نظر
 آتی تھے اب دب جاتی ہیں مائتہ پاؤں سرد ہو جاتی ہیں اور چند گھنٹہ کے اندر
 بیمار راہی عدم کا ہو جاتا ہے بعض دفعہ تو موت کی پیشتر بچہ کو کونکشن ہو جاتا
 اور کبھی نہایت بلی چینی کی حالت مین تڑپ تڑپ کر دم نکلتا ہے پس یاد رکھیں
 کہ دانون کے پکنے کے وقت اگر بچہ کو کونکشن یا کمال بے چینی ہو تو یقین جائیں
 کہ موت نہایت قریب ہی علاوہ ازیں ایک اور علامت خطرہ جان یہہ بھی ہے
 کہ جب دانی منہ اور حلق اور ہوا کی نالیوں مین پیدا ہوتی ہیں تب بیمار کی آواز
 بیٹھ جاتی ہے لگنا مشکل سے ہوتا ہے اور دم تکلیف سے لیا جاتا ہے اور خشک
 کہا نشی سہی بعض دفعہ ہوتی ہے اور چھپک کی بیماری مین جو اکثر زیادہ تھوک
 پیدا ہوتا ہے تو وہ ہی منہ کے اندر دانون کی کلنی سے پیدا ہوتا ہے جسوقتین

کہ جو رنگ کھرنڈ پھرنے تک رہتا ہے۔ چہری کے دانے پہلو خشک ہونی لگتی ہیں اور ماتہ
 پاؤں کے شاید بہ باعث سوٹی ہونے جلد اول مقاموں کے کسب پیچیدہ اور اسی مقام
 کے دانی بھی بہ نسبت اور مقاموں کی زیادہ تر بڑی ہوتی ہیں دانوں کے نمودار ہو کر
 پانچویں دن کے شروع سے آٹھویں دن کے شروع تک وہی پختہ ہونی لگتی ہیں اور
 یہ بات بیماری کی آٹھویں دن سے گیارہویں دن تک جاری رہتی ہے اس وقت
 دانی خشک ہونی لگتی ہیں۔ واضح ہو کہ جو جو تغیرات اوپر بیان کئے گئے ہیں وہی صرف
 اس حالت میں پائے جاتے ہیں کہ جب چھپک کے دانے کم اور علیحدہ علیحدہ پیدا
 ہوتی ہیں بر حسب صورت میں چھپک کو دانی بہت ہوتی ہیں اور وہی ایک دو سر سے مل
 جاتی ہیں بت البتہ وہی تغیرات خاص دانوں میں نہ پائی جا سکتی ہیں علاوہ برین اس
 صورت میں دانی اس قدر بڑھتی ہی نہیں پاتے جبکہ چھپک متفرقہ میں نہیں ہوتی ہیں اور
 نتوہی بہت اونچی ہوتی ہے ہین اور نہ اونکی اندر کا مواد زردی مائل ہوتا ہے بلکہ
 کئی ملکہ چٹین بن جاتی ہیں جنکا رنگ سیندی مائل ہوتا ہے اور جب چھپک خفگی کے
 درجہ کو پہنچتی ہے تب اون چٹو پیر ایک بھوری رنگ کا رطوب کھرنڈ سم جاتا ہے اور یہ
 کھرنڈ بہت دنوں میں گرتا ہے چھپک کے دانے جتنی زیادہ پیدا ہوں گے اور
 جس قدر وہی زیادہ آپس میں مل جائیں گے۔ اور سیدہ جان کا اندیشہ زیادہ ہوگا
 جس وقت سے چھپک کو دانی نکلنے لگتے ہیں اور یہ وقت سے ابتدائی علامات کو مشاہدہ
 وغیرہ کو بہت تخفیف ہونی لگتی ہے اور بعض دفعہ تو وہی بالکل مفقود بھی ہو جاتا
 ہیں اور اگر چھپک خفیف ہو تو سوا دانوں کے بچہ میں اور کوی علامت جاری نہ
 نہیں پائی جاتی۔ لیکن جب دانی پختہ ہونی لگتی ہیں تب بیمار کو بہر بخار ہو جاتا ہے
 اور اس وقت سے اسکی جانکا نہایت خطرہ ہوتا ہے۔ اس بخار کو اس علاج
 میں۔ سی۔ کن۔ ڈری۔ فیور۔ کہتے ہیں۔ علامات اس بخار کی یہ ہیں کہ جسم بگڑتا

مقالہ سیوم

امراض جذری

اول چھینک

علامات پہلے بخار ہوتا ہے اور ساتھ اس بخار کے شدت سستی ہوتی ہے اور اگرچہ وہ شدت کا درجہ اس مرض کے ابتدا درجہ میں جو انون کی پشت پر ہوتا ہے چون کو نہیں ہوتا تاہم دماغی علامات بچون میں نہایت شدت سے پیدا ہوتی ہیں چنانچہ چھینک کے شروع میں بچہ کو یا تو ہڈیاں یا کنولشن ہو کر بیہوشی ہو جاتی ہے۔ ان علامتوں کے شروع ہونے سے اکثر ۴ گھنٹہ کی بعد بچہ کی چہرہ پیشانی اوپونچ پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل پڑتی ہیں تب وہی رفتہ رفتہ سارے جسم اور ہاتھ پاؤں پر پھیل پڑتے ہیں یہی دانی پھلے نوکسی قدر سرخ اور نوکیلا اور اس قدر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ نا تجربہ کار کو اونکا گمان ہی نہیں ہوتا تاہم ان مقاموں پر ہاتھ پہنچنے سے وہی بخوبی محسوس ہو سکتی ہیں۔ یہ دانی بڑھتی جاتے ہیں اور ۴ گھنٹہ کے عرصہ میں پھنسیوں کے طور پر ہو کر اوغلیں ایک سفید رطوبت پیدا ہو جاتی ہے اس وقت اونکی نوکین دب جاتی ہیں اور ہر قریب ۴ گھنٹہ کے عرصہ میں وہی بڑھتی جاتی ہیں اور نوک اونکی زیادہ تر دب جاتی ہے اور تب اونکی اندر کا مواد سفید اور گدلا ہو جاتا ہے اور اونکی گرد ایک سرخ نالہ بن جاتا ہے۔ اب چونکہ دانی بڑھتی جاتی ہیں چہرہ ہاتھ اور پاؤں سوخنی لگتا ہے اور جب وہی خوب بڑھتی ہو جاتی ہیں تو اونکی دبی ہوئی نوکین پر کثرت سے اونچی ہو جاتی ہیں بعد ازاں انون کی سفید رنگت جاتی رہتی اور تب وہی پہلی نند رنگ کے ہو جاتی ہیں

ان دو قسم کے کچھ ہی بھی مثل کہ ودانہ وغیرہ بچوں میں پائی جاسکتی ہیں یہی وہ
قسم جنکا ذکر اوپر کیا گیا ہے اکثر پائی جاتی ہیں +

علاج اس بات کو بھلو دیا فت کرین کہ سعدہ یا انٹر لئون مین الفلامینش یا خورش
ہی یا نہیں اگر ہے تو پہلو او سکورفع کرین اور بت ادویات کرم کش کل استعمال
کرنا کچھ **مسہلات** تیز جلاب کو کہانی سے کچھ دے دستوں کے ہمراہ نکل آتے ہیں
پس اگر مناسب سمجھیں تو بچہ کو ایک تیز جلاب دیں۔ مثلاً اسکامونی اور جالبیلو
کیا لول کے دیوین اگر چھنی ہوں تو الوز۔ کا جلاب مفید پڑتا ہے کیونکہ اثر اس
دوا کا خاصکر ریگیم انٹری پر ہوتا ہے یہ اس قسم کے کرم مین جو دوا دین او سکوبلو
بچکاری کو دینا چاہیے مثلاً کسٹیر ایل اور ٹرپن۔ ٹائین کے حقہ میں نصف یا ایک لیم
ٹینکچر اف الوز کا ملا دین جو نوکے پانی اور انفیوژن اف کوشیا کی بچاری بھی
ان کرم کو مضر پہنچتا ہے اور سلفٹ اف ایرن کی بچکاری بھی (مثلاً اگرین سے
ہ اگرین تک چار یا چھ آنوس پانی مین کافی ہے) اس مرض کو معینہ ہے یہاں
کو یا در کہیں کہ کچھ سے کا صرف نکال دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایسا علاج کرنا چاہیے
کہ جتنی بچہ کا صمدہ درست ہو اور اسکی طاقت قائم رہے کہ جتنی بہرہ دے کرم پیدا ہی
نہو فی اہوین پس غذا مقوی اور سیرج البضم دیوین اور ایک نہایت مفید دوا اس
مرض کے لئے ٹینکچر اف میورٹٹ اف ایرن ہے عرض اسکا استعمال کرین +



شریک ہوتی ہیں اوس وقت بچہ دم جلد جلد اور تکلیف لیتا ہے نبض تیز چلتی ہے
 یا دل دھڑکنے لگتا ہے اور کھانسی خشک اور ایسی ہوتی ہے کہ جتنی دم بند ہوا جاتا ہے
 تو انکے بیان اسہال بچہ اور غشی دست بھی اس مرض میں اکثر آیا کرتے ہیں۔
 کس قسم کے کچھ بچہ بچہ میں اکثر باہمی جاتے ہیں اب ہم انکا ذکر کرتے ہیں جنانچہ
 اول۔ اس۔ کے۔ رس۔ لم۔ بری۔ کائی۔ ڈس۔ یعنی لہو کچھ سے جو مثل میں
 کے کچھ کی ہوتے ہیں۔ انکی تعریف ہم اسلمی نہیں کرتے کہ قاریان کتاب ہذا
 اسے خوب واقف ہو گئے غرض اس قسم کا کچھ بچہ میں اکثر ہوتا ہے اور یہ
 اکثر تو چھوٹی انٹریوں میں اور خاصکر۔ امی۔ لیم۔ انٹری میں رہتا ہے یہ
 معدہ اور بڑی انٹریوں میں بھی گزر سکتا ہے اور قیادستوں کے ذریعہ نکل
 آ سکتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ کے ہونی سے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوتی اور جب
 ہوتی ہے تو بچہ کی ناف پر ایک تیز مڑی کا درد معلوم ہوتا ہے اور وہ نہایت
 فست ہمت اور لاغر ہو جاتا ہے اور بھوک بہت لگتی ہے۔ دوسری قسم کے کچھ
 جو بچہ میں اکثر باہمی جاتے ہیں۔ انکو اصطلاح میں۔ امی۔ کے۔ رس۔
 ور۔ می۔ کیو۔ لی۔ رس۔ بولتے ہیں اور اردو میں چھنی کہتے ہیں جابجائی سکونت
 انکی اگرچہ بڑی انٹریاں میں ہر اکثر یہ معقد کے پاس ہی زیادہ رہتی ہیں۔
 شکل انکی مثل چھوٹی چھوٹی ٹکڑے سوت کی سی ہوتی ہے اور ہر از میں بے حساب حرکت
 کرتی ہوئی باہمی جاتی ہیں۔ اکثر معقد کی چاروں طرف اور چوڑوں کے بیچ میں
 یہ رہتی رہتی ہیں اور کبھی نائیزہ اور فوج کے اندر جا کر خراش پیدا کرتے ہیں
 انکی ہونی سے خراش اور کھجلی اس قدر پیدا ہوتی ہے کہ بچہ کو درد معلوم ہوتا ہے
 اور معقد کا مقام سوچ جاتا ہے۔ یہ باعث شرکت کی دہن اور ناک میں خچا
 پیدا ہوتی ہے بچہ کو انکے بیان آتی ہیں اور معدہ میں درد ہوتا ہے۔ علاوہ

کچھوی

انگو انگریزی مین ورس کتھی مین۔ یہ بیماری بہ نسبت جو انگو کی کچھوی زیادہ تر
سنائی ہی مگر شیر خوار و نگو بہت کم ہوتی ہے۔

اسباب کمزور اور دی بچہ جکا مزاج اسکا ایفولس اور جلی غذا خراب ہوتی ہے اور نگو یہ

مرض اکثر ہو جا یا کرتا ہے۔ خراب جگہ مین بود و باش کرنا بھی باعث اس مرض کا ہوتا

علامات ناف تینک کوی کچھو انگم سی باہر نہ نکلے کوی ایسی خاص علامت نہیں ہے

کہ جس میں یہ مرض پہچانا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ علامتیں بچہ مین موجود ہوں تو

اشباہ اسبات کا ہو سکتا ہے کہ بچہ کے پیٹ مین کچھو ہے چنانچہ بچہ کی رنگت اگر

پسلی ہو اور وہ لاغر ہو جاوے۔ پیٹ اوسکا سخت اور بڑھ جاوے اور ناف میہ

کی مقام پر ایک درد ساتھ پیش کے ہوتا رہے۔ اس مرض مین بھوک اکثر کم

ہوتی ہے ہر بعض دفعہ بہت شدت سے لگتی ہے۔ بچہ گندہ دہن ہو جاتا ہے باخانہ

کبھی تو قبض اور کبھی دست لگ جاتی ہیں اور دستوں کے ہمراہ بہت آؤن آتی

ہی اور اس مرض مین ناک اکثر کھجالتی ہے اور مقعد مین بھی نارش ہوتی ہے

اور کا اگر بڑا ہو تو اکثر اوسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا دل ڈوبا جاتا ہے اس علامتوں

کے موجود ہو نیس گمان کچھوی کا ہو سکتا ہے۔ علامات شرکیہ کچھو ان علامتوں سے

کم نہیں ہیں چنانچہ شرکت کر باعث دماغی علامتیں بھی پیدا ہوتی ہیں اوس

باعث بچہ اچھی طور نہیں سکتا اور سوتی وقت چونک اٹھتا ہے دانت پیتا ہی

انکھیں کھلی رہ سکتی ہیں تھلیان اکثر پہلی رہتی ہیں بچہ بی چین اور نہایت پست

ہمت ہو جاتا ہے۔ درد سر اور کنولش بھی ہو جا سکتا ہے۔ لیکن مجر و نکلے چند

کچھوی کے یہ علامتیں دفناً مفقود ہو جاتی ہیں۔ آلات تنفس بھی اس مرض میں

سبکو ملا کر مقدار ۴ ڈرام کو چھ گھنٹہ بعد بلا دین۔ یہ ساری نسخہ امکیال کے بچہ کو
لئی موزون ہیں *

ٹی۔ بس۔ می۔ سن۔ ٹریکا

اس مرض میں۔ می۔ سنٹری۔ کی گلیٹون کو اندر مادہ ٹیو برکل کا پیدا ہوتا ہے
اور یہ بیماری ایسی بچہ کو ہوا کرتی ہے جنکا مزاج اسکا فیولس ہوتا ہے اور یہ
کہ غریب کی بچہ اس مرض میں زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں اور خراب غذا بھی باعث
اس مرض کا ہے * علامات مرض لاغ اور شکم اوسکا بڑھ جاتا ہے اور
گلیٹان شکم کی پھول جاتی ہیں چنانچہ شکم کو دبانے کی سعی محسوس ہو سکتی ہیں۔ اور
پیٹ میں ایک قسم کا درد مثل سوئیں جھانسنے کے معلوم ہوتا ہے۔ بھوک کبھی تو
زیادہ اور کبھی کم اکثر ترش اور ثقیل غذا کی طرف طبیعت مائل رہتی ہے پانخانہ
کبھی توقہض اور کبھی دست آتی ہیں اور براز کا رنگ سفید مثل کھڑیا مٹی کے
ہوتا ہے۔ ہمیشہ خفیف بخار رہتا ہے۔ ساتھ اس مرض کی بیماری کی پہچانی اور برائیکل
علامت بھی یہی۔ ٹیو۔ برکل۔ پیدا ہوتے ہیں *

علاج۔ مطالب علاج کے یہ ہیں کہ اگر انفلا میشن یا آر سی۔ ٹی۔ شن ہو تو
اوسکورف کرین بیا رکی طاقت کو قاسم رکھیں اور علاج کرین کہ جسٹ گلیٹان چھوٹے
ہو جاوین بس واسطی رفع انفلا میشن کے بچہ کو آب گرم سے غسل دلاوین یا شکم
پر فومن۔ ٹی۔ شن کرین یا شکم پر ٹینکچرف آئیوڈین کی مالش کرین بچہ
کو کاڈ لیور آئیل ہمراہ کوئین کے بلاوین یا آئیوڈائیڈاف پوٹاسیم۔ ساتھ
ڈیکاکشن اف سارسا پر یلا کی استعمال کرین اور غذا مقوی اور سیرج البضم
دیوین *

بلا دین۔ بعد اسکی حسب عمر بچہ کی۔ اپی۔ کی۔ کو انا۔ کا استعمال کرین جہانچہ ایک
 سالکی بچہ کو تین گرین اپی۔ کے کو انا چار چار گھنٹہ بعد دے سکتی ہیں۔ شکم پر فوسٹی
 شن۔ کرین اور جو خون بہت آتا ہوا و پچیش بھی شدت سے ہو تو لاڈ نم کی
 بچکاری کرین (دیکھو افیون فریادین صیان مین) اگر بچہ کو قی ہوتی ہو
 تو معدہ کی مقام پر ایک مسٹرڈ پلاسٹر لگا دیں۔ کہانیگو غذا ہلکی دیوین اور
 جو جون بیماری پرانی ہوتی جاوے ادویات قابض کا استعمال کرین مثلاً۔
 جاک۔ کسپر۔ ہمرہ ٹینکچر اف۔ کی۔ ٹی۔ کیو۔ یا اکسٹرکٹ اف لاگ اوڈ کے
 بلاوین یا شوگراف لڈ کا استعمال کرین یا گیا لک اسڈ ہمرہ سلفورک اسڈ
 اور کہا ونڈ ٹینکچر اف۔ کفر کی دیوین اور بچہ اگر نڈ مال ہو جاوے تو بڑا ہڈی
 پانی کی بلاوین مثلاً ایک سال کے بچہ کو آدھا ڈرام برانڈی دو دو یا تین تین
 گھنٹہ بعد بلا سکتی ہیں مگر اس مقدار کو ایک دفعہ ندین بلکہ اوس مدت میں
 چند قطری ہمرہ تھوڑی سرد پانی کے کئی بار بلاوین۔ یہ تین نسخہ ذیل کو
 بطور اسٹرنجٹ کی اسہال کی بیماری اور پرانی پچیش میں دستون کی روکنی کے لیے
 برت سکتی ہیں جہانچہ نسخہ ۱۔ گیا لک اسڈ۔ آئبہ گرین + کہنا ونڈ ٹینکچر
 ایک ڈرام + ٹینکچر ادپای۔ ۸ بوند + شیرہ۔ ۴ ڈرام + سنی۔ من وائر
 ۵۔ ڈرام + صاف پانی۔ ایک آنس + سبکو ملا کر مقدار ۴ ڈرام کی چھ
 گھنٹہ بعد بلاوین + نسخہ ۳۔ اسی۔ ٹ۔ اف۔ لڈ۔ ۶ گرین +
 ڈا بلوٹ اسٹیک ہنڈ۔ ۱۰ بوند + لاڈ نم۔ ۸ بوند + سیوسلج۔ ۴ ڈرام +
 سرپ اف بنجر۔ ایک ڈرام + صاف پانی ۱۲۔ ڈرام + سبکو ملا کر مقدار
 ۴ ڈرام کے چہ چہ گھنٹہ بعد بلاوین + نسخہ ۴۔ سلفٹ اف ایرن۔ ۴ گرین +
 لاڈ نم ۴ بوند + سرپ اف آبیج۔ ۴ ڈرام + عرق سونف۔ ۱۰ ڈرام +

فمنحہ ۴۰ اکٹر اٹ اف - ہی - مٹاک - زامی - لن - ایک ڈرام ۴ ٹینکچراف
 کر - ٹی - کیو ۴ ڈرام ۴ شیرہ ایک ڈرام ۴ غرق سونف ۱ ڈرام ۴
 سکو ملا کر بمقدار ایک ڈرام کے دینین تین یا چار دفعہ بلا دین ۴

ڈی سٹری - یعنی بچش

علامات کبھی تو بہیم بیماری بعد دایا یا کے شروع ہوتی ہیں اکثر یہ از خود
 شروع ہو کر خفایت تکلیف دیتی ہے چنانچہ جب بہیم بیماری دفعتاً ظاہر ہوتی
 ہے تب اکثر قی کی علامت شروع ہوتی ہے بچہ کو ایک یا دو روز تک اس شدت
 سے تڑپتی رہتی ہے کہ ایک قطرہ پانی کا بھی معدہ میں قرار نہیں پاتا اور
 ساتھ اس کے دست لگ جاتے ہیں پہلی تو بہیم دست براز کے ہوتے ہیں
 لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد بچہ کو آؤن اور لہو کر دست ساتھ بچش اور درد
 بار بار آنی لگتی ہیں بعض دفعہ دستوں کی رنگت سبز اور انہیں برانہ بھی ہوتا ہے
 اس مرض میں جسمی علامات بھی شدت سے ظاہر ہوتی ہیں چنانچہ کچھ جسم کی قدر
 گرمی میں نیز کمال بقراری اور مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے چہرہ دب جاتا ہے اور
 طفل خفایت نڈال ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ حالت غشی کی اسپر طاری ہوتی
 ہے اور کبھی کنولشن بھی ہو جاتا ہے اس حالت سے یا توج جاتا ہے یا پھر ہی ہوتا
 ہونی لگتی ہے جبکہ کہ ایک - ڈی سٹری - بولتی ہیں چنانچہ اس وقت بھی است
 آتی - تھیں میں اور وی دست تھوڑی تھوڑی اور پتلی سبز رنگ کی ہوتی ہیں اور کبھی
 انہیں آؤن اور لہو اور پپ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے بچہ نہایت لاغر اور کمزور
 ہو جاتا ہے اور جسم پر اوسکی جھجھکیاں پڑ جاتی ہیں بھوک مر جاتی ہے اور جو کچھ
 کھاتا ہے وہ مضم نہیں ہوتا علاج فتم شدید میں بچہ کو پہلے تھوڑا اکٹر ایل

ہوتا جاتا ہے آنکھیں اوسکی دب جاتی ہیں اور چہرہ دبلا پڑ جاتا ہے اور بچہ کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے جب اسہال کی بیماری دانتوں کی نکلنے کی باعث ہوتی ہے تب وہ بدیخ ہوتی ہے اور دب رنگ رہتی ہے۔ علاوہ ازیں ساتھ اس اسہال کی زکام کی علامتیں بھی موجود ہوتی ہیں اور یہ اسہال اور زکام تب تک رہتا ہے جب تک دانت نکلے لیکن جب دوسرا دانت نکلے گا تو تب بچہ شروع ہو جاتا ہے +

علاج ابتدا میں مین بیماری غذا کا بندوبست کریں اگر دودھ ہضم نہوتا ہو تو دو بار گھٹہ کے لٹری ماکا دودھ مذکور بچہ کو صرف آتش جو یا چونیکا پانی بلاوین اور گرگوریز۔ پاؤڈر ہمراہ عرق سولف کے بلاوین اور جب یہ بیماری دانت کی نکلنے کے باعث ہو تب اوسکو دقتانہ روکین۔ دانت کی نکلنے سے یہ مرض از خود رفع ہو جاتا ہے پس اگر مناسب سمجھیں تو اوس دانت کو چیر دیں۔ لیکن دست اگر بار بار اور بہت پتلی آویں کہ جس سے بچہ کی طاقت زایل ہوتی جاوے تب البتہ اسہال کو روکنا چاہئے چنانچہ اوس وقت ادویات کا بعض کا استعمال کریں مثلاً بچہ کو چاک مکسچر بلاوین یا چاک مکسچر ہمراہ ٹینکچر اف۔ کے۔ ٹی۔ کیو۔ کو دیوین چنانچہ ہم ہینر سے لیکر ایک برس کی عمر کے بچہ کو چاک مکسچر ایک ڈرام اور ٹینکچر۔ کے۔ ٹی۔ کیو۔ ۱۰ بوند فی دست کر بعد دی سکتے ہیں یا ہینر تو شوگر۔ اف۔ لڈ مکسچر کا استعمال کریں۔ مثلاً نصف گرین شوگر اف۔ لڈ ایک بوند ڈائسلوٹ اسٹیک اسڈ اور ایک ڈرام پانی چھ ہینر سے لیکر ایک برس کی عمر کے بچہ کو فی دست کے بعد بلاوین اور شوگر۔ اف۔ لڈ کی بچکاری بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر اگٹ اف۔ لاگ۔ اوڈ بھی بچہ کو اسہال میں نہایت مفید پڑتا ہے چنانچہ یہ نسخہ ایک سال کے بچہ کو لٹری موزون سے +

خون رفع ہونے لگتا ہی تب پھلے وہ مقام بزد ہو جاتا ہے اور تب ایک عرصہ کے بعد حالت اصلی پر آ جاتا ہے جلد اور پیٹھ و نسا فعل جب بخوبی انجام نہیں پاتا ہی تب اصل جاندیس پیدا ہوتا ہی یا مجری صفر کے بند ہونی سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے **حلاج** اس مرض کا مختصر ہے چنانچہ بچہ کو سردی سے بچا دین اور سوای شیر مادہ کی اور کوئی شے اوسکو کھانے ندین۔ اگر باخانہ قبض ہو تو ایک یا نصف گرین کیا لو مل کھلا کر نپوڑا سا کسٹریل پلا دین۔ اس علاج سے بیماری بہت بترفع ہو جاتی ہی کیونکہ یہ مرض ایسا خفیف ہے کہ اکثر اوقات بلا علاج کے ہی از خود رفع ہو جاتا ہے +

ڈایا۔ ریا۔ یعنی اسہال

یہ بیماری چھ مہینے سے لیکر ۲ برس کی عمر کے بچوں کو اکثر ہوتی ہے یعنی اوسن ایام میں کہ جب دانت نکلتے ہیں +
علامات اسکی یہ ہیں کہ اس بیماری میں پہلے قی ہو ا کرتی ہے اور جب وہ موقوف ہو جاتی ہے تب دست شروع ہوتی ہیں یہ دست تھلی اور متعفن ہوتی ہیں اور رنگ انکا میلا لیکن اکثر سبز ہوتا ہے۔ باعث اس سبز رنگ کا مہنہ زرد یا سفید ہوا لیکن ایسا قیاس کہتے ہیں کہ معدہ کی ترشی جس وقت صفر کو ساتھ ملتی ہے اوس وقت دستوں کا رنگ سبز ہو جاتا ہے اور بعض کی رائی یہ ہے کہ خون کے بدل جانے سے سبز رنگ پیدا ہوتا ہے۔ دستوں کی آئینی بچہ کی بہو ک کم ہو جاتی ہے زبان مرطوب اور درمیان سے کسی قدر سفید ہوتی ہے۔ شکم ملائم رہتا ہے اور دست اکثر ملا دیکر آیا کرتے ہیں لیکن بعض بچہ پھر ڈاڑھ کو کر دست آتا ہے اور جون جون دست آتے جاتے ہیں بچہ کمزور اور لاشعز

کھلاوین کہ جس سے معدہ کو بارنگذرے اور امتلا اور متداخل نہونی پاویں۔ تھیل اب ہو
اس مرض کی لئے مفید ہے اور ادویات از قسم مقویات کی فائدہ بخشیں ہیں۔ چنانچہ
ڈائلیوٹ سلفیورک اسڈمہراہ انفیوژن چرتیا یا جیشن کے دیوین یا ٹائیڈرو۔
کلورک اسڈمہ کپاؤنڈ ٹینکراف سکونا کر بلاوین۔ اگر بچہ کو بار بار قی ہوئی ہو
اور معدہ میں ترشی زیادہ باقی جاوے تو چونے کا پانی بلاوین اور ساتھ
اسکے اگر قبض بھی ہو تو اس نسخہ کا استعمال کریں + نسخہ +

کاربونٹ ان گیشیا + ہگرین + روبرب - ۳ گریں + عرق سولف - ایک
ڈرام + سبکو ملا کر ایک خوراک کریں اور ایسی ایک ایک خوراک دینیں چار یا
پچھتہ دفعہ بلاوین یہ نسخہ چھ جنیور سے لیکر ایک سال کی بچہ کے لئے موزوں ہے +

جان - ڈس یعنی یرقان

اسکو اصطلاح میں - اکر - ٹی - رس - بولتو ہیں اور اردو میں کنول کی
بیماری کہتی ہیں یا درکھنا چاہی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیدائش کے قریب
روز بعد بچہ کی رنگت زردی مائل ہو جاتی ہے اور یہ زردی تدریجاً رفع
ہو جاتی ہے لیکن ساتھ اسکے تو بچہ کی صحت میں فرق پڑتا ہے نہ اسکی آنکھیں
زرد ہوتی ہیں اور نہ شکم میں کسی قسم کی خرابی پائی جاتی ہے اگرچہ اس
حالت کو بھی یرقان کہتی ہیں مگر یہ اصل یرقان نہیں ہے کیونکہ یہ حالت ان
بچوں میں پائی جاتی ہے کہ خلی حلبہ میں زیادہ اجتمع خون کا ہوتا ہے
غرضیکہ جب وہ خون ہٹنے لگتا ہے تو حلبہ پہلے زردی مائل ہو جاتی ہے اور بعد
از ان رنگت اسکی حالت اصلی پر آ جاتی ہے جیسا اس وقت ہوتا ہے
کہ جب کوئی مقام کھل جاتا ہے اور وہاں خون اگر جمع ہوتا ہے اور جب وہ

دینی کیا لوکل کے تین بن یا چار چار گنٹہ بعد تھوڑی تھوڑی مقدار میں - بائی - کا
 بوٹ - اف - پوٹاش - سہراہ مائیڈر - وسپانک - اسڈکو پلائی جاوین چونکہ متواتر ہے
 کا ہونا ایک علامت بدہضمی کی ہے نواب ہم اسکا بیان کرتے ہیں +

ڈس پی شیا یعنی بدہضمی

واضح ہو کہ یہ مرض اکثر اون بچوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جنکا مزاج اسکر ایفولس تھا
 اور جب ایسی بچوں کا ماضیہ چند مہینے تک بگڑا رہتا ہے تب اونکو سہل کی بیماری
 ہو جاتی ہے + علامات اسکی یہ ہیں کہ بعض دفعہ ہو کہ بالکل مرجاتی ہے
 بچہ سست اور رنگت اسکی پیکی پڑ جاتی ہے دودھ کم پیتا ہے اور وہ بھی جلدی
 کی ذریعہ سے نکل آتا ہے اور تھوڑی عرصہ بعد پنی دودھ کے بچہ بقرار ہو کر معدہ میں
 درد کے باعث رونی لگتا ہے اور جب تک قی نہوے تب تک بی چین ہو کر رونی لگتا ہے
 اور جب جا ہوا دودھ نکل جاتا ہے تب اسکو آرام آتا ہے مگر پردودھ کے
 پیو سے ویسا ہی ہو جاتا ہے بعض دفعہ قی نہیں ہوتی بلکہ اسکی عوض میں بچہ کو
 بار بار ترش اور بدبودار ڈکار آتے رہتی ہیں اور دستوں بھی نہایت نقص
 آتی ہے - پاخانہ اکثر قفص رہتا ہے اور جودست آتی ہیں تو وی نہایت بدبودار
 ہوتی ہیں اور رنگ اونکا میللا یا سبزی مائل ہوتا ہے اور انہیں جھجھو دودھ
 کی پیکیاں ہوتی ہیں +

علاج اس مرض کا علاج صرف دوا ہی پر منحصر نہیں ہے تا وقتیکہ بچہ کی
 خوراک کا بندوبست کیا جاوے گا دوا سی کہیہ فائدہ نہوگا چنانچہ جس بچہ کا ہانہ
 بگڑ گیا ہوا اسکی خوراک کم کر دینی چاہئے بلکہ ایک کریں کہ تھوڑا تھوڑا اور بار بار

مقالہ دوم

امراض شکم

امراض معدہ - قی جو انون کی نسبت بچہ نگو اکثر قے زیادہ ہو کرتی ہے اور یہ قے اکثر اوقات شرمی ہوتی ہے مثلاً پلوڑا یا پھپھڑون کی بیماریوں میں یا ابتدائی امراض دماغ میں یا جب بچہ نگو چپک نکلنے والی ہوتی ہے اور بعضی کی باعث بھی اکثر قے ہو کرتی ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ دفعہ شامی کرنے لگتا ہو اور کوئی شے اوکے معدہ میں قرار نہیں پاتی۔ جب اسباب مذکورہ بالا کے کسی سبب سے بھی بچہ کو قے ہونی لگے تو اسکو دودھ پنیوین اور دو گھنٹہ تک نہ تو اسکو غذا اور نہ کوئی دوا دین بعد اسکے یا تو ایک یا دو چھپے آب سرد کے یا چونکی بانی کے پلاوین اگر ان چیزوں کو معدہ قبول کرے تو تھوڑا تھوڑا آتش جو پلاوین اور بعد آہٹ یا دس گھنٹہ کے اگر قے نہ ہو تب یا تو ماکا دودھ پلاوین یا شیر گاؤ میں تھوڑا سا پانی ملا کر تھوڑی تھوڑی مقدار میں پلاتے جاوین اور جب ان چیزوں کو بھی معدہ قبول کرے تو صرف ماکا دودھ پلاوین جب قے اتفاق سے ہوتی ہے تب تو ان تدبیروں سے وہ رک جاتی ہے۔ جب معدہ یا امعاء کی خرابی کے باعث ہوتی ہے تب البتہ دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ اس وقت حسب عمر بچہ کی جو تھامی یا نصف یا ایک گریں کیا لول زبان پر مل دین اور اوپر کی ترکیب سے اسکو غذا اور دودھ پلاوین اور جو قے تھیر بھی نہ کی تو معدہ کی مقام پر ایک چھوٹا سا مسٹرڈ بلاسٹر لگا دین اور بعد گھنٹہ

ٹینکچر اف آئیوڈین کی مالش کرین اور جب ان ترکیبون سی فائدہ نہو تو انکو
کاٹکر نکال ڈالین *

پی۔ روٹائی۔ ٹس

اصطلاح میں اس مرض کو سائی۔ نن۔ کے۔ پی۔ رو۔ ٹی۔ ڈیا۔ ہی بولتے ہیں
اور عام انگریزی میں مپس اور اردو میں کن پٹیری کہتے ہیں۔ یہ بیماری
دبائی ہے اور ایسی مقاموں میں اکثر ہوا کرتی ہے کہ جہاں بچہ نکاح بہت اجتماع
ہوتا ہے مثلاً مدرسوں میں۔ سردی کا لگنا بھی باعث اس مرض کا ہے۔ اس
بیماری میں ایک یا دو نو طرف کے۔ پی۔ رائٹ۔ گلائڈ پھو لکر درد کرنے لگتی ہیں
اور ساتھ انکی قرب کے گلیان بھی پھول جاتی ہیں۔ پھل اس میں کسی قدر
بخار اور زکام کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور چند گھنٹہ بعد گلے میں درد اور
چبانے اور نگلنے میں کمال تکلیف ہوتی ہے اور تبھی سے ایک یا دو نوں جانب
کی گلیان پھولنے لگتی ہیں اور رفتہ رفتہ پھولکر نہایت تن جاتی ہیں رنگ
ادستقام کا اکثر تو بدلتا نہیں پر بہ سبب دباؤ و ریدون بعض دفعہ سرخ ہو جاتا
اگر ورم زیادہ ہو تو نگلنا دشوار ہو جاتا ہے اور بچہ کو بخار اور ہڈیاں بھی ہو
جاتا ہے اور ۵۔ یا ۶ دن سی لیکز یا پندرہ دن کے بعد مرض کم ہونی لگتا ہے
بعض دفعہ گلیوں میں پیپ بھی پڑ جاتی ہے اور کبھی یہ مرض بستان اور خضبوٹیز
بھی انتقال کر جاتا ہے مگر ایسا نادر ہوا کرتا ہے *

علاج مقام ورم پر آب گرم کی تمکید کرین یا پولس بانڈ میں یا انہر چنڈ
جو کچین لگا دیں اور جو پ پڑ گئی ہو تو اسکو نکال دیں *

آخر کار مریض کا مرغ روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتا ہے +
علاج چونکہ یہ بیماری اندر کی طرف سے باہر کو بڑھتی ہے تو ماؤف جانب کی
 گال کے اندر خالص نائٹرک اسڈ بذریعہ روئی یا لنٹ کی لگا دین اور بعد بارہ
 گھنٹے کے اگر مناسب سمجھیں تو پھر اس تیزاب سی اوس مقام کو جلا دین اور گرم
 پانی اور کلورائیڈ اف لائیم کے عرق کی بچکاری منہ کے اندر کرین تاکہ جو شرا
 گوشت وغیرہ ہو وہ نکل آوے اور بدبو بھی کم ہو جاوے۔ اگر زخم اچھا نظر آوے
 تو خالص نائٹرک اسڈ کے بار بار لگانا کافی ہے کچھ ضرورت نہیں اوس صورت میں
 یا تو ڈائیلوٹ اسڈ لگا دین یا منہ کے اندر کلورائیڈ اف لائیم کی بچکاری
 کرین اور مریض کو دوا اور غذا مقوی دیوین مثلاً کلورٹ اف پوٹاش
 ہمراہ کمپاؤنڈ ٹینکچرف سسکوناکو پلاوین یا کوئین یا فولاوکی مرکبات کا استعمال
 کرین اور کہا نیکو شور بادودہ ہمراہ شراب کی دیوین فقط

طمان سی۔ لائی۔ ٹس یعنی خناق

اس مرض میں حلق کا سیو کس ممبرین سبب اجتماع خون کے سرخ ہو جاتا ہے اور اسل
 گلائڈ یعنی لوز میں ہو لکڑ بڑھ جاتے ہیں + علامات اسکی یہ ہیں کہ سوتے
 وقت بچہ کی ناک سے خراش کی آواز آتی ہے اور آواز بجاری ہو جاتی ہے اور
 اگر وی کلٹیان بہت بڑھ جاوین تو بچہ کسی قدر بہرا بھی ہو جاتا ہے اور دم
 لینے میں اسکو تکلیف ہوتی ہے۔ ساتھ ان علامتوں کے بعض دفعہ بچہ کو بخار
 بھی ہوتا ہے +

علاج گلیٹون پرینکری کا سفوف یا خشک نائٹریٹ اف سلور لگا دین اور باہر

جسم کسی اگلی بیماری کے باعث لاغز اور کمزور ہو گیا ہو منہ سے بد بو آتی ہے اور
 بد بو دار نہوک بہتا رہتا ہے بعد ازاں گال پہو لکرتن جاتا اور سرخ اور چمکیلا
 نظر آتا ہے اور اوسکے درمیان کا مدور مقام بہ نسبت گرد کے زیادہ تر سرخ
 نظر آتا ہے گال تنکرا سفید سخت ہو جاتا ہے کہ منہ اکثر کھولا نہیں جاتا یہ بیمار
 اکثر ایک ہی طرف اور ایک ہی گال میں محدود رہتی ہے اور بعض دفعہ سوجھی
 لب پر پھیل جاتی ہے اور گال سے گامی دیا لینی شروع بھی ہوتی ہے اور اگرچہ
 بعض اوقات اوپر کی لب تک بھی پھیل پڑتی ہے تاہم دیا لینی کبھی شروع نہیں
 ہوتی۔ اب اگر منہ کے اندر ملاحظہ کیا جاوے تو باہر کے مدور سرخ مقام کو مقابلہ
 پر ایک گہرا گہدا ہوا زخم نظر آئے گا کنارے اسکو ٹھہری بنیکے اور اس پر ایک سیاہ رنگ
 پھٹا ٹوٹا سلف ہوتا ہے اور زخم کے مقابلہ کے سوطری سیاہ اور زخمی ہونی میں
 اور دانت ہلکی لگتی ہیں اور جب یہ بیماری ترقی پکڑتی ہے تو اس طرف کی گال
 کی اندر کی ساخت ساری سیاہ اور سیاہ سلف سی بری ہوئی ہوتی ہے اور دانت
 ایک ایک گرنی لگتی ہیں اور کبھی جبری کی ہڈی میں بھی زخم پڑ جاتا ہے نہوک
 نہایت بد بو دار اور میل رنگ کا ہوتا رہتا ہے اندر کی ساخت کو ساتھ چہرہ پر بدیغیرات پیدا ہوتے ہیں کہ باہر کا دور
 اور سر پہلے ہی بنائی اور میان کا حصہ جو ہٹا کر سرخ ہوتا وہ بڑھتا جاتا ہے اور اوسکے
 بچوں پر ایک سیاہ مدور نقطہ نمودار ہو کر خفایت ملد بڑھتا جاتا ہے۔ بعد اسکو ایک
 سرخ دائرہ اوسکو گرد جب پیدا ہوتا ہے تب گنگرین موقوف ہو کر سلف علیحدہ
 ہونی لگتا ہے اوس وقت منہ کے اندر کا سیوکس مبینہ گلا ہوا اور سیاہ نظر آتا ہے
 اور خفایت بد بو پیدا ہوتی ہے ابتدا ہی سے اس مرض میں چندان درد نہیں ہوتا
 بہر حال اکثر سست اور مقرر رہتا ہے۔ چون چون بیماری بڑھتی جاتی ہے مضمض
 گھٹتی جاتی ہے اور موت کو چند گھنٹہ پیشتر تک سہی بہوک چون کی تون رہتی ہے

لگتی ہیں اور منہ کو اندر گول گول یا بیضاوی شکل کے چھوٹے چھوٹے زخم پیدا ہوتے ہیں اور اون زخموں پر سفید مایل بزدی چھوٹے چھوٹے سلف ہوا کرتے ہیں +
علاج اس مرض کے علاج میں شکم کے بگاڑ کا لحاظ رکھنا چاہیو کیونکہ اس کے باعث یہ مرض پیدا ہوتا ہے اور جب وہ بگاڑ رفع ہو جاتا ہے تب یہ بیماری بھی از خود دفع ہو جاتی ہے زخموں پر پٹکری یا سوٹا یا عرق نائٹریٹ - اف سلور کا (ہ گرین ایک انوس مین) لگا دین +

قسم دوم اسپن رال ہوتی ہے اور منہ سے بد بو آتی ہے اکثر اوپکے مسوڑی بہت آہول جاتی ہیں اور جیڑی کے نیچے کی گلیاں بہو لکر بہت درد کرنے لگتی ہیں - مسوڑی سرخ پھولی ہوئے اوپلے معلوم ہوتی ہیں اور اوکے کنارے وینر ایک سخت رطوبت میلے رنگ کی لگی رہتی ہے انکو اکھاڑنے سے زخم نظر آتے ہیں پہلی تو یہ زخم صرف سامنے کے مسوڑ وینر پیدا ہوتے ہیں مگر رفتہ رفتہ دانتوں کے ارد گرد اور پیچھے کے مسوڑ وینر بھی زخم پر جاتے ہیں تب دانت ڈھیلے ہو کر اکثر گر پڑتے ہیں اور لبوں اور گال کا جو حصہ اون مسوڑوں کے مقابلہ پر ہوتا ہے اس پر بھی زخم پڑ جاتے ہیں +

علاج اس مرض کے لئے کلورٹ - اف - پوٹاش بہت مفید ہے چنانچہ اگر ضرورت ہو تو بچہ کو پھلے ایک جلا - دیکر تین گرین سے ۵ گرین کلورٹ اف پوٹاش چار بار گھنٹہ بعد پلا دین اور زخموں پر نائٹریٹ اف سلور کا عرق لگا دین اس علاج سے ہفتہ یا عشرہ کے اندر مریض کو صحت ہو جاتی ہے +

قسم سوم - اسکو گنگری - سن - اسٹو - می - ٹائی - ٹس - اور کنڈیم اورس بھی بولتے ہیں - یہ مرض اکثر مہلک ہو جاتا ہے - یہ بیماری اکثر گال کی اندر اگر سیکس ممبرین سے شروع ہوتی ہے اور اکثر اون بچوں کو ہوا کرتی ہے جنکا

حصہ سوم

مقالہ اول

امراض گلو اور دہن

۱۔ اسٹو۔ می۔ ٹامی۔ ٹس

یعنی سوزش دہن

یہ مرض تین قسم کا ہوتا ہے اول وہ جسمین منہ کے اندر کی چوٹی چوٹی۔
 گلو پیر زخم پڑ جانے میں اور دوسری زخم خود بخود چند روز بعد خشک ہو جاتے ہیں۔
 دوم وہ جس میں سوڑے زخمی ہو کر گل جانے میں دانت لگی ہو جاتا ہیں اس مرض کے تیسرے
 قسم میں گال کی ساخت گلو لگتی ہے اور اکثر کسی دواسی وہ زخم نہیں رکھتا۔
 قسم اول اسکو افنتی بھی بولتے ہیں یہ مرض یا تو می۔ ڈس کے ہونے سے ہوتا ہے
 یا از خود بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ از خود پیدا ہوتا ہے تب ہمیشہ معدہ کے
 بگاڑ سے ہوتا ہے اور پانچ برس کی عمر کے بعد یہ اکثر نہیں ہوتا اور اس میں ہتھوڑا
 بہت بخار رہتا ہے بہوک مر جاتی ہے بچہ بقیار رہتا ہے اور چند روز قبل از ظاہر
 ہونے اس مرض کو اسکو دست لگ جاتے ہیں دودھ پنی یا کھانا کھانی میں اسکو
 تکلیف ہوتی ہے منہ سے رال بہتی رہتی ہے اور دہن کی گلیان بہو لکھو رکھنے

زیادہ ہوتی جاوے اور اسکی خورد و نوش اور پوشاک اور ریاضت اور تعلیم کے
باب میں نہایت حفاظت کریں ان ساری باتوں کا ذکر حصہ اول انتظام مہیاں میں
نشر کیا لکھا ہے علاج اوس وقت کا کہ جب یہ مرض شروع ہو جاوے مقویات
سی کرتے ہیں چنانچہ + فولاد - کوہن - اور معدنی تیزاب - لیکن بچہ کو اگر دست
آتی ہوں تو بعض اونکی اکثر کٹ اف باک اور اکثر کٹ اف لاگ اوڈ کا استعمال
کریں جس صورت میں کہ گلے کی گھٹیاں بڑھ رہی ہوں اوس حالت میں سرپ اف -
آئینو ڈائیڈ اف ایرن مفید پڑتا ہے اور ایسی مرہون کو کا ڈ لیور - آئیل سی بھی
فائدہ ہو کر تا ہے مگر اکثر بچوں کو یہ دوا موافق نہیں پڑتی اسکے پیوسے یا تو
اوڈ کو فی ہو جاتی یا دست لگ جاتی ہیں + جی منٹے اور نو بیتی کہانی ٹائیڈ ریونک
اسڈ سی بچوں بی رفع ہو سکتی ہے چنانچہ یہ نسخہ بہت مفید ہے + نسخہ
ڈائیسیوٹ ناٹریک اسڈ ۱۶ بوند + ڈائیسیوٹ ٹائیڈ روکلورک اسڈ ۴۴ بوند
ڈائیسیوٹ ٹائیڈ روسپانک اسڈ ۸ بوند + کلورک ایٹھ ۴۴ بوند + ٹینکچارج
پیل ۱ - ڈرام + شیرہ - ۴ ڈرام + ڈبیلڈ واٹر ۴ - آفوس +
سکولاکر بمقدار چار ڈرام کے چمچہ گنٹہ بعد پلاوین - یہ نسخہ چار سال کے بچہ
کی لئی موزون ہے سینہ پر کسی اسٹی - میوٹ لنی منٹ کی مالش کریں او
کلاویکل - ڈی کے نیچر پیہ برابر ایک بلشر بٹھا دیں کہ جس سے نہایت فائدہ ہو
کہانی کے رفع کرنے کے لئی معمولی کہانی کی دوا وٹکا استعمال کریں مثلاً وائیم
اپی کے - کوانا - اور انٹی موئل وائین پاراگورک وغیرہ +

دوم اسکلٹی رشن کی بعض علامتیں ایسی ہیں کہ جنکے وسیلہ سے جو انون کی رسل کی بیماری بخوبی تشخیص ہو سکتی ہے پر وہی علامتیں یا تو بچوں میں یا ہی نہیں جاتیں یا اونکا دریافت کرنا مشکل ہوتا ہے مثلاً مریض کی تکلم کی آواز جو بواسطت پہنچتا ہے مین لگائی ہوئی سنائی دیتی ہے یہ آواز جو انون کی مرض کی تشخیص کے لئے نہایت معتبر لیکن چونکہ بچوں کی آواز یکساں نہیں ہوتی یعنی کبھی تو بڑی تیز اور کبھی دبیسی اور کبھی بلند ہوتی ہے اسلئے اسکے ذریعہ سے اونکی رسل کی بیماری کی تشخیص نہجائی نہیں ہو سکتی۔ پس بچوں کی رسل کی بیماری میں یہ پانچ باتیں خاصکر پائی جاتی ہیں اول ابتدا مرض میں سینہ کی علامتیں اکثر پوشیدہ رہتی ہیں دوم ابتدا مرض میں خون کا بلغم اکثر نہیں آتا اور اخیر کے دو جن میں ہی کم آیا کرتا ہے سیوم بلغم یا تو بالکل نہیں یا شاذ ہی آیا کرتا ہے چہاں م بچہ کو پسینہ بہت کم آیا کرتا ہے اور علامات رویہ اچھی طور پر ظاہر نہیں ہوتیں۔ پنجم رسل کی بیماری کے بچے اکثر برانکاٹیس یا نیو۔ مونیاس کے سبب مر جاتی ہیں +

یا در کہنا چاہیے کہ بعض مفع ایسا ہی ہوتا ہے کہ رسل کی بیماری دفعتاً پیدا ہو کر تھنا جلد مہلک ہو جاتی ہے اور یہ کہ بچوں کی رسل کی بیماری کے ساتھ نیو۔ مونیاس اکثر ہو جاتا ہے +

علاج حفظ ما تقدم۔ اسلئے تاکہ یہ مرض نہونے پائی پھلے سے اسکی حفاظت کرنی چاہیے مثلاً شروع ہی سے بچہ کی طرف خیال رکھیں حتی الوسع والدہ ہی کا دودھ پلایں اور ترکیب مصنوعی سے اسکی پرورش نہ کریں لیکن بچہ کی والدہ میں یا اسکے خاندان کے کسی میں اگر رسل کی بیماری کی بنیاد پائی جاوے تو ہرگز اسکا دودھ بچہ کو نہ پلاوے بلکہ ایک تندرست دائی مقرر کر کے اسکا دودھ بچہ کو پلاوے۔ خاصکر دانستہ کلوت وقت بچہ کی حفاظت کریں (دیکھو حصہ اول انتظام صبیان) اور چون چون بچہ کی عمر

فیور۔ اکثر کسی خاص علامتوں سے شروع ہوتا ہے اور اگر ان علامتوں کا لحاظ رکھا جاوے کہ اگرچہ بخار مذکور خفیف بھی ہوتا ہم اس میں جسم نہایت گرم ہوتا ہی نبض نہایت جلد چلتی ہے تشنگی شدت رہتی ہے اور رات کی وقت ہذیان ہوتا ہی تو اس میں اور سہل کی بیماری کے پھلے درجہ میں بخوبی فرق کر سکتے ہیں کیونکہ اس مرض کی پھلے درجہ میں علامتیں پیدا ہوتی ہیں وہی خفیف اور متلون ہوتی ہیں لیکن ان جب سہل کی بیماری شدید ہو کر جلد گزر جاتی ہے تب البتہ بخار مذکور اور اس میں فرق کرنا دشوار ہوتا ہے۔ اور کرم کی بیماری اور سہل میں فرق کرنا تو نہایت آسان ہے کیا معنی کہ کرم کی مرض میں جسم کی حرارت حالت صحت پر رہتی ہے بہوگتہ شدت سے اور کبھی ہوتی بھی نہیں اور زبان کبھی صاف اور مرطوب اور کبھی نہایت سیلی ہوتی ہے اور دم لینے میں تکلیف نہیں ہوتی جیسی سہل کی بیماری میں ہوا کرتے ہی اکثر اس میں قبض رہتا کرتا ہے اور علامات لینے سے کرم کی بیماری کو ہمیشہ تخفیف ہو جاتی ہے +

علامات آسکٹی رشن۔ اور پرکشن کے۔ یہ علامتیں ہی بہت سی باتوں میں جو ان کی مرض کی علامتوں سے مشابہت رکھتی ہیں چنانچہ اول ان علامتوں میں بہتری ایسی علامات ہیں کہ جبہ چندان اعما و خضیں کیا جاسکتا یا وہی بہت جو ان کے بچوں میں چندان معتبر نہیں ہیں مثلاً جو ان کی وجہ سہل کی بیماری ہوتی ہے تو سب سے پہلے تنفس کی آواز تیز اور ایک خشک آواز جسکو ڈورائی کہا کرتے ہیں سنائی دیتی ہے اور خاص کر جب یہ آواز نکلا۔ ویکل ڈھری کے نیچے سنائی دیتی ہے تب تو ہم زیادہ معتبر ہوتی ہے مگر چونکہ بچوں کے پیٹروں میں بادہ ہو کرکل۔ کا کسی خاص جگہ نہیں پیدا ہوتا بلکہ ساری پیٹھ سے میں یکساں کل آتا ہے اسلیئے ان میں وہی علامتیں جتنا ذکر بھی کیا ہے چندان معتبر نہیں ہو سکتیں +

مرض تھائی۔ سس

اسکو انگریزی میں کن۔ نرم۔ شن۔ اور عربی میں سل کہتے ہیں اور جسکو سل
 ہو جاتی ہے اسکو مسلول بولتے ہیں حقیقت اسکی بھج ہے کہ اس مرض میں پیٹھ کے کمر
 ساخت میں ایک مادہ دانہ دار پیدا ہوتا ہے جسکو اصطلاح میں ٹیو۔ برکل بولتے
 ہیں علامات۔ اس مرض میں جو علامات پیدا ہوتی ہیں بہت سی باتوں میں
 وہی بچوں اور جوانوں میں نہایت مشابہت رکھتی ہیں مگر کئی باتوں میں فرق ہے
 کہ صرف جنگا ہم ذکر کریں گے چنانچہ اس حالت میں بھی کہ جب یہ مرض بچوں اور
 جوانوں میں پکسان ہوتا ہے کسی درجہ مرض میں بچہ خون نہیں تھوکتا اور بلیغم
 آتا ہے اور جو آتا بھی ہے تو بہت کم۔ کہا لسی نسبت جوانوں کے بچوں کو کم ہوتی
 ہے اور شدت کا پیمینہ جو اس مرض میں جوانوں کو آیا کرتا ہے بچوں میں یہ علامت
 بہت کم پائی جاتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہا لسی کے آنے سے کئی مہینوں
 پیشتر سے بچہ بہت لاغراور کمزور ہو جاتا ہے بہوک اسکی مر جاتی ہے اور سینہ
 اور شکم میں ادھراودھردرد بتلاتا ہے تب گمان سل کی بیماری کا ہوتا ہے
 اگر کہا لسی ہوتی بھی ہو تو کم اور تھوڑی تھوڑی اور خشک کہیل کو دگی طرف بچہ
 کی طبیعت کم مایل ہوتی ہے۔ دن پر چپ جائیگا بہوکریٹھا۔ ہتا ہوا اور چون چونات
 قریب آتی جاتی ہے جسم گرم اور خشک اور لب بھی سوکھ جاتی ہیں۔ پران۔
 علامتوں میں اسقدر کم استقلال ہے کہ حکیم کو ادنیٰ ظاہر ہونے سے یا تو گمان رسی
 می ٹنٹ۔ فیور یا اسبات کا خیال ہوتا ہے کہ بچہ کے شکم میں گرم ہے لیکن ان
 دونوں مرضوں کی تشخیص بھی بخوبی ہو سکتی ہے چنانچہ۔ رسی۔ می۔ ٹنٹ۔ فیور۔

جانی ہیں۔ جب ہو پنگ کا ف اسطور سو گزرنے لگتا ہے تب سوا اسکی کہ بچہ کو ٹری کر
بچا دین اور غذا سیرج الہضم اور مقوی ڈین اور ادویات کی کچھ ضرورت نہیں
ہوتی مگر حبیب بہ بات ہو کہ بیماری کی شدت رفع ہو جاوے مگر سینہ کو اندہ بلغم زیادہ
جمع ہو اور وہ ہر کہا نسی کے بعد قے کے ساتھ نکلتا ہو بچہ کی نبض کمزور اور
جلد سرد ہو تو اس حالت میں پشکری کا استعمال کریں۔ اس سے بلغم کم ہو جائے
قوی رنگ جائے گی اور کہا نسی کی توانر بھی کم ہو جائے گی چنانچہ نسخہ
پشکری ۳۴ گریں ڈائیٹیوٹ سلفیورک اسٹ ۱۲ بوند + شیرہ - ۴ ڈرام -
صاف پانی ۱۰۰ - آفوس + سبکو ملا کر بمقدار تین ڈرام کے چہ چہ گھنٹہ بعد
پلاوین ڈیرہ برس سے لیکر دو برس تک کی عمر کے بچہ کو پشکری تین گریں
چار گریں تک چار چار یا چہ چہ گھنٹہ بعد کھلا سکتے ہیں۔ جب ساری علامتیں
کم ہو جاویں اور بلغم بھی کم پیدا ہو مگر کہا نسی کی شدت زیادہ ہو اور ہر نوٹ
کہا نسی کے بعد قے ہوتی ہو اور اس قے کے ساتھ معدہ سے بہت بلغم نکلا کر
بچہ کی بہوک مر جاوے اور دیگر علامات بد مصنی کی بھی موجود ہوں تو ٹائیڈرو
کلورک اسٹ کا استعمال کریں چنانچہ نسخہ + ڈائیٹیوٹ ٹائیڈرو کلورک اسٹ
۳۲ بوند + لاڈغم ۴ بوند + شیرہ - ۴ ڈرام + صاف پانی ۲۰ آفوس +
سبکو ملا کر بمقدار تین ڈرام کے دین تین دفعہ پلاوین یہ نسخہ واسطے دو
سال کے بچہ کے موزون ہے۔ اگر کہا نسی متواتر آتی رہے اور بچہ لمبی سانس
بھی بہت زور زور سے لیتا رہے اور وہ کمزور بھی ہو تو فولاد کا استعمال کریں
اس سے کہا نسی بہت جلد رکا جائے گی چنانچہ + نسخہ + کپا فٹ ایرن مکسچر
۴ ڈرام + ٹینکچور اسلی ۱۶ بوند + ٹینکچور کونامی - ۴ بوند + پانی -
۲ - آفوس اور تین ڈرام + سبکو ملا کر بمقدار تین ڈرام کے دن میں تین

سبکو ملا کر ایک پڑیہ بناوین یہ نسخہ دو سال کے بچے کے لئی موزون ہے اگر بہت
 بخار ہو اور کہا نسی بھی بہت شدت کی ہو اور کہا نسی سے وقت بچہ کو در معلوم
 ہو اور بلغم نہ نکلتا ہو اور مابین نوبتون کے خشک کہا نسی سے اگر بچہ کو تکلیف ہو
 ہی تو ہمراہ ٹائڈروس سیانک اسڈ کے وائٹم - اپنی کے کوٹا یا ٹارٹار اسٹک
 وائٹن ملاوین اور جب کہی بچہ پر غنودگی طاری ہو چہرہ سرخ اور نوبت کی
 وقت نیلگون ہو جاوے اور دم کہینچ کے وقت جلدی پھلے ہو کر تاتھا ویسی لہنی
 آواز نہ نکلی تو ان علامتوں سے دماغ میں اجتماع خون کا معلوم کرنا چاہئے اس وقت
 کہنی پر چند جو نکلیں لگاوین اس سے اون علامتوں کو تخفیف ہو جائیگی اور کہا نسی
 کی نواتر اور شدت بھی کم ہوگی اور موقع ٹائڈروس سیانک - اسڈک دینے کا بھی
 ماتھے لگے گا - جب کسی کو اسی فائدہ ہو اور مرض نہایت ترقی پکڑ جاوے - تب
 کلورافارم سنکھا کر بچہ کی تکلیف کو کم کرنا چاہئے اور طلق کے خوب اندر بندریہ
 آگ پر ونگ کرنا ٹیٹا ف سلور کا عرق بھی لگاتے ہیں جسکی طاقت بندرہ -
 گرین سے ہم - گرین تک فی آنوس میں ہوتی ہے - اگر بیماری کی شدت میں بچہ
 کو دم لہنی میں تکلیف ہو کرے تو سینہ پر راسی کی پٹی لگاوین - یا سوپ لہنی منٹ
 میں ٹینکچر اف لیٹی ملا کر سینہ اور پشت پر ہر روز مالش کر دیا کریں بچوں کی سینہ پر
 باسٹر اکثر نہیں لگا یا کرتے لیکن اگر کہا نسی بار بار اور نہایت درد اور تکلیف
 کے ساتھ آوے یا اگر دماغ میں اجتماع خون کا ہو گیا ہو کہا نسی رک رک کر آوے
 اور بچہ لہنی سانس نہ کہینچ سکے تب البتہ میٹر کے لگانی سے اکثر بہت فائدہ ہوتا ہے
 مگر اسکو بار بار یا چہ کہشہ سے زیادہ سینہ پر نہ رکھیں اس مرض کا میٹر اور جودہ
 جس میں کہا نسی کی نواتر اور شدت کم ہوتی جاتی ہے بچہ جس وقت لہنی سانس
 کہینچتا ہے اس وقت آواز کم آتی ہے اور جسمی علامات بھی تبدیل کم ہوتی

ٹینکچراف کفر کے بلاوین اگر بچہ کو دم لینی میں تکلیف اور اس کے سینہ میں زیادہ
 بلغم موجود ہو تو ہر روز شام کے وقت یا جتنی دفعہ مناسب سمجھیں اپنی کر
 کو آنا سی کر کر اوین۔ جب پہلا درجہ گزر کر مرض دوسرے درجہ میں آجاوے
 اور خاص علامتیں ہونگ کاف کے پیدا ہو جاوین۔ تو ٹائڈروسیانک اسٹ
 کی استعمال سی بڑا فائدہ ہوتا ہے چنانچہ ۹ جین کے بچہ کے لئی اسٹ مذکور کو
 آدھی بوند سی شروع کریں اور اگر بچہ کی عمر زیادہ ہو تو اس بموجب اسکی
 خوراک بھی بڑھاوین چنانچہ یہ نسخہ بہت خوب ہے +

نسخہ - ڈائیلوٹ ٹائڈروسیانک اسٹ + ۴ بوند + شیرہ + ایک ڈرام
 ڈیٹیلڈ واٹر - ۴ ڈرام + خوراک اسکی ایک ڈرام (جس میں آدھا بوند
 اسٹ کا ہوتا ہے) چھ چھ گھنٹہ بعد یہ نسخہ ۹ جین کے بچہ کے لئی موزون ہے
 واضح ہو کہ یہ دوا بہت تیزھی پس جب اسکا استعمال کریں تو والدین کو
 اس بات سی آگاہ کر دیں کہ اس دوا کے کھانیسی بچہ اگر بیہوش ہو جاوے
 یا اسکا سر گھومنی لگے یا دہیات بکھنی لگے تو فوراً اسکو موقوف کر دیں اور
 تین یا چار روز کی استعمال کر بعد اگر اسی کچھ بھی فائدہ ظہور میں نہ آوی تو
 اسکو موقوف کر دینا چاہیے اکثر اوقات اسٹ مذکور کی کھانیسی اگرچہ کھانیسی
 کی شدت بہت کم ہو جاتی ہے تاہم دوسری دواؤں کا بھی استعمال کرنا چاہیے
 چنانچہ اگر سینہ میں اجتماع بلغم کا زیادہ پایا جاوے تو دن میں ایک یا دو دفعہ
 آبی کے - کو آنا سی کر کر اوین۔ اگر زیادہ بلغم نہو بہ رات کے وقت کھانیسی
 کی شدت بہت ہو تو اس پڑیہ کو رات کو سو تو وقت ایک دفعہ کھلا دیں۔
 چنانچہ نسخہ - ڈورس پاؤڈر - آدھا گریں + اکثر کٹاف کو نائیم سفوف
 کیا ہوا - ۱ - گریں + سنی - من پاؤڈر - ۲ - گریں + صاف شکوہ - ۴ گریں +

ایسی کوئی علامت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ مرض کا اثر دماغ پر ہو یا الٹا
 پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انزال میں مرض کا دماغ پر پہنچا ہے تب عین
 ابتدا ہی سے بچہ کے شکم میں اس قدر خراش ہوتی ہے کہ ننو دانہ اور نہ پانی نہیں
 قرار پاتا ہے پس اس علامت کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ سوا بعد رفع ہو جانے
 نوبت کہاںسی کی اگر ایک لخت جو بس گھنٹہ تک قی ہوئی رہے اور وہ قی ننو دوا
 اور نہ کسی ظاہر خرابی معدہ کے باعث ہوتی ہو تو مقام اندیشہ کا ہے اسوقت
 حکیم کو چاہیے کہ اپنی توجہ دماغ کی طرف رجوع کرے +

چھارم ڈایا ریا + جب اس مرض کے ساتھ اسہال ہو جاتا ہے تو اگرچہ وہ بہت
 کم تھک ہوتا ہے تاہم اسکے ایک عرصہ دراز تک جاری رہنے سے بچہ بہت لاعز او
 کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ اسہال ابتدائی زکام کے ساتھ شروع ہو کر
 جون جون زکام رفع ہوتا جاتا ہے وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا
 ہے کہ جب تک یہ بیمار رہتی ہی تھک اسہال بھی رہتا ہی آتا یہ کہ کبھی جاری
 اور کبھی بند جب ہو تھک کاف کی شدت کی وقت اسہال ہو تب البتہ اسکو
 روکنا چاہیے +

پنجم ہو تھک کاف کی ایام میں کبھی نہ کبھی بچہ کا معدہ اکثر بگڑ جاتا ہے اور
 اسکو قی ہو کر قی ہے +

علاج درجہ اول - اس درجہ میں زکام کی علامتیں باقی جاتی ہیں اور
 سیکر بنجار بھی ہوتا ہے اور کہاںسی ہوتی ہے کہ جو بتدریج نوبت نوبت آنے
 لگتی ہے حتیٰ کہ خاص مرض کے نوبت شروع ہو جاتی ہے پس بچہ کو سردی سے
 بچاویں اور غذا سیرج البضم دیویں اور قبض نہونے دین اگر کہاںسی کی شدت
 ہو تو داکٹرم - اپی - سکے - کوانا - مہراہ ٹار - ٹارامٹک + وائین اور کپیا ونڈ

پر ہوتا ہے سب علامات زیادہ تر خوفناک پیدا ہوتی ہیں چنانچہ وہ اثر بعض دفعہ
 اتنا ہی ہوتا ہے کہ دماغ میں زیادہ خون کے رجوع ہونے سے کُن - جش - جن -
 ہو جاتا ہے تب بچہ کو پہلی اونگھ آتی ہے بعد ازاں کُن - وشن ہو کر ناہمی عدم
 کا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جب وہ اثر اسپائی - نل - کارڈ کے زور پر پہنچتا
 تب ماتمہ اور پاؤں کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں اور حلق میں تشنج ہو کر سارے جسم میں
 کُن - وشن - ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں بعض دفعہ جب ہو ننگ کان ایک
 عرصہ دراز تک رہتا ہے تب بچہ کو اکیوٹ ٹائیڈرو - کفلس ہو جاتا ہے - نہایت
 چھوٹے بچوں میں اور انہیں کہ جنہیں دانت نکلنے وقت ہو ننگ کان ہو جاتا ہے
 زروس - سسٹم - کی اثر کی علامات نہایت شدت سے ظاہر ہوتی ہیں چنانچہ ان ترنوں
 زکام کی علامتیں جو اکثر اس مرض کے شروع میں ظاہر ہوتی ہیں وہی عموماً تھوڑے
 ہی عرصہ تک رہتی ہیں اور کہا نسی اگرچہ جلد جلد نہیں ہوتی تب بھی ابتدا ہی سے
 نوبت بنوبت آتی رہتی ہے اور کہا نسی کی نوبتیں اس قدر شدید ہوتی ہیں کہ
 بچہ کا دم بند ہو جاتا ہے یہ کہا نسی چند منٹ تک رہتی ہے اس میں تھوہوپ کی
 علامات ہوتی ہیں اور نہ بعد موقوف ہو جانے کے معمولی قی ہوتی ہے پر موقوف
 صرف اس وقت ہوتی ہے کہ بچہ ڈنڈا ل ہو جاتا ہے اور اس میں کہا نسی کی تاب نہیں آتی
 تاہم نوبتوں کے چہرہ بچہ کا سرخ اور انگہ میں آشوب سے پر ہوتی ہیں اور بچہ کو
 کمال غنودگی ہوتی ہے کہ جس حالت سے وہ اٹھنا نہیں جانتا اور جون جون کہا نسی
 کی نوبتیں پھر درپے آتی جاتی ہیں یہ حالت زیادہ تر بڑھتی جاتی ہے اور
 سرخی کے عوض چہرہ نیلگون ہو جاتا ہے پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور تب فوراً -
 کُن - وشن ہو پڑتا ہے بعد ازاں بچہ بالکل بیہوش ہو جاتا ہے یہ حالت ہو
 ہی عرصہ تک رہتی ہے کہ پھر کُن - وشن - ہو کر تڑپ تڑپ کر دم نکل جاتا ہے

بھی خوب آتی ہے۔ اور ازھوپ کی شروع ہونے سے اس بیماری کی شدت ایک ہفتہ تک زیادہ ہوتی رہتی ہے اور اس حالت میں دس یا پندرہ دن رہ کر تخفیف ہونی لگتی ہے جسکا پہلا نشان یہ ہے کہ رات کو نوبتوں کی شدت کم ہونے لگتی ہے بعد ازان ایسا ہوتا ہے کہ نوبت کہا نیوونکی یا تو دیر دیر سے آتی ہے یا اگر تو اتر میں فرق نہ تو شدت میں ضرور تخفیف ہوتی ہے اور بعض دفعہ بلا ہو پ کی کہا نیوون ہوجاتی ہے پر اگر تخفیف کے وقت بچہ کو سردی لگ جاوے یا شکم میں کسی طرح کی خرابی پیدا ہو جاوے تو ہو پ کی علامت پہر ظاہر ہو پڑتی ہے اور نوبت زیادہ تر شدت سے ظاہر ہوتی ہے پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس مرض کی رفع ہونے کی کمی دن پیشتر سے کہا نیو کا تشخ جاتا رہتا ہے غرض اس مرض کا یہی طور ہی جب ساتھ سے کسی اور بیماری نہیں ہوتی پر جب دیگر امراض اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوجاتی ہیں تب اسکے علامات اور دورہ میں بڑا اختلاف پڑ جاتا ہے چنانچہ اب ہم اون بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں جو اکثر اس مرض کے ساتھ پیدا ہوجاتی ہیں +

اول مرض برانکائٹس۔ یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ بعض دفعہ ہونگ کاف۔ کہ شروع ہونیسی پیشتر بچہ میں شدید علامتیں مرض برانکائٹس کی پائی جاتی ہیں کہ جس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہا نیو اور بہت زیادہ نگی نفس ہوتی ہے پر اکثر یہ علامتیں خوف ناک نہیں ہوتیں کیونکہ جب ہونگ کاف ظاہر ہو پڑتا ہے تب وہی علامات از خود رفع ہوجاتی ہیں بعد شروع ہونے ہونگ کاف کے اگر مریض کو برانکائٹس۔ یا نیو۔ مو۔ نیا۔ ہو جاوے تب البتہ مقام اندیشہ کا ہی ووم۔ جب چوٹی چوٹے برانکائٹل ٹیوب میں انفلامیشن ہو جاتا ہے اور وہ انفلامیشن رفتہ رفتہ پہنچون کے۔ یا رسل میں گزر جاتا ہے تب مریض کو نیو۔ مونیہ کے بیماری ہوجاتی ہے + سیوم جب اس مرض کا اثر ٹرونکس سم

درسون میں بتلائی جاتی ہے +

ہونیگ کاف *

طب کی اصطلاح میں اس مرض کو - پڑنا - سس - بولتی ہیں اور اردو میں کہو کو کر کہا لہٰذا کہتے ہیں +

علامات یہ مرض زکام کی علامتوں سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت اسکو زکام سے فرق کرنا مشکل ہوتا ہے بخراش کے کہ جب بعض دفعہ اسکی ساتھ خاص ایک لمبی کہا لہٰذا کہتے ہیں یہ رفقہ رفقہ زکام کی علامتیں کم ہوتی جاتی ہیں لیکن کہا لہٰذا کہتے ہیں جاری رہتی ہے اور بدنسبت پھل کے زیادہ تیز اور عرصہ تک رہتی ہے اور چون جون یہ کہا لہٰذا کہتے ہیں شدید تر ہوتی جاتی ہے اسکی خاصیتیں زیادہ تر نمایان ہوتی جاتی ہیں چنانچہ ہر نوبت کہا لہٰذا کہتے ہیں میں بچہ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور اس کہا لہٰذا کہتے ہیں اسکا صدر اوکے سارے جسم کو ہلاتا ہے +

تعریف اس کہا لہٰذا کہتے ہیں کی جیہ ہے کہ یہ کہا لہٰذا کہتے ہیں نوبت نوبت ہو کر رہتی ہے اور جب جیہ اٹھتی ہے تب بچہ ایک عرصہ تک کہا لہٰذا کہتے ہیں رہتا ہے یہاں تک کہ کہا لہٰذا کہتے ہیں کہا لہٰذا کہتے ہیں دم ہو جاتا ہے اور وقت ایک بار تک اور تیز آواز کی ساتھ نہایت زور سے لمبی سانس بھرتا ہے اس علامت کو انگریزی میں ہوجپ کہتے ہیں۔ اسی طور کہا لہٰذا کہتے ہیں کئی مرتبہ اٹھتی ہے اور مریض کہا لہٰذا کہتے ہیں کہا لہٰذا کہتے ہیں دم ہو جاتا ہے اور تیز آواز کے ساتھ لمبی سانس بھرتا ہے آخر کار جب لیس در بلغم اخراج پاتا ہے یا انجکٹیاں آتی ہیں یا جب قی ہو جاتی ہے تب مریض کو افاقہ ہوتا ہے اور بت آسانی سے دم لینے لگتا ہے اگر اس مرض کے ساتھ اور کوئی بیماری ہو تو مابین نوبتوں کے بچہ صحیح اور سالم نظر آتا۔ یہوک بدستور رہتی اور نیند

نسخہ + ڈی کاکٹن - سی - بیجا - دو آنوس ۵ ڈرام + کاربونت ان ایوینیا -
 مگرین + ٹینگچر ان اسکویل - ۱۶ بوند + سرپ ان ٹوٹو ۳ ڈرام + سیکولین
 خوراک ۳ ڈرام یہ نسخہ دو برس سے تین برس تک کے بچہ کو لئی موزوں ہے
 علاوہ اس دوا کے بچہ کی طاقت کو غذائی مقوی سے قائم رکھیں - جب مرض
 اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے تب اگرچہ امید زیت کی بہت سی کم ہوتی ہے تاہم
 ایک اور دوا کا استعمال کر سکتی ہیں یعنی کیا لول مثلہ دو برس سے تین برس
 تک کے بچہ کو اگر اس حال اس بات کا مانع نہ ہو ایک گرین کیا لول گھنٹہ گھنٹہ بعد
 کھلاوین اور بانو پنر دو دو گھنٹہ بعد ایک ڈرام تیز مرکبوریل اسپینٹ منٹ -
 کی مالش کریں - اگر اسہال موجود ہو تو اس دوا کو یا تو کم یا بالکل نہ کھلاوین
 اس بیماری میں ادویات کا ونٹر - کری - ٹی - شن - کی استعمال کرنے کا قاعدہ
 ہے کہ جب شدت اس مرض کی - انٹی - فلو جب شک - دواسی رنگ جاوے اور قوت
 اسٹرنم - ہڈی کے اوپر بلشر لگانی سے بڑا فائدہ ہوتا ہے - لیکن جب مرض بڑھ
 جاوے اور پچھلی علامات سے نہ رک سکے اوس وقت اسٹرنم - ہڈی پر بلشر لگانے
 سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس صورت میں ایک بڑا سا بلشر سارمی گلو پر
 لگا دینی سے صیق النفس کی باری کو اکثر تخفیف ہوتی ہے اور بچہ دم آسانی سے
 لیتا ہے اور کھانسی کے ہمراہ بلغم بھی اخراج پاتا ہے کہ جو بات پچھلے نہیں ہو
 جتی - پس اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ضد کے لینے یا جو نکو کج لگانے یا -
 ٹارٹار اسٹیک کے کھلانے سے چھ گھنٹہ کی اندر صورت افاقہ کی نظر نہ آوے - تب
 گلو پر بیشک بلشر لگا سکتی ہیں - لیکن جب دیکھیں کہ کسی علاج سے بچہ کو فائدہ
 نہیں ہوتا اور دم لینے میں اسکو نہایت تکلیف ہوتی ہے اوس وقت -
 ٹری - کیا - ٹی کا - اپریشن - کر سکتی ہیں کہ جسکی کرنے کی ترکیب علم جراحی کے

جب لارنکس کے ساری علامات خوناک رفع ہو جاوین اور پتھر ہی بچہ اسطور پر دم لیتا رہے کہ جس طور پر مرض کے ہوینو لیتا تھا اور تھوڑا بہت کھانا بھی ہو تو اس حالت میں خلق پر ٹینکچر آف آئیوڈین لگانے سے نجات فائدہ ہوتا ہے لیکن فرض کرو کہ بیمار ہمارے علاج میں اس وقت آوے کہ جب یہ بیمار ہی بڑھ گئی ہو تو اس حالت میں وہ علاج راست نہیں آسکتا کہ جو ابتداء میں مفید پڑتا ہے مثلاً جب دیکھیں کہ ٹارٹار امشک کے کھانا سے قے نہیں ہوتی یا کھلاتی ہی بلا کوشش کو یہ دوا نکل پڑتی ہے اور جو شہی بچہ اس وقت اگل دی اگر اس میں بلغم یا پردہ کا ذب کے ٹکڑے موجود ہوں اور جسم کی حرارت غریزی کم ہوتی جاوے لیکن زیادہ تر نیلگون ہو جاوین نبض کمزور اور جلد جلد چلنے لگے اور نوبت ضیق کی بدستور شدید رہے اور تنفس کی آواز خراٹوں کی نہو بلکہ باریک چنچنی کی آواز کے طور پر ہو تو ان علامتوں سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اب ٹارٹار امشک کی استعمال کرینا موقع گذر گیا اس وقت علاج کو فوراً بدل دینا چاہیے اگرچہ پھر کی زیت کی امید اس حالت میں بہت کم ہوتی ہے تاہم اس وقت آب گرم میں رائی ملا کر اسمین چند منٹ تک بچہ کو رکھیں اور فوراً سلفٹ اف کا پتہ کھلا کر اوسکو قے کرادیں کیونکہ یہ دوا قے کی نجات سیرع تاثیر ہے یا بعض اسکو شہد یا شیرہ میں زیادہ مقدار پشکری کی ملا کر ۱- یا ۱۵- منٹ بعد جب تک کھلکے تے ہوئی پلاتے جاوین اور اگر سلفٹ اف کا پتہ ہی قے کہانی منظور ہو تو چوتھائی یا آدھی گرین کے مقدار میں پانی میں حل کر کے پاؤ باؤ گھنٹہ بعد پلاتے جاوین اور جب دیکھیں کہ قے نہیں ہوتی اور بچہ نڈال ہو جاتا ہے تو پھر قے کی دوا ندینی چاہیے بلکہ اس حالت میں نسخہ ذیل کا استعمال بعد دو گھنٹہ کے کرتے جاوین +

مرکب اور ٹیل - آئیٹ - سنٹا بچا کر بطور پٹی کے بچہ کو شکم پر باندھ دین - پر یاد رہی
 کہ فی بیماری اس قدر حد تک ہو جاتی ہے کہ باراجبکا اثر بہت دیر سی پیدا ہوتا ہے
 اس مرض کے ابتدائین مفید ٹین پڑ سکتا لیکن جب اس بیماری کی شدت رفع
 ہو جاوے تب کیا تول کے استعمال کر غیری دو فائدے مقصور ہیں - ایک تو بچہ
 کہ اسکو کھانے سے ہو اکی نالیوں میں وہ پردہ کا ذب نہیں بننے پاتا اور دوسرے
 بچہ کہ پہلے ہی کا وہ انفلامیشن جو اس مرض میں اکثر پیدا ہو کر مہلک ہو جاتا ہے
 کیا تول کے کہا غیری نہیں ہونے پاتا - دو برس سے - برس کو بچہ کو آدھی گین
 سے ایک گرتین کیا تول ہمراہ تھوڑے اپی کے کو انکے گھنٹہ یا دو دو گھنٹہ بعد
 کھلانا چاہئے اور کبھی کبھی اسکے درمیان میں ٹار - ٹار اسٹک سوتے کرانی چاہئے
 پر یاد رہی کہ اگر کرپ کی علامتوں میں شدت ہو جاوے یا دے پہر لوٹ پڑیں
 تو کیا تول کو فی الفور موقوف کر دین اور اسکے عوض ٹار - ٹار اسٹک کوتے
 لائیکی مقدار میں استعمال کریں - ایک بڑھتی بات شدید قسم کرپ کی بیماری کے
 علاج میں قابل یاد رکھنے کو چھ ہے کہ ایک ہی بیماری میں کبھی تو بچہ مرض میں شدت بڑھاتا
 اور کبھی خفیف ہو جاتا ہے پس اگر بیمار کو ایک عرصہ تک تخفیف رہے اور پھر اسکو
 دم لینے میں تکلیف ہو جاوے تو اس سے ہرگز ایسا قیاس نہ کرنا چاہئے کہ بچہ کی حالت
 اتر رہے اور اسکی علاج او سکا زیادہ تیزی سے کرنا چاہئے کیونکہ یہ بھی ممکن ہے
 کہ شاید وہ تنگی نفس تشنج کو باعث ہو کہ جو بلا کسی تیز علاج کے بچہ کو صرف آب گرم میں
 غوطہ دلانے سے فوراً رفع ہو سکتا ہے +

ہر مریض کرپ میں کیا تول کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اگر
 عین ابتدائین اس بیماری کا علاج مناسب طور پر تیزی سے کیا جاوے تو چند
 گھنٹہ میں اسکی ساری علامتیں بالکل رفع ہو جاسکتی ہیں اور صورتوں میں کہ

ٹیک ہو تو تین آنوس تک خون نکالنا چاہئے اور آٹھ سال سے ۱۰ سال تک ۶۔
 آنوس نکالنا چاہئے اثر مضد کا اس قدر فوراً ظاہر ہوتا ہے کہ جون خون بہتا جا تا ہو
 سانس لینے کی تکلیف بھی رفع ہو جاتی ہے لیکن اگرچہ مضد سیڑیا فائدہ ہوتا ہے
 تاہم بعد مضد کے اگر کسی اور دوا کا استعمال کیا جاوے تو وہ فائدہ بہت دیر
 نہیں رہتا اور چار یا چھ گھنٹہ بعد علامتوں کے پر شدت ہو جاتی ہے اگر مضد سے
 فائدہ نہو یا یہ بیماری کسی کمزور بچہ کو ہو جاوے تو ٹریسی کیا پر جو نکلیں لگاویں
 اور جب تک فی ہنٹا رٹارٹا امٹک کو بمقدار ایک گرین کے آٹھویں حصہ یا چوتھائی
 گرین یا آدھا گرین دسل دسل منٹ بعد کہلاتی جاویں اور بعد ہو جانے تو کے
 بھی اسی خوراک کو آدہ آدہ گھنٹہ تک کہلاتی جاویں جب تک مرض کو بخوبی تخفیف
 نہو جاوے جس خوراک سے تپتی ہوئی ہے اس کے چند مرتبہ کہلانے سے دوا کا وہ اثر جاتا
 رہتا ہے پس اس صورت میں خوراک اس کی بڑھانی چاہئے کیونکہ ٹارٹار امٹک
 سے فائدہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اسی تپتی آتی ہے۔ اس دوا کو ناشی ٹیک خوراک
 سے اس قدر فائدہ نہیں ہوتا بلکہ مریض اس سے نڈ ٹال ہو جاتا ہے بعد چار یا چھ
 گھنٹہ کے اگر ٹارٹار امٹک سے اجبا فائدہ حاصل نہو تو پھر جو نکلیں لگاویں یا اگر
 مناسب جہین تو پھر مضد لین اور ٹارٹار امٹک کے استعمال سے مرض کو تخفیف
 ہو جاوے تو اس دوا کو دیر دیر بعد کہلاویں۔ لیکن اس کی خوراک کم کر دیں
 بلکہ پوری خوراک تپے لانی والی کو بعض آدہ گھنٹہ کے ایک ایک یا دو دو گھنٹہ بعد
 کہلاویں اور جب اس سے مرض کو فائدہ نہو تا جاوے تو تین یا چار یا چھ گھنٹہ
 گھنٹہ بعد کہلاویں اور جب ٹارٹار امٹک کے استعمال سے شدت اس مرض کی کم ہو جاوے
 تب کیا لومل کا استعمال شروع کر دیں لیکن اس مرض کے شروع ہی سے مرکیو
 ریل۔ آئیٹ۔ منٹا کی مالش کر سکتے ہیں۔ یا فلا لین کے بنڈیج پر دو ڈرام۔

نیساج انجام اس مرض کا اکثر برا ہوتا ہے لیکن عین ابتدا سے اگر اس کا علاج کیا جاوے تو نتیجہ نیک بھی نکل سکتا ہے +

علاج اس مرض کا علاج عین شروع میں کرنا چاہئے ورنہ دوا سے کچھ فائدہ نہ ہوگا جس وقت دیکھیں کہ بچہ میں زکام کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور کسی قدر کہانسی کی ٹہن ٹہن کی آواز نہ بھی سنائی دیتی ہے اس وقت اسکو آب گرم میں ٹھلا دیں اور باہر نہ نکلنے دیں غذا اسکی کم کر دیں۔ اور اپنی کے کوانا۔ اور ٹار۔ ٹار امٹک سوتے کر دیں بعد ازاں دو سال کے بچہ کو اس نسخہ کا تین ڈرام تین تین یا چار چار گھنٹہ بعد پلا دیں +

نسخہ - بائی - کار - بونٹ - اف پوٹاش - ہم - گرین + سائیک اسٹڈ - ہر گرین انٹی مونیل وائین - دیرہ ڈرام - اپنی کے - کوانا وائین - ہم - بوند - سرپفٹ - ٹین - اٹرمائی ڈرام - پانی - اٹرمائی آنوس +

سبکو ملا لیں جس مکان میں بچہ ہو اسکی ہوا گرم اور مرطوب ہونی چاہئے ان ترکیبوں سے مرض کا حملہ رک جاسکتا ہے لیکن مرض اگر نجات شدت سے شروع ہو گیا ہو یا اگر بیمار اس وقت تمھارے علاج میں آوے کہ جس وقت مرض بخوبی پیدا ہو گیا ہو تو اس سے زیادہ تریز علاج کی ضرورت ہوتی ہے اسوقت فصد اور ٹار۔ ٹار امٹک بھی دو تہ پیرین میں کہ جنہر اعتماد کیا جاسکتا ہے پس اس حالت میں کہ جب مرض نجات شدت سے شروع ہوا اور چہرہ اور لبیں نیلگون نہوئی ہوں اور نبض کمزور نہو گئی ہو اور دم لینے میں بھاریت تکلیف ہو تو اچھی طرح جوگ کر دیں - سی فصد لیوین - اور ٹار۔ ٹار امٹک کا استعمال بھی خوب کریں کیونکہ تین سال کی کم عمر کے بچوں کا خون بازو کے دین سے بخوبی نہیں آتا ہے فصد کا قاعدہ یہ ہے کہ بچہ کی عمر اگر ایک سال سے دو سال

جاتا ہون توں اس قدر جلد جلد ہون لگتی ہے کہ بچہ کہ دم لینے کی بالکل فرصت نہیں ہوتی اور اس کو ایک سخت دم لینے میں تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اس حالت میں بعض دفعہ کہانی بالکل موقوف ہو جاتی ہے اور بعض خراٹے کی ابہم لینے کے ساتھ چپھنے کی آواز سنائی دیتی ہے چہرہ بھاری اور فکر مند ہو جاتا ہے سر پیچھے کو کچھ جاتا ہے انگلیں بست اور لمبیں نیلیوں جسم خشک ہوتا ہے پاؤں سرد یا جسم سرد پسینہ سر مرق ہو جاتا ہے دم جلد جلد اور بقیہ مدگی سے لیا جاتا ہے اور نبض سخت جلد اور سخت کمزور چلتی ہے اس درجہ میں اگرچہ وقفہ نہیں پایا جاتا مگر سانس کی شدت بار بار زیادہ ہوتی ہے کہ جن شدتوں کے وقت بچہ تڑپنی لگتا ہے اور اپنے حلق کو اندر مٹا تھوڑا لکڑاؤ سکھانے چاہتا ہے تاکہ ہوا کی آمد و رفت کا روک رفع ہو جاوے غرض ان تکلیفوں کے اندر بچہ کو کنوٹن ہو جاتا ہے اور تب وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے +

اسباب سرد اور مرطوب آب و ہوا اور دفعتاً سردی کا لگ جانا بوجہ اس مرض کے ہیں اور بعض مقاموں میں یہ مرض انڈی مک بھی ہے +

صورت حال تشیرکی بعد وفات بعد مرگ کے نقش کو چہرے سے لائکس اور ٹرمی کیا۔ اور ہوا کی نالیوں کا میوکس ممبرین سرخ اور سوٹا اور بعض دفعہ چملا ہوا اور زخمی بھی پایا جاتا ہے اور اسپر اکثر ایک کا ذب پر دہ چمٹا ہوا ہوتا ہے اور یہ پردہ بہ نسبت ہوا کی نالیوں کے اون دونوں مقاموں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے +

امتداد مرض اگر علامات پشرد شمار نکرین تو یہ مرض ۴۴ گھنٹے سے ۷۲ گھنٹے کے اندر تک ہوتا ہے اور جو حباب میں اون علامتوں کو بھی شامل کریں تو چار دن سے چھ دن کے اندر بیمار جاتا ہے +

موت اور نبض پُرا اور جلد اور بچہ سست اور چڑچڑا ہو جاتا ہے اس حالت میں
 بھی چند منٹ تک بچہ خوش ہو کر اپنی کھیل کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور
 تکلیف تنفس بھی کس قدر رفع ہو سکتی ہے لیکن دم کے ساتھ خرابا بدستور
 جاری رہتا ہے پر فوراً بچہ بہرے دم ہو جاتا ہے اور دم کشی کے وقت
 خدائی کی آواز زیادہ تر سنائی دیتی ہے اور اس وقت مریض عرق عرق
 ہو جاتا ہے اور چہرہ اور گلو کی رگیں خون سے پر ہو جاتی ہیں بعد ازاں بیا
 تھوڑا مگر تکلیف سے دم چھوڑنے لگتا ہے اور یہ حالت ضیق کی چند منٹ
 تک رہ کر بچہ کو کس قدر افاقہ ہوتا ہے اس وقت وہ تھک کر اکثر سو جاتا ہے
 پر سوئی وقت خرابائی کی آواز زیادہ تر سنائی دیتی ہے بعد چند منٹ کے خوف
 کہا کر وہ چونک پڑتا ہے اور ہر اگلے طور پر مگر اس سے زیادہ شدید ایک بار
 نوبت ہونی لگتی ہے مگر مرض کے بڑھنے کے ساتھ کہا انس کی شدت زیادہ
 نہیں ہوتی اور نہ اسکے ہمراہ بلغم آتا ہے اور اگر آتا بھی ہے تو نہایت تھوڑا
 سا کہ جسکے نکلنے سے کچھ ہی افاقہ نہیں ہوتا۔ اس مرض کے ابتدا ہی سے
 یعنی جیسے کہ اسکی خاص علامتیں ظاہر ہونی لگتی ہیں بچہ کی آواز بیٹھ جاتا
 ہے اور چھوٹی سچوں میں یا تو بالکل پیدا ہی نہیں ہوتی اور جو ہوتی بھی ہے
 تو بچہ کو گفت و گو سے اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اس اگر کوئی بات پوچھی جائے
 تو اس کا جواب وہ اشاروں سے دیتا ہی تشنگی ہمیشہ زیادہ رہتی ہے۔
 مگر بچہ اچھو طور نکل سکتا ہے خلق اکثر سنج ہوتا ہے اور لارنگس کو دبا ہوا
 بچہ درد محسوس کرتا ہے زبان کی نوک اور کنارے سنج ہوتی ہیں لیکن
 درمیان اور پیچھے اس کے ایک گاڑھی اور سفید رطوبت چھٹی رہتی ہے
 باخانہ کس قدر قبض اور بہو کی گرجانی ہے بیشتر درجہ جون جون مرض بڑھتا

میل کو بروقت کرنا چاہی کیونکہ بچوں میں بہ نسبت جو انون کے یہ بات بیشتر
ہائی جاتی ہے کہ سینہ کو اندر کا بانی ہیپ بن جاتا ہے +

۶۔ کروپ

یہ انگریزی نام اوس مرض کا ہے جسکو اصطلاح میں سائی-نن-کو-ٹری
-کئی-سٹ- یا سائی-نن-کے-لا-رین-جیا-بولتے ہیں اور یہ
مرض ہو جسمین صرف-ٹری-کیا-یا صرف لے رنگس-یا اون دونوں
مقاموں میں نہایت شدت کا انفلا میٹن ہو کر اونپر اکثر ایک ذب چھلی بن
جاتی ہے +

علامات بعض دفعہ تو یہ بیماری دفعتاً ہو کر صرف چند گھنٹہ کے اندر
مہلک ہو جاتی ہے پر اکثر یہ مرض بندر سچ شروع ہوتا ہے اور اوس
اسکی علامتوں کو مین درجہ مین تقسیم کر سکتے مین-چنانچہ درجہ اول پنجاب
غنودگی اور انگھون اور ناک سے رطوبت جاری رہتی ہے دم لہیہ
چند ان تکلیف نہیں ہوتی اور اگرچہ کہا لسنی بار بار آتی ہے پر اوسمیں کوئی
بات خاص نہیں ہائی جاتی رفتہ رفتہ پر اکثر ۶-۳ گھنٹہ کے اندر ہی علامات
دوسرے درجہ کی ظاہر ہوتی ہیں چنانچہ اوسوقت ایک عجیب آواز کے ساتھ
کہا لسنی ہوتی ہے کہ جسکا بیان کرنا مشکل ہے یعنی وہ آواز ایسی ہوتی ہے
جیسو کسی دھات کی ظرف میں ٹھونکنو سے ٹھن ٹھن کی آواز پیدا ہوتی
ہی اور دم ساتھ خراٹو کے لیا جاتا ہے-رات کو وقت ان علامتوں میں
شدت ہوتی ہے پر چون چون صبح ہوتی جاتی ہے امنین ہی تخفیف ہو
جاتی ہے لیکن چند گھنٹہ کے بعد ہی سجا کی شدت اور دم لینے میں زیادہ
تر تکلیف ہونی لگتی ہے حلد گرم اور خشک چہرہ سُرخ تکلیف تنفس کہا لسنی

مگر ابتدا میں مریض کو کونو کشن ہو جاوی اور جو ہو ہی جاوی تو دوسرے دفعہ
 نہیں ہوتا اور نواہین عضلون میں اختلاج ہوتا ہے اور نہ بچہ کو روشنی کی
 بہت کم برداشت ہوتی ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلوری سی
 کی بیماری نینج شکم کے اندر درو بتلاتا ہے اور سینہ میں نہیں غرض جب یہ
 بات ہوتی ہے تب یہ بیماری سسل - ڈایا فرام کے حصہ بلورائین دہنی طرف
 شروع ہوتی ہے اور اس وقت مریض کو متواتر صفراوی تے ہوا کرتی ہے
 شکم کو بانے سے بہت درد محسوس ہوتا ہے پس جب یہ علامتیں باہی
 جاتی ہیں تب بلوری سی کے عوض شکم کی بیماری کا گمان ہوتا ہے لیکن
 حقیقت میں اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ ہر عمر میں جب مریض دردی
 شکایت دہنی - ٹائی - پو - کان - ڈریٹم - میں کرتا ہے تو وہ دردا کثر
 بہ نسبت ہر وہ - پی - رسی - ٹو - نیم - کی ہر وہ بلورائین ہو کرتا ہے -
 علاوہ اسکی احتیاط سے اسکی تشن کریشی بھی تشخیص کی غلطی رفع
 ہو سکتی ہے

علاج اس مرض کا علاج اوسط طور پر کرتے ہیں حسب طور پر جو انون کا کرتی ہیں
 یعنی دردی مقام پر جو نکین لگا دین بعد ازان فو متشی شن کرین اور
 کہانے کے لئی تھوڑی تھوڑی مقدار میں کیا کوئل ہمراہ اینون یا ڈوس
 پاؤڈر کی استعمال کرین اس علاج سے جب شدید علامتیں رفع ہو جاویں
 اور سینہ کی اندر پانی بہر جاوے تب اسپرٹیکر گادین یا ہلکی مرکوریل
 اینٹ اینٹ کی مالش کرین اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں کیا کوئل -
 کو جاری رکھیں اگر اس علاج سے بھی پانی جذب نہواور بچہ کو دم لینے
 میں تکلیف بدستور رہی تو سینہ کو چید کر پانی نکال دین لیکن اس

اکیوٹ پلوریسی سی۔ ایسی علامتوں سے شروع ہوتی ہے کہ جن سے بہ نسبت سہل
 کسی دماغ کی مرض کا گمان ہو سکتا ہے چنانچہ بچہ کھتے ہوئے لگتی ہے اور بچا
 اور نہایت شدت سے درد سر رہتا ہے بچہ زور زور سے روتا ہے یا رات
 کے وقت او کو نہ دیاں ہو جاتا ہے یا سوتے سوتے چیخ پڑتا ہے اور صبح کے
 وقت اپنی سر کی بڑے شکایت کرتا ہے اور سینہ کے درد کا بالکل انکار کرتا ہے
 اور کہیں کہہ لاسنی اور تکلیف تنفس ہوتی ہے لیکن ان علامتوں کا ہونا
 دماغ کی مشارکت سے قیاس کر سکتے ہیں بعض نہ کہ لاسنی ہوتی ہے نہ
 اور ضیق بھی ایسی خفیف ہوتی ہے کہ جس سے سینہ کی مرض کا وہم و گمان
 بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس خیال سے کہ بچہ کو دماغ میں مرض ہے
 اسکلٹی شن۔ بھی نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں تو نہایت پیہ واپسی
 پس یہ ایک اور وجہ تشخیص میں غلطی ہونے کی ہے۔ اگرچہ یہ ساری
 باتیں درست ہیں تاہم ان علامتوں کو لحاظ رکھنے سے یہ مرض بخوبی
 پہچانا جاسکتا ہے مثلاً اگر ایک پیٹھری پیہ بہ نسبت دوسرے کی سوا کی آمد
 رفت کی آواز کم سنائی دے اور کسی تندرست بچہ میں دفعتاً شدید
 علامتیں پائی جاوین تو اس سے اکثر اکیوٹ پلوریسی ثابت ہوا ہے
 اور قطعہ نظر اسکے جب پلوریسی کی بیماری شروع ہوئی ہو تو
 تو اسکی علامتیں بہت شدید اور اوسمیں بخار بھی شدت کا ہوتا ہے۔
 لیکن مرض ٹائڈروکفلکس اس قدر شدید علامتوں سے شروع نہیں
 ہوتا مزید یہ کہ پلوریسی کی بیماری میں سر بہ نسبت اور مقامات جسم کے
 زیادہ نہ گرم نہیں ہوتا۔ اور نہ اس میں بچہ بیہوش ہو جاتا ہے۔ جیسا۔
 ٹائڈروکفلکس میں ہوا کرتا ہے اور ایسا بھی کم ہوتا ہے کہ پلوریسی

کہ جس سے چنچنیں مار کر رہتا ہے اور ساتھ اسکے بعض دفعہ سبز رنگ کی قہمی
 ہو سکتی ہے اور علامتیں بخار کی رہتی ہیں نبض جلد جلتی ہے دم جلد جلد لیا
 جاتا ہے کہا لسی رک رک کر بار بار آتی ہے بعد چند گھنٹہ کے درد کی شدت
 رفع ہو جاتی ہے لیکن بخار تکلیف تفس اور کہا لسی بدستور رہتی ہے اور بچہ
 اگرچہ اکثر سست اور خواب ناک رہتا ہے تاہم وقتاً فوقتاً نہایت بی چین ہو کر
 رونے اور تڑپنے لگتا ہے اور یہ بات خاص کر روٹ بدلنے میں زیادہ ہوتی
 ہے۔ کس کروٹ پر بچہ لیٹا رہتا ہے اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ
 بعض دفعہ تو سیدھی پیٹھ پر رہتا ہے اور کبھی آرام آتا ہے اور کبھی چٹ اور کبھی
 دھنر یا بائیں کروٹ پر اور کبھی چپن آتا ہے لیکن چاہے جس کروٹ پر بچہ لیٹے
 اکثر اسی کروٹ پر رہنا چاہتا ہے اگر سینہ پر کان لگا کر سنیں تو ایک ہی
 میں آواز صحیح سنائی دیتی ہے اور دوسرے میں ہوا کی آمد و رفت کی
 آواز کم ہوتی ہے لیکن یا تو کوئی بھی رائٹس کی آواز نہیں سنائی دیتی
 یا ایک خشک کھر دوری آواز رائٹس کی طور پر مستمع ہوتی ہے جو نہیں
 یہی آواز فرکشن کی ہوتی ہے۔ بعد ایک یا دو روز کے برا ٹیکل بریدنگ کی
 آواز سنائی دی سکتی ہے کہ جیسی آواز جو انون کی دوسرے درجہ
 بنو۔ مونیہ میں مستمع ہوتی ہے لیکن اکثر ابتدا میں فرکشن کی آواز
 نہیں بائی جاتی اور مرض کے اخیر میں سنائی دی سکتی ہے اس مرض کے
 عین ابتدا میں برا ٹیکل بریدنگ اکثر مستمع ہوتی ہے۔ مائوف جانت پر
 برکشن کرنے سے آواز کسی قدر ٹھوس پیدا ہوتی ہے اور حکم کے جہاڑ
 یا تھون کو یا تو کم یا بالکل نہیں محسوس ہوگی۔ باقی اور علامتیں اس مرض
 کی مثل جو انون کے ہوا کرتی ہیں جنکا ذکر فضول ہے لیکن ان بعض دفعہ

سبکو ملا کر ایک خوراک کریں اور ایک سال کے بچہ کو چار چار گھنٹہ بعد بلا دین اور اگر قبض ہو تو کسی پتے سے اس علاج شکم کریں اور غذا ہلکی اور سیریل ہضم دیوین۔ مرض اگر رو بصحت لاوی تو اسی نسخہ کو دیر دیر بعد دیوین یا استی ٹارٹار امٹک و اسٹین کو نکال ڈالیں اور ہر تقدیر مرض اگر بڑھتا جاوی تو بعض نسخہ بالاکو اس نسخہ کا استعمال کریں +

نسخہ ۵ کاربونٹ اف امونیا۔ ایک گرین۔ اپی کے کو انا وائین۔ ۵ بوند
کپا وند ٹینکچر کفر۔ ۳ بوند۔ پانی کی ڈرام +

سبکو ملا کر چھ مہینہ کے بچہ کو چار چار گھنٹہ بعد بلا دین اور سینہ پر کوئی اسی ٹیٹ لینی منٹ مثلاً ٹرین ٹامین یا امونیا لینی منٹ کی ماش کریں اور غذا مقوی اور سیریل ہضم مثلاً دودھ آب بخنی وغیرہ دیوین۔ اور جس صورت میں کہ مرض عین ابتدا ہی سے خفیف ہو تو شروع ہی سے کاربونٹ اف امونیا کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کاربونٹ اف امونیا کا فائدہ صرف اسی وقت ہی نہیں ہے بلکہ یہ دوا ایک نہایت عمدہ اکسیکوریٹ بھی ہے +

۵۔ پلوری۔ سی

اس مرض کو عربی میں ذات الحجب بولتی ہیں بچوں کو یہ بیماری خود بخود ہوتی ہے لیکن۔ نیو۔ مونیہ کے ہمراہ اکثر ہو جایا کرتی ہے +
علامات اگرچہ علامات اس مرض کی ہر عمر میں یکساں ظاہر ہوتی ہیں تاہم چند علامتیں اسکی ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ وہی خاصہ بچان ہی میں پائی جاتی ہیں جنکا بیان ہم اب کرتے ہیں۔ اس مرض کے شروع ہونیکا طریقہ یہ ہے کہ بچہ کے سینہ یا شکم کے اوپر کو حصہ پر ایک شدید درد ہوتا ہے

ہوتا ہے کہ اوسکو چھان بھی نہیں سکتی۔ بلوری۔ سی۔ اور اس مرض میں یہ فرق
 ہے کہ بلوری۔ سی۔ میں سینہ کے اندر نہایت شدت کا درد ہوتا ہے مگر نیو مونی-
 ا میں بہت کم۔ بہ نسبت نیو۔ مونی-ا کے بلوری۔ سی۔ میں سبب مشارکت کر
 دماغ کے اندر زیادہ تر خلل واقع ہوتا ہے اور سچہ زیادہ تر بے چین رہتا ہے
 بلوری۔ سی۔ میں مثل۔ نیو مونی-ا کی کرسی۔ پی۔ ٹنٹ۔ یا سب۔ کرسی۔ پی۔
 ٹنٹ۔ رانکس نہیں سنائی دیتا۔ اور اس قاعدہ عام کو یاد رکھیں جب
 سچہ دفعتاً کسی مرض پہنچتی ہے مبتلا ہو جاوے اور اس میں کوئی علامت نہیں
 اسکلٹی۔ شن۔ یا پرکشن کے نیو مونی-ا کی نہ پائی جاوے تو اس مرض کو۔
 بلوری۔ سی۔ سمجھنا چاہئے اور ساتھ اسکے اگر یہ بات بھی پائی جاوے
 کہ سچہ کو ایک جانب کی سچہ پر پرکشن کی برداشت ہو اور دوسری جانب
 پر پرکشن کرتی ہے وہ چنچ پڑتی تو اس صورت میں بلوری۔ سی۔ کی ہونین
 شک نہیں رہتا۔ نیو۔ مونی-ا اور بلوری۔ سی۔ میں اگر غلطی ہو جاوے
 تو جہاں مضائقہ نہیں لیکن وہ غلطی اگر ٹائڈر و کفلس اور نیو۔ مونی-ا
 میں ہو جاوے تو نہایت نقصان منقول ہے کیونکہ ان دونوں مرضوں کی
 علاج میں اختلاف ہے وجہ ان دونوں مرضوں کی تشخیص میں غلطی
 ہونیکی یہ ہے کہ دونوں کے ابتدا میں تے در دسر غنڈ میں ندیان اور رت
 کے وقت بی چینی ہوتی ہے اور دونوں میں سجار اور قبض رہا کرتا ہے
 اور بعض دفعہ نیو۔ مونی-ا میں کہا منی ایسی خفیف ہوتی ہے کہ وہ قابل
 لحاظ کر نہیں ہوتی اور اگر کہا منی زیادہ بھی ہو تو اوسکو ایسا قیاس
 کر سکتے ہیں کہ وہ سبب مشارکت کسی اور عضو کے ہوتی ہے جیسے بعض دفعہ
 ٹائڈر و کفلس کے ابتدا درجون میں ہو کرتی ہے اور اگر سچہ کو اوسکی مرض

نبض نہایت کمزور اور اس قدر جلد چلتی ہے کہ اسکا شمار کرنا دشوار ہوتا ہے
بعض دفعہ وقتاً فوقتاً پہنائیت بی چین ہوتا ہے اور جب اسکی طاقت کے
بیقرار ہو کر ادھر ادھر کر دین بدلتا ہے۔ ہر اکثر حالت نیم بہوشی میں
پڑا رہتا ہے اگر دفعتاً اسکو اٹھا کر بیٹھایا جاوے یا منہ اسکا دودھ میں
لگایا جاوے تو فوراً اسکو ضیق ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات اسی ضیق کے
باعث مریض کا چہرہ اور ناخن نیلگون ہو جاتا ہے۔ یہ حالت دو یا تین دن
تک رہتی ہے اور تب بچہ مر جاتا ہے یا مریضی بچہ اسکو ایک یا دو دفعہ کنوٹن
ہو جاتا ہے بچہ چونکہ بلغم کو نکل جایا کرتے ہیں اسلئے اونکو نیو مونیاسیسی
اسپیوٹم نہیں پایا جاتا۔ اسل مرض کے شروع میں مہنی یہ کہا تھا کہ بچہ کج
مرض برا نکائی۔ ٹس۔ ہو جاتا ہے تب اکثر اوقات اسکے ساتھ نیو مونیاسیسی
بھی پیدا ہوتا ہے جسکو اصطلاح میں برنگو نیو۔ مونیاسیسی کہتے ہیں عرض جب
یہ بات ہوتی ہے تب عین ابتدا ہی سے بچہ کو ضیق اور تکلیف ہوتی ہے اور
چہرہ اسکا نیلگون ہو جاتا ہے اور اگرچہ خالص نیو مونیاسیسی کی نسبت کہانسی
اس میں بہت تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ کہانسی نوبت نوبت نیا
تکلیف سے ہوتی ہے نفس بقیاعدہ اور بہت جلد جلد لیا جاتا ہے اور یہ
بقیاعدگی مرض کی عین شروع ہی میں پائی جاتی ہے۔ میوکس رائکس
دونوں پہیڑوں میں سنائی دیتا ہے۔ لیکن خاص نیو۔ مونیاسیسی کا کری۔
بی۔ ٹنٹ۔ رائکس نہیں ستمع ہوتا۔ اور جیسا خالص۔ نیو مونیاسیسی میں
اکثر پہیڑے کی منجی ہی کے حصہ میں زیادہ تر پایا جاتا ہے اس میں یہ بات نہیں
شخص شل جو انون کے بچوں میں یہی بات پائی جاتی ہے کہ ہم
نیو مونیاسیسی اکثر کس قدر پلوریسیسی۔ ہو جایا کرتا ہے۔ اگرچہ بعض دفعہ اس قدر کم

دم لینی مین بچہ کو اب اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ دودھ بننا مشکل ہو جاتا ہے
 سینہ پر کان لگا کر سنتے سوا ب۔ کری۔ پی۔ ٹنٹ۔ ر۔ انکس صاف سنائی
 دیتا ہے لیکن یہ بات قابل یاد دہانی کے ہے کہ وہ۔ کری۔ پی۔ ٹنٹ۔ انکس
 اس قدر باریک بینی سے نہ سنا کہ جب قدر جو انون مین ہو کر تا ہے بلکہ یہ وہ آواز
 ہوتی ہے جسکو سب۔ کری۔ پی۔ ٹنٹ۔ ر۔ ال۔ بولتی مین۔ اگر ایک ہی پتھر
 مرض مین مبتلا ہو تو دوسری مین۔ پیو۔۔ ایل۔ ر۔س۔ پی۔ ر۔ٹن خوب
 زور سے سنائی دیگا۔ پتھر سے ماؤف کو جس حصہ مین بیماری بڑھ جاتی ہے
 وہاں برا ٹکسل۔ بری۔ ونگ بھی سنائی دیتا ہے۔ بچوں کے شکم کی آواز عموماً
 ٹکڑا جاتی ہے۔ بعض دفعہ پرکشن کی آواز خاص کر اسکا بیولا ٹڈی کے نیچے خوب
 ٹھوس ہوتی ہے اور بعض اوقات کم۔ اگر بہت سا حصہ پتھر کی کا اس
 مرض مین مبتلا ہو یا ساتھ اس بیماری کی اگر بلورسی بھی ہو یا شدید۔
 برا نکائی۔ ٹس۔ کی ہونے مین یہ مرض ہو جاوے تو اسی درجہ مین بیمار
 مر جا سکتا ہے اور جب یہ بیماری میزلس مین یا کمزور بچوں کو ہو جاتی ہے
 تب بھی بعض دفعہ اسی درجہ مین بیمار مر جاتا ہے۔ پس جب یہ مرض کسی
 اور بیماری کے ہونی مین پیدا ہو جاوے۔ مثلاً اسہال میزلس۔ ری
 جی۔ ٹنٹ۔ فیور۔ وغیرہ تب اسکا علاج نہایت احتیاط سے کرنا چاہئے
 لیکن فرض کرو کہ بنو مویا۔ کسی اور مرض کے ساتھ نہیں ہے اور
 وہ علاج سے بھی نہ رکی تو پیشتر درجہ مین گذر جاتا ہے اور وقت دم کی
 تکلیف بہت ہوتی ہے کہاںسی بعض دفعہ یا تو بالکل رفع جاتی ہے یا دیور
 سے آتی ہے آواز مریض کی بڑھ جاتی ہے۔ چہرہ دب جاتا ہے اور برد
 اطراف ہو جاتا ہے اور جسم پر (خاص کر ر۔ ر۔) سرد پسینہ پیدا ہوتا ہے۔

بہتر ہے کیونکہ اوس وقت سوا ان علامتوں کے اور کسی علامت سے نہ ہو۔
 مونا۔ کی تشخیص بخوبی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کہ یہ
 بیماری اسی طور پر تدریج پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے
 کہ ایک بچہ تندرست پاکیزہ سست سونیکو جاتا ہے اور رات کو وقت
 خوف کہا کر چونک پڑتا ہے اور صند کرنے لگتا ہے چہرہ اوسکا سرخ ہو جاتا
 اور جسم گرم اور کہا لسنی اور دم لینے میں اوسکو تکلیف ہوتی ہے اس مرض کا
 اس طور سے دفعتاً ظاہر ہونا شیرخواروں میں کم پایا جاتا ہے بلکہ دو سال سے
 چار سال کی عمر کے بچہ کو یہ بیماری اسطور پر اکثر ہو جاتی ہے۔

علامات درجہ دوم جب یہ مرض دوسرے درجہ کو پہنچ جاتا ہے تب
 اس میں کی طرح کاشک نہیں رہتا۔ بیمار اب بالکل سست ہو جاتا ہے نہ تو
 بچہ اپنی کہلائی کی آغوش سے اٹھنا نہیں چاہتے اور بڑی لڑکے اپنا کھیل
 کو دھول جاتے ہیں اور سست ہو کر لیٹے رہنا چاہتے ہیں تنفس جلد جلد لیا
 جاتا ہے اور ہر دم کشی کے ساتھ تھپی چلیتے ہیں اور شکم کو عضلوں کے
 سہارے سے دم لیا جاتا ہے اور کروٹیں بدلنے سے دم کی تکلیف زیادہ ہو
 جاتی ہے۔ کہا لسنی اب بار بار سخت اور بعض دفعہ اسقدر درد سے ہوتی ہے کہ بچہ
 کہا لسنی کے وقت رو پڑتا ہے اور بعض دفعہ کہا لسنی ایک لخت برابر
 ہوتی رہتی ہے۔ چہرہ اور لبوں کی سرخی اب جاتی رہتی ہے لیکن جسم کا
 لمس سستور گرم رہتا ہے مگر اطراف سرد اور جسم خشک ہوتا ہے۔ اب
 چہرہ پر تہج با یا جاتا ہے اور وہ بیماری اور فکر مند ہوتا ہے اور اگر بچہ
 بہت چھوٹا ہو یا یہ مرض وسیع ہو تو لبین اور دہن کا گرد انگلیوں جوتا
 ہے لیکن چہرہ ہیکا۔ نشنگی کی شدت اور نہ تو بچہ کی تہ بدستور رہتی ہے

زیادہ ہوتی ہے۔ مزاج جڑ جڑا اور سر میں اوسکے درد رہتا ہے۔ رات بوجھتی
 سکتی ہے اور جو نیند آ بھی جاوے تو ٹوٹ ٹوٹ پڑتی ہے اور بچہ نیند
 میں یکتا ہے یا خوف کہا کر اوٹھ بیٹتا ہے بعض دفعہ عین ابتدا میں اور کبھی
 بعد ہونے بخار کے کہانی شروع ہو جاتی ہے جو پہلے تھوڑی تھوڑی ہوتی
 ہے شروع ہی میں اس مرض میں بھوک مر جاتی ہے اور تشنگی کی شدت
 ہوتی ہے باخانہ اکثر قبض رہتا ہے اور اکثر خاص کر جو بچہ دودھ پیا کرتا ہے
 اوند کو قہر بھی ہوتی ہے۔ زبان اور لب میں خوب سرخ ہوتی ہیں۔ زبان بہت
 صحت کو کم مرطوب ہوتی ہے۔ اور اکثر اوسکی درمیانہ حصہ ہر ایک سفید پتہ
 چمٹی رہتی ہے۔ لیکن ان علامتوں سے نیو۔ مونیہ۔ کی ہونے کا دم و
 گمان بھی نہیں ہوتا اور خفیف کہانی کی طرف خیال کر نیسے شاید یہ
 سمجھ سکتے ہیں کہ سبب خرابی شکم کے وہ ہوتی ہے کیونکہ ابتدا میں
 تکلیف تنفس ہے نہیں ہوتی اور علامات اسکڑی شن کی بھی اچلی تھیں
 مساوی نہیں ہوتی بلکہ بعض دفعہ اونس کی طرح کی مدد بھی نہیں ملتی لیکن
 گو یہ باتیں درست ہوں تاہم اس درجہ کے اندر بھی بچوں میں ایسے
 نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ جسے اس مرض کا گمان بخوبی ہو سکتا ہے
 وہ یہ ہیں کہ بچہ اب نا کون سے دم نہیں لیتا بلکہ منہ کھول کر سانسین
 لیتا ہے کہ جس باعث ابتدا ہی سے زبان اکثر خشک رہتی ہے اور سیوٹ
 بچہ بخوبی دودھ بھی نہیں پی سکتا۔ ہینٹون کو منہ میں لیکر دوچار لمحہ
 جو س کر دفعتاً چھوڑ دیتا ہے اور بعض دفعہ رونے لگتا ہے اور چون
 چون مرض بڑھتا جاتا ہے یہ ترکیبیں دم لینی اور دودھ پینی کی زیادہ تر
 نمایاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ علامتیں اگر شروع میں دریافت ہونے

کی مقدار میں چار جاگہ گنٹھ بعد پلاوین کے۔ پی۔ لی۔ ری۔ برا نکائیس
 کہ علاج میں بھی وہی وصول راست آتے ہیں جبکہ ذکر اوپر کیا گیا ہے۔
 اتنا ہی فرق ہے کہ چونکہ یہ مرض شدید تر ہے اسلئے اسکا علاج بھی تیز کرنا
 چاہئے چنانچہ اس میں مضدے سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو جونکین بھی لگا
 سکتے ہیں۔ لیکن خون نکالنے کی باب میں اون قواعد کو یاد رکھیں کہ جبکہ ذکر
 فرما دین صبیان میں کیا گیا ہے۔ اور ٹارٹار اسٹک کے باب میں بھی ہم
 یہ کہتی ہیں کہ جب تک اس دوا سے تپہ ہوتی رہے گی تب تک اس سے فائدہ
 ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن جب بچہ کا چہرہ نیلگون اور نبض کمزور ہو جاوے
 تب اسکو موقوف کرنا چاہئے اور اس کے عوض میں سینہ پر اوپر کی روغن
 کی مالش کریں۔ اور اوپر کا نسخہ سہیچکا کا استعمال کریں اور چار جا
 یا چھ گنٹھ بعد اسکو ٹیل اور اپی کے کو اناستہ کر کے ہوا کی نالیوں سے
 بلغم کو نکالیں +

۳۔ مرض نیومونیا

پنپھر ہی کی ساخت کے انفلامیشن کو نیومونیا بولتے ہیں۔ اگرچہ بچہ کو پنپھی
 اکثر برا نکائی ٹس کے بعد ہی ہوا کرتی ہے تاہم بعض اوقات یہ از خود بھی
 پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ مرض برا نکائیس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ تب اسکو
 اصطلاح میں۔ برہانگو۔ نیو۔ مونیا۔ بولتے ہیں جبکہ بیان ہم اگر کریں گے
 اس جگہ پر ہم خاص نیو۔ مونیا۔ جو از خود پیدا ہوتا ہے اس کا بیان
 کرتے ہیں چنانچہ یہ بیماری تین درجہ میں تقسیم کی جا سکتی ہے +
 علامات درجہ اول مریض کو بخار رہتا ہے کہ جبکی شدت شام کے وقت

اس مرض میں
 عین
 ذات
 پتہ

کو اخیر میں ظاہر ہو یا ایسے بچہ میں پیدا ہو جو پہلے سی کمزور ہو تو اس
 حالت میں تیز علاج کرنا چاہیے بلکہ اس وقت ٹائٹارامٹک کو موقوف
 کر دین یا اسکی خوراک کم کر دین یا اس نسخہ کا استعمال کرین اور اس
 صورت کے اندر تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈوس باؤڈر بھی دے سکتے
 ہیں۔ نسخہ - وائیم اپی کے کوانا - ۱۰ - بوند - اگر میل سلی - ہم بوند
 ٹائٹیکرک ایٹر - ہم بوند - کپا وڈ ٹینکچر کفر - ہم بوند - انسڈاٹر ڈرام
 سبکو ملا کر ایک سال کے بچہ کو دو ڈرام کے مقدار میں جارجار گنٹھ بعد
 بلا دین - بچہ اگر بے چین ہو تو اب گرم کی تغیل کرین اور اغذیہ مقوی
 اسکی طاقت کو قائم رکھیں - براخاٹیس کی شدید علامتوں کے رفع ہونے
 کے بعد ایک عرصہ تک مرلین کو کھانسی رہتی ہے کہ جسے پھر اس مرض کے
 شدید علامتوں کی عود کرنے کا اندیشہ - پتا ہے پس اس مریض درجہ مرض میں
 مقویات سے علاج کرنا چاہئے اور سینہ پر اس روغن کی مالش کرین -
 نسخہ - کپا وڈ کفرینی منٹ - ایک انوکس - ٹینکچر لیٹی - ڈرام
 ٹینکچر اوپائی - ۳ ڈرام - سبکو ملا لیں +
 ٹائٹک دوادون میں اکثر اکثر آف باریک نہایت مفید دوا ہے خاصکراش
 حالت میں کہ جب بچہ کو تپلے تپلے دست بھی آتی ہوں اور اگر سینہ کی اجتماع
 بلغم کا پایا جاوے تو ہر رات کو اپنی - کے کوانا - لہلا دین - اگر ہو اکی نایاب
 اجتماع بلغم کا کثرت سے ہو تو اس نسخہ سے بہتر اور کوئی نسخہ نہیں ہے۔
 نسخہ - ڈیکاکشن - اف - سی - نیگا - دو آنوس اور ۵ ڈرام -
 کاربونٹ - اف - ایونٹیا - ۸ - گرین - ٹینکچر سلی - ۱۶ - بوند سرب
 اف - ٹو - ۳ ڈرام - سبکو ملا کر دو یا تین سال کے بچہ کو ۳ ڈرام

برائٹھٹس کے باعث پیدا ہوا ہے اگر اسکے رفع کرنے کے لئے مقدار ٹارٹارٹک
 کی بڑھائی جاوے گی تو سوائے نقصان کے ہرگز فائدہ نہوگا اور سبب کمزور
 ہو جانے کے سبب ہلاک بھی ہو جاسکتا ہے۔ البتہ اس مرض کے ابتدا میں جب
 سچہ دم بار بار اور بخلیف لیتا ہے تب سینہ پر چونکین لگا سکتے ہیں اور
 ٹارٹارٹک کا استعمال بھی بخوبی کر سکتے ہیں اور اس سے اکثر فائدہ ہی
 ہوتا ہے لیکن فرض کرو کہ ضیق پہر شروع ہو کر بار بار ہونے لگے اور اسکے
 رفع کرنے کے لئے اگر مقدار ٹارٹارٹک کی اور بھی بڑھائی جاوے گی
 تو اس سے کچھ فائدہ نہوگا بلکہ اور بھی شدت بار بار ہونے لگے گی اور
 سچہ حالت کنڈیشن میں مرجائیگا۔ پس یاد رکھنا چاہئے کہ جب برائٹھٹس
 میں پھونکی مشارکت کے باعث ضیق ہو جاتا ہے تو بیمار میں بخار کی
 زیادتی نہیں پائی جاتی ہے اور چند گھنٹہ کے اندر اس میں اختلاف پایا جاتا
 ہے یعنی کبھی تو اس میں تحفیف اور کبھی بلا وجہ کامل کے اسکی شدت ہوتی
 ہے اس ضیق کے ہونے سے آسکٹھی شن کی علامتوں میں کسی طرح کا فرق
 نہیں پڑتا۔ علاوہ برین جب سچہ کو اس قسم کی ضیق ہوتی ہے تب انگلیں
 اوسکی نیم وار ہتی ہیں یا انگوٹھی پہیلی کی طرف مڑ جاتی ہیں کہ جن علامتوں
 پھونکی خرابی صاف ثابت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اس قسم کے ضیق۔
 برائٹھٹس کے عین ابتدا میں ہو جاتی ہے کہ جب اوس مرض کے پیش
 علاج کا موقع ہوتا ہے۔ پس اس وقت اس ضیق کے رفع کرنے کی بہتر ترکیب
 یہ ہے کہ بیمار کے سپنہ پر ایک مسٹر پلاسٹر لگا دیں اور اوسکو کمر تک
 آب گرم میں بٹھا دیں اور حقیقت میں جب شام کے وقت یہ ضیق ہوتی
 ہو تب اس سے بہتر علاج اور کوئی نہیں ہے لیکن جب یہ علامتیں نکلیں

تو ہو اکی نالیون میں ساری رات کی بلغم جمع رہنے کے باعث اوسکو دلیم
 میں تکلیف ہوتی ہے پس اوس وقت تو کرانے سے جو جب وہ بلغم نکل جاتا ہے
 تب پہپڑے کے اندر ہوا بخوبی داخل ہو جاتی ہے۔ تاہم اگر اس تک ایک ایسی
 دوا ہے کہ جسکے استعمال کرنے سے سچے کی طاقت گھٹ جاتی ہے اور وہ سست
 ہو جاتا ہے پس اگر اس دوا کو اوس صورت میں زیادہ کھلایا جاوے
 کہ جب ہو اکی نالیان بلغم سے پر ہوں تو سچے سبب کمزور ہو جانے کے
 اسقدر زور سے دھیم کر سکتا ہے کہ جس سے چھوٹی چھوٹی نالیون میں ہوا
 گزر سکے لہذا نتیجہ اسکا یہ ہوگا کہ پہپڑے کے اندر ہوا بخوبی داخل ہوگی
 اور تب وہ پہپڑا سکڑ جائے گا۔ پس اس بات کو یاد رکھیں کہ انٹی۔ مونی کا
 اثر جقدر جو انون میں پیدا کر سکتے ہیں اوسقدر سچوں میں نہیں کر سکتے
 اور حقیقت میں اس کے کہانیسے تو نہایت اس دوا کو موقوف کرنا چاہیے
 یا اسکی خوراک کم کر دین یا اسکو دیر دیر گھنٹہ بعد دیوین تاکہ ان وقتوں کو
 مابین سچے کو طاقت آجاوے اس مرض میں تے کرانے سے دو فائدہ مقصود
 ہیں۔ اول ہو اکی نالیون میں جو بلغم جمع رہتا ہے وہ تو کرنے سے نکل جاتا ہے
 دوم جب سچے تو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اوس وقت نہایت دور
 دور پہپڑے میں بھی ہوا پہنچتی ہے کہ جس سے پہپڑا سکڑنے نہیں پاتا
 اس مرض کی نسبت ہم ایک علامت مٹیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بعض
 اوقات اس میں نہایت شدت سے ضیق ہو جاتا ہے کہ جو (اس بات کو ضرور
 یاد رکھیں) مرض کی شدت کے باعث نہیں ہوتا بلکہ وہ ضیق دماغ اور
 اعصاب کے مشارکت سے ہوتا ہے۔ اسکو اصطلاح میں نروسس۔
 ٹس۔ نیا بولتے ہیں۔ غرض اس ضیق کو ایسا قیاس کر کے کہ یہ مرض

بلا ضرورت کی نہ لگانی چاہیے۔ لیکن مرض کے شروع میں بچہ اگر طاقت و
 ہوا اور بخار کی بہت شدت ہو تو جو نکلیں لگا سکتے ہیں اور مرض کی درمیان
 اوس حالت کے اندر لگا سکتے ہیں کہ جب بچہ کی طاقت قائم رہے اور کھانے
 رک رک کر آوی اور میو کس۔ رائٹس ساری سینہ پر سناہی دیوے
 جو نکلیں اس خیال سے نہیں لگانی چاہیے کہ یہ بیماری دفعتاً رک جاوے
 دو سال کی طاقت و رجحان کے اسکا ہونا بڑی کے نیچے جا رہو نکلیں لگانی
 کافی ہیں۔ ٹائٹار امٹک بھی اس مرض کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ اگر
 کسی تندرست بچہ کو یہ قدر شدید برا نکلیں ہو جاوے تو چھپس یا ویکس
 ہمراہ تھوڑے کیا تو مل اور اپی کے۔ کو انا کی مرض کی شروع ہونے
 پہلے چوبیس یا ۳۶ گھنٹہ تک برابر جا رہا گھنٹہ بعد کھانا چاہے اس سے
 قبض منع ہوتا اور پسینہ آتا ہے جب اس علاج سے مرض کو افادہ ہو تو کیا کولر
 سوٹوں کر کے اس کے عوض تھوڑی تھوڑی مقدار میں انٹی مونٹیل وائین
 ہمراہ اپی کے کوانا۔ وائین کی بطور عرق کے پلاوین۔ لیکن جب یہ مرض
 شدت سے ظاہر ہوتا ہے تو انٹی۔ موئی۔ کو پہلے تھے لانی کے مقدار میں کھانا
 جائے بعد ازاں اسکو گھنٹہ گھنٹہ یا دو دو گھنٹہ بعد برابر ایک یا دو ذرت تک
 کھلا کر بچہ پر اسکا اثر قائم رکھنا چاہئے اور اگر یہ مرض اس قدر شدید بھی
 نہ ہو جبین انٹی۔ موئی کو زیادہ مقدار میں استعمال کر سکیں۔ تاہم
 اس بیماری میں اکثر شام کے وقت بخار اور ضیق کی شدت ہوتی ہے۔
 کہ جس وقت انٹی۔ موئی۔ اور اپی کے کوانا کو تھے لانی کے مقدار میں کھانا
 سی بچہ کو اکثر بڑا افادہ ہوتا ہے اور صبح کے وقت بھی ان دوا سوتے
 کرانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ صبح کو جب بچہ خواب سوتا ہے

کم ہوتی جاتی ہے لیکن تو اترا سکا بدستور رہتا ہے اور بعض دفعہ مثل -
 ہونگ کاف کی نوبت بنو بت کہا سنی ہونی لگتی ہے لیکن ہونگ کاف
 کی نسبت اسکی نوبت تھوڑی ہی عرصہ تک رہتی ہے اور اسمین دم
 کشی کے وقت وہ آواز نکالتی ہے جیسی ہونگ کاف مین نکلا کرتی ہے
 اور اسمین اکثر بلغم نہیں آتا اور کہا سنی کے ہمراہ اگر بلغم آوی ہی تو وہ
 بجز تھوڑی سی سے خون آمیز میو کس کے اور کچھ نہیں ہوتا اور بعض دفعہ
 صرف خالص خون ہی آجاتا ہے اور کبھی اوس میو کس کے ساتھ بڑھ
 کاذب کی ٹکڑے ملی ہوئی ہوتے ہیں۔ اور اب بچہ دم نہایت
 جلد لیتا ہے اور نوبت ضیق کی مرتے دم تک آتی رہتی ہے ان نوبتوں کو
 وقت بچہ کو نہایت تکلیف اور بی چینی ہوتی ہے یہاں تک کہ بعض دفعہ
 وہ ماہی بے آب کی طور پر تڑپتا رہتا ہے۔ جب یہ مرض اپنی کمال
 کو پہنچ جاتا ہے تب تنفس کا تو اسے کم ہونے لگتا ہے چہرہ کی سرخی جاتی
 - ہتی ہے اور وہ نیلگون ہو جاتا ہے کہا سنی دبی ہوئی اور بار بار نہیں
 آتی ہے۔ نبض کمزور پر جلد چلتی ہے۔ جون جون موت قریب آتی جاتے
 ہے۔ بچہ کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے یا اس پر غمو دگی طاری ہوتی ہے۔
 آخر کار دم لینی کے لئے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اس مرض میں کپڑن
 کی آواز صاف ہوتی ہے۔ اور اس گل - ٹی - شن - کرنے سے -
 سب - کر می - پی - ٹنٹ - رال - سناہی دیتا ہے۔ کہ ایک برائے نکاح
 کی علامتین ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی جو انون مین ہوا کرتی ہیں لہذا
 اونکا بیان ہم نہیں کرتے +
 علاج عموماً اس مرض میں صند کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو نکاحیں بھی

بیدار ہو جاتی ہے ہر اکثر اوقات قبل از شروع ہونے اس بیماری کے
 سچے کو چند روز تک زکام رہتا ہے یا یہ مرض قبل ظاہر ہونی چیکا یا نیئر
 کے یا انکی ہمراہ بیدار ہوتا ہے کہ جن حالتوں میں یہ مرض یا تو بتدریج یا بہت
 جلد شدید ہو جاتا ہے یا سنجار اور ضیق ایک بیک ظاہر ہو کر کھانسی بار
 بار اور تھوڑی تھوڑی آنے لگتی ہے اور بتدریج بیماری نہایت جلد
 شدید ہو جاتی ہے چہرہ مریض کا مسکراہٹ اور پر تکلیف معلوم ہوتا ہے
 سچے بچہ اور اسکی آنکھیں بیماری ہو جاتی ہیں اور وہ دم جلد جلد
 اکثر بیفا عدہ لینا ہے اور کھانسی کے باعث دم اکثر رک رک بھی جاتا ہے
 کہ جس سے مریض کو درد محسوس ہوتا ہے۔ سچے نہایت بے چین اور کڑوٹن
 بدلتا رہتا ہے اور اس وقت اگر کوئی اسکو چھڑی تو برائا مانتا ہے
 اور اگر اسکی کچھ بوجھنی تو جواب اسقدر جلد اور بے چینی کے ساتھ دیتا
 کہ گویا ہمہ تن وہ اپنی تنفس کے کام میں مصروف رہتا ہے۔ بعض دفعہ
 ایسا کہتا ہے کہ گویا کسی نے میرے اندر بیوس بھر دیا ہے یا سینہ کی ہڈی
 کے قریب میں تکلیف یا فم معدہ پر درد کی شکایت کرتا ہے ہوکا بالکل
 مر جاتی ہے اور ابتدا میں اگرچہ تشنگی کمال ہوتی ہے لیکن تھوڑے
 ہی عرصہ بعد یہ بات ہو جاتی ہے کہ بسبب تکلیف تنفس کے سچے بہت
 باقی نہیں بی سکتا ہے اور صرف اپنی ہونٹوں کو تھک کر لیتا ہے۔ زبان تر
 اور یا تو حالت صحت پر رہتی ہے یا اسپر ایک بار یک چھلی کے طور پر زرد
 مائل رطوبت جم جاتی ہے۔ باخانہ اکثر قبض رہتا ہے اور اس مرض میں
 جی متلے اورتے اسقدر کم ہوتی ہے کہ اکثر تے کی دوا بھی اس مرض
 میں خطا کر جاتی ہے جو ان جون یہ مرض بڑھتا جاتا ہے کھانسی کی آواز

گذرتی ہے بعد ازاں بچہ کو نیند آجاتی ہے اور تب اکثر کئی گھنٹہ تک حالت غمو
 میں چین سے پڑا رہتا ہے اور تب اکثر ایسا ہوا کرتا ہے کہ تخلیف دم کے
 باعث وہ اوٹھ بیٹھتا ہے کیونکہ چھوٹی ہوا کی نالیوں میں بلغم جمع ہونے
 باعث پہلے کے اندر ہوا رگ رگ کر جاتی ہے۔ بعد ایک ساعت کے
 بچہ کو کھانسی شروع ہوتی ہے اور وہ کھانسی کھانسی تو کر دیتا ہے
 کہ جسے کسی قدر بلغم جب نکل آتا ہے تب بچہ کو تھوڑے عرصہ کے لیے چھین
 آجاتا ہے زبان ہمیشہ تر رہتی ہے سینہ پر کان لگا کر سننے سے میوئس
 رانکس مستمع ہوتی ہے سینہ کی اوپر کے حصہ پر خشک اور نیچے کے حصہ
 پر مرطوب اور بہ نسبت سامنے کے پیچھے کے حصہ پر رانکس نیکور زیادہ
 تر سنائی دیتی ہے۔ پرکشن کی آواز صاف ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ جب
 پہلے کے اندر ہوا کا گذر بخوبی نہیں ہو سکتا ہے اور اس باعث
 کوئی ایک بڑا حصہ اس عضو کا سکڑ جاتا ہے تب پرکشن کی آواز ٹھوس
 پیدا ہو سکتی ہے۔ انجام اس مرض کا اکثر بخیر ہوتا ہے لیکن جب یہ
 مرض چھوٹی ہوا کی نالیوں میں گذر جاتا ہے تب وہ اکثر مہلک ہوتا ہے۔
 اس قسم کی برا نکائی۔ ٹس۔ کو اصطلاح میں۔ کے۔ پی۔ لی۔ ری۔
 برا نکائی۔ ٹس بولتے ہیں کہ جبین یا تو ساری یا کسی بڑے حصہ پہلے
 کی چھوٹی ہوا کی نالیوں میں یا تو ابتدا ہی سے یہ مرض ہو جاتا ہے
 یا بڑی نالیوں سے گذر کر ادنین آجاتا ہے اور اس صورت میں
 بلغم کے عوض پیپ پیدا ہوتی ہے یا ایک بروہ کا ذب بند کرنا کیونکہ
 بند کر دیتا ہے یا انفلاٹین پہلے کی ساخت میں گذر جاتا ہے۔
 علامات اس قسم کی مرض کی یہ ہیں کہ یہ بیماری بعض مغمضات ایک

اگرزی - مل - سلی ————— ہم بوند

ناٹیک - ایتر ————— ہم بوند

باراگورک ————— ہم بوند

افنڈ وائر ————— ساڑھی ۶ ڈرام

سبکو ملا کر بمقدار دو ڈرام کے ایک سال کی عمر کے بچہ کو چار چار گھنٹہ بعد پلاوین

۳۔ مرض برا نکھائی - ٹس

برا نکھیل ٹیوب یعنی قصبۃ الریہ کے انفلا میشن کو برا نکھائیس بولتی ہیں۔ یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔ اول اکیوٹ یعنی شدید دوئم کرائک یعنی مزمن اور اکیوٹ بھی دو طور کا ہوتا ہے اول کہ جب مین بڑی بڑی ہوگی نالیان مرض میں مبتلا ہوتی ہیں دوئم کہ جس میں یہ مرض چھوٹی چھوٹی نالیوں میں سرایت کر جاتا ہے پس +

اول بیان اکیوٹ برا نکھائی ٹس کا

علامات - جب یہ مرض خفیف ہوتا ہے اور صرف بڑے بڑے برا نکھیل ٹیوب ہی میں محدود رہتا ہے تب چند روز تک بچہ میں زکام کی علامتیں بائجی جاتی ہیں پھر بعد اسکے سرفی اور کھانسی کی بتدیج رفع ہونیکے عوض بخار کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے اور کھانسی بار بار اور روز روز اور ساتھ تکلیف کی آتی ہے نبض جلد چلتی ہے اور بچہ دم جلد جلد اور بقیہ عہد لیتا ہے۔ رفتہ رفتہ چہرہ سرخ اور جسم زیادہ تر گرم ہو جاتا ہے اور دم لینی میں بھی زیادہ تر تکلیف ہوتی ہے اور شام کے وقت کھانسی کی شدت زیادہ ہوتی ہے پہلی شب نہایت بے چینی سے

یا سیزس نکلنے والی ہوتی ہے تو پھلے اوسمین زکام کی علامتیں بائیں جانب ہیں
علاوہ برین جب پیپٹری میں مادہ بیو۔ بیکل کا جمع ہوتا ہے تب بھی بچہ
کو کٹار کی بیماری ہوتی ہے +

علاج جب یہ بیاہ صرف کٹار ہی ہوتی ہے تب مختصر علاج سے رفع
ہو جاتی ہے چنانچہ بچہ کو سرد ہوا سے بچاؤین اور مساوی درجہ حرارت
کے اندر رکھین۔ اگر اوسکی دودھ بڑھائی ہو گئی ہو تو اوسکی غذا کم کریں
ورنہ سبب تشنگی کے بچہ اگر زیادہ دودھ پینا چاہے تو ندین بلکہ وقتاً
نوقتاً تھوڑا تھوڑا آش جو اوسکو بلا دین۔ رات کی وقت آب گرم کی
تفیل کراؤین جس سے جسم کی حرارت رفع ہوتی ہے اور اگر بخار زیادہ
ہو تو ایک سال کے بچہ کو دو گرین جیمس باؤڈر ہمراہ نصف گرین کپاؤیل
کی ایک مرتبہ رات کے وقت کھلا دین اور دن کے وقت نسخہ الف
مرقبہ ذیل کا استعمال کریں اور جب بخار یک قدر رفع ہو جاوے تب
نسخہ ب مندرجہ ذیل کو بلا دین +

نسخہ الف

وائٹیم اپی کے کوانا _____ ۱۰۔ پونڈ
وائٹیم انٹی۔ موئیائی _____ ۳۔ پونڈ
بی۔ را۔ گورگ _____ ۲۔ پونڈ
اینڈ مکسچر _____ ۷۔ ڈرام
سبکوٹا کر سفیدار دو ڈرام کے ایک سال کی عمر کے بچہ کو چار چار گنٹہ بعد بلا دین +

نسخہ ب

وائٹیم اپی۔ کر۔ کوانا _____ ۱۰۔ پونڈ

بتی کسی میٹھی روغن میں تر کر کے اوسکے ناک کی اندر داخل کرین اس
ترکیب سے تھنہ اکثر کھل جاتی ہیں اور بچہ آسانسی دینم لگتا ہے۔ لیکن تکلیف
اگر زیادہ ہو اور اس ترکیب سے بھی وہ رفع نہو تو چھایکا دودھ بذریعہ
بچہ یا بتی کے پلاوین اور پٹنوں کو چوسنے نہ دین کیونکہ اس کی تکلیف زیادہ
ہوتی ہے۔ اگر اسکے ابتدا میں بخار ہو تو اس نسخہ کو دو مہنتہ یا ایک مہینہ
کی عمر کے بچہ کو چار چار گھنٹہ بعد پلاوین چنانچہ لائیکوارامونیا اسی ٹی ٹر
۶۔ بوند۔ وائینیم اپی کے کو اناہ بوند نائٹر۔ ایک گرین۔ اسٹنڈیکسچر
ایک ڈرام۔ سبکو ملا کر ایک خوراک کرین شکم کا خیال رکھیں اس ترکیب
سے ۱۰ یا پندرہ دن کی اندر بچہ تندرست ہو جاتا ہے اگر رطوبت خشک ہو کر ناک کی
اندر جمع ہو جاوے تو اسکو نکال ڈالین تاکہ بچہ کو تکلیف نہو +

۲۔ کٹار یعنی خاص زکام

جون چون بچہ کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اوسکی طبیعت اس مرض کی طرف
زیادہ تامل ہوتی ہے۔ بچہ کو ذرہ بھی اگر سردی لگ جاوے یا کوئی دانت
نکلنے والا ہو تو اسکو کٹار ہو جاتا ہے اور بغور نکل پڑنے دانت کے
وہ بھی فوراً رفع ہو جاتا ہے۔ زکام کے ساتھ ہی یا تو بچہ کو دست
لگ جاتے ہیں یا باری باری سے اسہال و زکام ہوتا ہے +
علامات۔ بچہ کو چنکین آتی ہیں۔ آنکھوں میں آئینہ جابری رہنا
ناک بہتی رہتی ہے کہا لینی ہوتی ہے جسم گرم اور نبض تیز چلتی ہے۔
اس بات کو یاد رکھنا چاہیو کہ اگر یہ یہ مرض اخصیف ہے لیکن اس کی
ترہنا جاسے کیونکہ ایسا اکثر ہوا کرتا ہے کہ یہ بیماری بیجا مکیبہ شدہ
مرض کی ہوتی ہے چنانچہ جب بچہ کو ہونٹک کاف ہو پو والا ہوتا ہے

چہرہ سال کے عمر تک حرکات تنفس گہٹی جاتی ہیں تاہم میں سے کم نہیں ہوتی۔ ہوا کے اندر داخل ہونے اور باہر آنے کے وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے اوسمیں بھی فرق پایا جاتا ہے چنانچہ بعض جوانوں کی اوسکی آواز تیز ہوتی ہے۔ سچہ کی اس آواز تنفس کو۔ اصطلاح میں۔ پیو۔ رائل۔ رس۔ پی۔ رمی۔ شن۔ بولتو ہیں +

۱۔ کو رامی۔ زرا

یہ ایک قسم کا زکام اکثر دو مہینہ کی عمر کے بچہ کو ہوا کرتا ہے + علامات۔ اس مرض میں ناک کا مبوکس ممبرین پھول جاتا ہے اسلئے سچہ کو دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پردہ مذکور کی رطوبت پہلے تو خشک ہو جاتی ہے بعد ازاں زیادہ پیدا ہو کر بہنی لگتی ہے اور اخیر میں اسکی خاصیت بدل کر وہ رطوبت گاڑھی اور پیپ کے طور پر ہو جاتی ہے اور بت بعض دفعہ خشک ہو کر گہرے ٹیکے طور پر بنتو نہیں جم جاتی ہے کہ جس سے سچہ کو دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے پہلے تو اس مرض میں بخار کی علامتیں باقی جاتی ہیں پر تھوڑے ہی عرصہ بعد رفع ہو جاتی ہیں اور سچہ تندرست ہو جاتا ہے جب یہ مرض زیادہ تر شدید ہوتا ہے تب سچہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اسکی دم اگر رک رک کر آوی یا بالکل رک جاوے تو سچہ دودہ نہیں پے سکتا اور چونکہ اوس حالت کے اندر دم لینے کے لئے منہ اسکا کھلا رہتا ہے تو طلق اور زبان اسکی اس قدر خشک ہو جاتی ہے کہ نکلنا دشوار ہوتا ہے + اسباب سردی کا لگنا۔ دانت کا نکلنا شکم کے اندر کریم ہونا بو عث اس مرض کے ہیں۔ علاج۔ اگر سچہ کو دم لینے میں تکلیف ہو تو کبڑی کی

باب دوم

مقالہ اول

امراض آلات تنفس

یہ دوحی بیماریاں ہیں جو پیٹری اور قبضۃ الریه میں ہوا کرتی ہیں۔ بعد پیدائش کی سچہ کسی عضو میں اس قدر تغیر نہیں واقع ہوتا ہے کہ جبکہ پیٹری میں ہوا کرتا ہے کیونکہ پیٹری قبل از پیدائش ہونے سے سچہ کے ٹھوس اور سکڑا ہوا ہوتا ہے رنگت اس کی کسی قدر بہوری اور سرخ ہوتی ہے۔ اور اوسمیں خون کی رنگین بنیاد ہوتی ہیں اور اوسمیں ہوا کا دخل نہیں ہوتا۔ لیکن جب سچہ پیدا ہو جاتا ہے تب پیٹری دفعتاً بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب سچہ دم لینا ہے تب رنگت اونکی گلابی ہو جاتی ہے اور سخت اس کی ملائم اور متغزل ہو جاتی ہے اور دباؤ سے مچھا سہٹ کی آواز آتی ہے اور حرکات تنفس بہت جلد جلد اور زور زور سے لیا جاتا ہے چنانچہ ایک سال کی عمر تک سچہ ایک منٹ کے اندر ۳۵ سے ۴۰ مرتبہ دم لینا ہے کہ جو ایک تندرست جوان کی نسبت دونا ہی اور اگرچہ

ہمیشہ نہیں ہوتی۔ اکثر باقی کی رات اچھی گنتی ہے اور دوسری رات بھی بچہ آرام سے سو سکتا ہو یا پروہی شکلین نظر آسکتی ہیں اور تب وہ خوف کہا کر چیخنے لگتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہو کرتا ہے کہ جب بچہ آدھے یا ایک گھنٹہ سو لیتا ہے تب وہ شکلیں نظر آتی ہیں اور اکثر ایک ہی رات کی اندر بچہ دو دفعہ خوف نہیں کہاتا۔ اور جن شکلوں میں مریض خوف کھاتا ہو وہ اکثر کسی چیز کی شکل ہوتی ہے مثلاً بچہ ایسا قیاس کرتا ہو کہ گویا کوئی کتاب یا بلی اس کے بستر پر چڑھا ہی آئی ہو۔ اسباب سبب اس کا کوئی دماغ کی بیماری نہیں معلوم ہوتی ہے بلکہ یہ مرض نسکیم کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے اور اکثر وہ خرابی قبض ہوتی ہو علاج جس خرابی نسکیم کے باعث یہ مرض پیدا ہوا ہو اس کے دفعہ کا علاج آسان تر کیوبسنی کریں مثلاً تیز حلاب کے عوض ہلکے بیٹنات اور مقوبات کا استعمال کریں بچہ کو اکیلا یا کسی اندھیرے مکان میں نہ نہروں۔

باب پہلا ختم ہوا

کہ جب تک یہ ترکیبیں یہی نکلی جاوین گی تب تک صرف دوسرے اس مرض کو فائدہ نہوگا۔ لیکن اکثر اوقات اور خاصکر اگر فالج کامل یا بہت دنوں کا ہو تو عضو مفلوج کو صرف حرکت دینی سے فائدہ نہوگا کیونکہ ان صورتوں میں اکثر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ مفلوج عضو کی پرورش بخوبی نہیں ہوتی ہے اور اوسکا حس اور حرارت بکرم ہو جاتی ہے غرض ان حالتوں میں ماسوا، دیگر علاجات داخلی اور حرکت دینی عضو مفلوج کی صحت کی ترکیب اور پر بیان کی گئی ہے ترکیب خارجی سے بھی علاج کرنا ضرور ہے۔ مثلاً پاؤں اور سیکرم ہڈی کے مقام پر دھنن ایک یا دو دفعہ کئی ہفتوں تک غیر گرم ہانپنا تراڑا چوڑین اور اگر اسے فائدہ نہو تو چند روز تک کسی اسٹی۔ میولنٹ۔ لینی سنٹ۔ کی۔ مالش کریں۔ مثلاً کروٹن۔ آئل۔ لینی سنٹ۔ یا۔ کُن۔ تہا۔ ری۔ ڈس۔ لینی سنٹ کہ جنکے لئے سی علیحدہ نسخہ ہو جاوی مگر اس پر چاہئے پڑیں۔ بعض دفعہ تار بجلی کے لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے +

۸۔ فرغ النوم

یہ وہ مرض ہے جس میں بچہ خواب میں کوئی وحشت ناک شکل دیکھ کر خوف کھا کر چونک پڑتا ہے اور بی اختیار زور زور سے چیخیں مارنے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ جب وہ ہوش میں آجاتا ہے تو اپنی والدہ یا دای کو لپٹ جاتا ہے اور تدریج بعض دفعہ ۱۰۔ سنٹ اور کبھی آدھی گھنٹہ بعد چپ ہو کر سو جاتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہایت زور زور اور بلک بلک کر اپنی والدہ کی آغوش میں سو جاتا ہے اور بعض دفعہ بعد رفع ہو جانے خوف کے صاف پیشاب خطا ہو جاتا ہے پر یہ بات

مرکبات فولاد کا استعمال کریں۔ اور نکس۔ وا۔ می۔ کا یعنی کچلا،
 خاکہ اس مرض کو نہایت مفید پڑتا ہے کیونکہ اسکے استعمال سے اکثر
 ایسا دیکھا گیا ہے کہ اعضائے مفلوجہ کے حرارت زیادہ ہو جاتی ہے اور
 انہیں طاقت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ نہی جو بچہ کو نہ کہلانی جا ہے۔ مگر
 چار۔ سال کے بچہ کو نکس۔ وامیکا۔ کا اکسٹرکٹ ایک گرین کا اٹھون
 حصہ دن میں تین مرتبہ دی سکتے ہیں اور مقدار اسکی ایک گرین کے
 چٹری یا چوتھائی یا تہائی گرین تک بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اسٹرکٹ۔
 ٹائین۔ کو کھانے سے جس طور پر جو انون کے مفلوج عضو میں اختلاج
 ہونی لگتا ہے اس طور پر بچہ کو نہیں ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ ایسا
 بھی دیکھا گیا ہے کہ اکسٹرکٹ۔ اف۔ نکس۔ وا۔ میکا۔ کی استعمال
 کرنے سے بچہ کے ساری جسم میں سخت تشنج ہو گیا ہے۔ علاوہ دو اکھلا
 کے عضو مفلوج کو فعل کو قائم کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہی اور
 جب اوسمیں طاقت بہت کم ہو جاوی تو آہستہ آہستہ اوسکو حرکت دین
 اور باتنگی مالش کریں کہ ایک مدت دراز تک بی حرکت رہنے کی باعث
 اوسکے عضلے خشک نہو جاویں۔ مثلاً اگر باؤن مفلوج ہو گئے ہوں
 تو بچہ کو آہستہ آہستہ پہراوین اور اوسکے باؤنکو مالش کر دیا کریں
 اور اگر ماتہ مفلوج ہو گیا ہو تو اوسکو آہستہ آہستہ حرکت دینی کی
 کوشش کریں چنانچہ تندرست ماتہ کو یا تو بالکل یا بہت دیر تک زندہ
 رکھیں اور بچہ کو پہلا کر اور انعام کا لالچ دیکر مفلوج ماتہ کو حرکت
 دینے کے لئے ترغیب دیں مثلاً اوسکو اوس ماتہ سے کوفی ہلکا چوم
 اوٹھانے یا کسی ہلکی چیز کو کہنچے کہیں اور اس بات کو ضرور یاد رکھیں

رفع ہو جاتی ہے یا اسکے ہمراہ جو جسمی علامات پیدا ہوتی ہیں صرف انہیں کے
رفع کرنے سے یہ مرض از خود جاتا رہتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہی
ہوتا ہے کہ جسمی شکایتیں تو علاج سے بہت جلد رفع ہو جاتی ہیں پر فالج
مفتون یا مہنون یا ساری غیر تک بھی رہ سکتا ہے۔

تیسرا سبب۔ اس مرض میں جبہ بقدر بد صورت ہو جاتے ہیں جو ان اوستھ
نہیں ہوتے کیونکہ جب یہ بیماری ایک عرصہ دراز تک رہتی ہے تو عضو
مفلوج اکثر نہایت دبلا پڑ جاتا ہے اور چونکہ اسکی حرارت بھی کم ہو جاتی
ہے اسلئے اسکی پورے ورشس بخوبی نہیں ہونے پاتی۔ علاوہ برین
بچون کے عضو مفلوج کی بالیدگی یا تو بالکل رک جاتی ہے یا وہ عضو
پہ نسبت عضو تندرست کی بہت دیر سے بڑھتا ہے پس ایک یا دو سال کے
اندر عضو تندرست کی نسبت عضو مفلوج نصف یا تین چوتھائی بچھوٹا
معلوم ہوتا ہے۔

علاج۔ چونکہ یہ بیماری مختلف بواعث سے پیدا ہوتی ہے اسلئے اسکے
علاج میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے مثلاً کبھی تو یہ بیماری دانت کھنٹی
کے ایام میں ہو جاتی ہے اور کبھی بعد چھک یا کھسار کے ظاہر ہوتی
ہے اور بعض اوقات وجع مفاصل کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن
مہرور سے ہی عرصہ بعد شدید مرض کی علامتیں رفع ہو کر صرف فالج
بھی باقی رہ جاتا ہے اور کبھی سبب کم طاقتی اور قبض کے اور کوئی بھی
جسمی علامت نہیں باقی جاتی ہے۔ پس اسی واسطے اس مرض
کا علاج داخلی مسہلات اور مقویات سے کرتے ہیں مثلاً تیز خطاب
کے عوض ملکہ مسہلات سوسٹین رکھیں اور بہ نسبت دیگر مقویات

ہو گیا ہے۔ اکثر اوقات یہ امر مرض کی ابتدائی حال کے معلوم کرنے سے دریافت ہو سکتا ہے چنانچہ اگر ایک ہی جانب کی مانتہ اور پاؤں میں نقص فالج ہو جاوے اور قبل یا بعد شروع ہونی اسکے کوئی علامت دماغ کی مرض کی پائی نہ جاوے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ باعث اس فالج کا کوئی شدید دماغ کی بیماری نہیں ہے پر اس وقت تشخیص

میں دقت پڑتی ہے کہ جب خاص کر ایک ہی عضو میں فالج ہو اور وہ فالج تدریج ہو ہو لیکن باعث اسکا اگر دماغ کی بیماری ہو تو عضو مفلوج کے صرف حرکت ہی میں خلل نہیں ہوگا بلکہ گاہے گاہے وہ از خود ہر تہرانے بھی لگے گا اور اسمین اختلاج بھی ہوگا اور اس صورت میں مانتہ یا پاؤں کی انگلیاں بل کہا جائیں گی۔ جب کنوٹشن کے بعد فالج ہو جاتا ہے تب اسکی تشخیص میں زیادہ تر دقت پڑتی ہو لیکن اکثر آسان قسم کے فالج کنوٹشن کی صرف ایک ہی نوبت کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہیں اور جب دسے کسی دماغ کی بیماری باعث پیدا ہوتی ہیں تو قبل از ہونے فالج کے بیمار کو کئی بار کنوٹشن ہوتا ہے اور ہر دفعہ کے کنوٹشن میں جو عضو مفلوج ہو نیوالا ہوتا ہے اسمین ایک عجیب طرح کی حرکت پائی جاتی ہے اور بعض دفعہ خاص کر صرف اسی مقام پر کنوٹشن کی حرکت ہوا کرتی ہے۔

انجام اگر فالج دفعاً ہو جاوے جیسا کہ دانت نکلنے کی ایام میں اکثر ہوا کرتا ہے تو انجام اسکا زیادہ تر نیک معلوم ہوتا ہے بہ نسبت اسکی کہ جب یہ مرض تدریج ہوتا ہے۔ اس مرض کی مدت میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ بعض دفعہ تو یہ بیماری بغیر علاج کے بھی چند دنوں میں

گو مشکل سے برا سقد نہیں کہ وہ کار آمد ہو سکے یا اگر باؤن رہ جاوے
تولیت کر بچہ اوسکو پہلا اور سیکٹر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص اوسکو جسم کو
سہارا دی تو اوس باؤن سے کسی قدر چلنے کا بھی قصد کرتا ہے +
تشخیص - اگرچہ یہ بات درست ہو کہ جب یہ مرض نہایت نئی بچوں کو
ہو جاتا ہے تو چند روز تک وہ دریافت نہیں ہو سکتا تاہم اوسکی تشخیص
بہت مشکل نہیں ہے کیونکہ اسکے شروع ہونے کے طور سے اور اس بات سے
کہ عضو مفلوج میں درد نہیں ہوتا ہے فوراً یہ مرض پہچانا جاتا ہے -
بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عضو مفلوج کا حصہ صحت سے بھی زیادہ ہو جاتا
اوس وقت کو لہو کی جوڑ کی بیماری کا احتمال ہو سکتا ہے خاص کر اگر باؤن
بھی کیس قدر مفلوج ہو گیا ہو کیونکہ اس حالت میں بچہ صرف صبح باؤن کو
بل کھڑا ہوتا ہے اور چلتے وقت جانب مفلوج کے باؤن کو اندر کی طرف
موڑ دیتا ہے اور اوس باؤن کو انگلیوں کو نذرست باؤن کی پشت پر رکھ
کھڑا ہوتا ہے اگرچہ یہ ساری علامتیں کو لہو کی جوڑ کی بیماری میں
بھی پائی جاتی ہیں تاہم مفلوج باؤن کے حصہ میں مختلف اوقات
کے اندر بڑا فرق پایا جاوے گا اور کو لہو کی جوڑ کی بیماری میں بغیر
کی جانب ماؤف کی اینٹری پر صدمہ پہنچنے سے کو لہو پر ایک درد
شدید ہوتا ہے اور اوس جانب کے کھنڈ پر ایک مستقل درد ہوتا ہے
کہ جو ایک خاص علامت کو لہو کی بیماری کے ہے مگر فالج میں یہ
علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں - اس مرض میں ایک اور امر کی تشخیص
یہ کرنی ضرور ہے کہ ہم یہ بات کیونکہ جان سکتے ہیں کہ فالج شدید
کسی مستقل مرض دماغ کے باعث ہے یا وہ خفیف فالج کسی اور سبب

ایسا ہو جا یا کرتا ہے کہ بعد پیدائش کے کسی مائتہ یا پانچ یا کسی خاص عضل کی حرکت یا تو کسی قدر یا بالکل جاتی رہتی ہے ہر اکثر اوقات یہ مرض کسی بیماری کے باعث ہے جو جاتا ہے گو وہ بیماری کسی خفیف ہو مثلاً سچہ کہ اگر خفیف کنولشن ہو جاوے یا صرف ایک یا دو روز تک فقط اوسکا سر بیماری ہی رہے تب بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہی ہو ا کرتا ہے کہ دماغ کی جس مرض کے باعث سچہ فالج ہو جاتا ہے وہ مرض نروسٹید اور نہ ویر پا ہوتا ہے پس یہ بات یاد رہے کہ سچہ کو چاہے کیسا ہی خفیف کنولشن ہو جاوے بعد گزر جانے اوسکے نوٹ کے اوسکر مائتہ اور پانچ کو خوب طرح امتحان کریں اور دیکھیں کہ لگے کر طور پر وہ اونکو بخوبی حرکت دی سکتا ہے یا اونکی طاقت میں کی طرح کا فرق پڑ گیا ہے یا نہیں تاکہ اوسکا علاج فوراً شروع کر دیا جاوے۔ بعض دفعہ بلا کسی ظاہر دماغی مرض کے بھی فالج ہو جاتا ہے مثلاً کبھی تو دانت نکالنے کی شدت سے اور کبھی ایک مدت دراز تک قبض رہنے سے اور بعض دفعہ کم طاقتی کے باعث اور کبھی بخار کے بعد بھی سچہ لگو فالج ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کسی محدود مقام پر سر کے کونے سے ہی یہ بیماری ہو جاتی ہے چنانچہ پھر کے زینہ پر بیٹھیں کسی سچہ کا ایک باؤن مفلوج ہو گیا تھا۔

علامات۔۔۔ بجز لقوہ۔ یعنی۔ فی۔ شیل۔ پی۔ را۔ لی۔ رس۔ کر کہ میں ابتدا ہی سے چہرہ کے عضلون کی طاقت بالکل جاتی رہتی ہے باقی اور سب قسم کے فالج میں عضو مفلوج میں کسی قدر حرکت باقی رہتی ہے مثلاً اگر بارہ مفلوج ہو جاوے تو سچہ اوسکو کسی قدر مائل کر سکتا ہے۔

دوا کی برداشت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ حقیقت میں بڑھ شدت قسم کے
کو ریا کی ابتدائین نہایت مفید پڑتی ہے دوسری دوا بلا ڈونا ہے۔
لیکن اس دوا کا استعمال صرف ابتدا درجہ ہر موقوف نہیں ہر ایک
اوس حالت میں یہ دوا زیادہ تر مفید پڑتی ہے کہ جب رعشہ بہت
دنوں تک رہتا ہے اور کم نہیں ہوتا یا شدت سی بڑھ جاتا ہے
اور اوس صورت میں کہ جب فولاد کی مرکبات کا استعمال منع ہو یا
جب اونکے استعمال سے فائدہ نہ ہو غرض اسی حالت میں بلا ڈونا کو
تھوڑے تھوڑے مقدار میں چار چار یا چھ چھ گھنٹہ بعد ۱۰۔ یا بند رہ
دن تک کہلانا چاہئے کیونکہ اسکا فائدہ جلد ظہور میں نہیں آتا۔ لیکن
ٹارٹار امٹک سی حقد ر جلد فائدہ ہوتا ہے اوس قدر اس دوا بھی
نہیں ہوتا بہ۔

۷۔ پی۔ را۔ لی۔ س۔ یعنی فالج

جب سچون کے نظام عصبی میں خلل واقع ہوتا ہے تب یا تو اونکو رعشہ
ہو جاتا ہے یا حرکت کی طاقت جاتی رہتی ہے یعنی فالج ہو جاتا ہے اور
فالج کے ہوئے والدین کو نہایت تردد ہوتا ہے جو ان کو دماغ یا
حرام مغز کی کسی شدید بیماری کے باعث اکثر فالج ہوتا ہے اور یہ
اکثر مہلک بھی ہو جاتا ہے۔ عوام الناس اسباب کو جانتے ہیں اور اس
سمجھتے ہیں کہ سچون میں بھی یہی قاعدہ راست آتا ہے لیکن یہ بات
غلط ہے کیونکہ سچون یا لڑکوں کا فالج اگرچہ اکثر دیر سے برقع ہوتا ہے
اور بعض دفعہ لا علاج بھی ہو جاتا ہے تاہم بہت ہی کم مہلک ہوتا
ہے + اسباب سچونکو پیدائش سے فالج بہت کم ہوتا ہے لیکن

اس علاج داخلی کے خارجی علاج بھی کرنا چاہیے مثلاً بچہ کو غسل آب سرد
 یا تقویٰ لگو کر دکر ادین (دیکھو قرابادین صیان) اور تبدیل آب ہو
 اور غذا مقوی اور سریع الهضم کھلاوین۔ لیکن جب یہ بیماری شدت پکڑ
 جاوے۔ تب بچہ کو ہمیشہ بستر پر رکھنا چاہیے اور بالکل حرکت نہ کرنے دینا
 چاہیے اور اس وقت اون باتوں کی احتیاط رکھنی چاہئے کہ جسے
 بچہ کا مزاج پکڑ جاوے کیونکہ مزاج کو پکڑ جانے سے حرکت زیادہ شدت
 سے ہونے لگتی ہے لہذا بچہ کو ایسے مکان میں رکھیں کہ جہاں سوجا
 او سکے خدمت گاروں اور کسی دیگر شخص کا گذر نہ ہو ماورا ان حیا کو
 دو دو اس حالت میں خاصکر مفید پڑتی ہیں ایک توانٹی۔ مونی۔ اور
 دوسری بلا ڈونا۔ اس مرض کے شدید قسم کے ابتداء میں اکثر کستی
 بخار ہو کرتا ہے اور جسم نہایت خشک وراٹھیں بالکل پسینہ نہیں
 آتا غرض اس حالت میں انٹی مونی۔ کے استعمال کرنے سے صرف پسینہ
 ہی نہیں آتا۔ بلکہ مرض کی حرکتوں کے روکنے میں بھی یہ دو مفید
 پڑتی ہے اور ساتھ اس دوا کے اگر گرم ہوا کا بہاؤ بھی دیا جاوے
 تو پسینہ خوب پیدا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو صرف بستر پر آرام کرنے گرم
 ہوا کا بہاؤ لینا اور رات کو وقت ایک خوراک ٹارٹار امٹک کی
 کہا میسر شدت حرکتوں کی کم ہو جاتی ہے ہر اکثر ٹارٹار امٹک۔ کو
 اس مقدار میں چار چار گھنٹہ بعد کھلانا چاہیے کہ جتنے جی تیلے پیدا ہو
 لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ جب تک حرکتوں کی شدت کم نہیں ہوتی
 ہے تب تک نہوڑی مقدار ٹارٹار امٹک سے جی نہیں ملتا ہے اور
 یہ کہ چون چون اس مرض کو تخفیف ہوتی جاتی ہے تو نون نون اس

ہی چلنا پھرنا اس حالت میں خوف ناک ہوتا ہے اور بعض دفعہ بچہ بالکل کھڑا
 ہی نہیں ہو سکتا اور سبب حرکت چہرہ کے عضلوں کے بیمار کو لگنت ہو
 جاتی ہے اور ٹکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور سوتی وقت بھی حرکت ہوتی
 رہتی ہے اور اس وقت ٹانگوں میں خاصکر حرکت زیادہ ہوتی ہے
 اور جب یہ مرض بہت شدت سے ظاہر ہوتا ہے تب بچہ کی عقل میں فرق
 پڑ جاتا ہے اور وہ مثل سادہ لوح کی ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں قلب
 کی حرکات میں بھی فرق پڑ جاتا ہے اور مَرَمَر کے آواز سنائی دیتی ہے
 لیکن یہ علامت قلب کی ساخت کے بگڑ جانے سے نہیں ہوتی بلکہ قلب
 کو والو میں جو عضلے لگی ہوتی ہیں۔ مثل اور عضلات جسم کے اوٹین
 بھی حرکت بقاء عہدہ ہونی لگتے ہیں کہ جس باعث وہ مَرَمَر کی آواز
 سنائی دیتی ہے یہ بیماری اکثر مہلک نہیں ہوتی اور جب ہو جاتی ہے
 تب سبب شدت حرکتوں کے بچہ ڈنڈا ل ہو کر حالت بیہوشی میں چند گھنٹہ کے
 بعد مر جاتا ہے +

صورت حال تشہیحی۔ بعد وفات کو لغش کو چیرنے سے اسپائی۔ نل۔ کارڈ
 اور اس کے پردہ سرخ نظر آتے ہیں اور انہیں اجتماع خون کا پایا جاتا
 اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اسپائی۔ نل۔ کارڈ میں خراش ہوئی
 یہ مرض پیدا ہوتا ہے +

علاج۔ جب یہ مرض خفیف ہو تو اسکا علاج مقویات اور مسہلات سے
 کرنا جائی شاکومی مرکب فولاد کا استعمال کرین اور گاہے گاہے ملے
 مسہلات سے تلمین رکھین اور جب فولاد سے فائدہ نہ ہو تو سلفٹاف
 زنک۔ یا لائی۔ کوار۔ ارسنی۔ کو۔ لئس۔ کا استعمال کرین اور ساتھ

۶۔ مرض کوریا یعنی رعشہ

یہ مرض خاص کر بچوں کا نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری اکثر اوس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب لڑکا بچے دانت نکال لیتا ہے اور آثار بلوغت کو شروع ہونی لگتی ہیں۔ علامات پہلے بچہ بڑھپ حرکت کرنی لگتا ہے کہ جسکے روکنی کا اوسکو اختیار نہیں ہوتا۔ بعد ازاں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جسم کا صرف ایک ہی حصہ اور خاص کر بازو و بقیہ حرکت کرنے لگتا ہے مگر باؤں ابتدا میں قیلاً نہیں ہوتا لیکن چند روز بعد باؤں بھی حرکت کرنے لگتا ہے کہ جس باعث چلتی پرتی وقت بچہ گاہے گاہے گر پڑتا ہے اور اب چہرہ کے عضلے بھی بقیہ بلا ارادہ اسطورہ حرکت کرنے لگتی ہیں کہ گویا کچھ ٹانہ چڑا رہا ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے تب تھوڑی عرصہ بعد بیماری صرف ایک ہی جانب پر محدود نہیں رہتی بلکہ اوس وقت دونوں ٹانہ اور دونوں پاؤں اور اخیر میں سارے جسم کے عضلوں حرکت ہونے لگتی ہے۔ اگر بیماری کی مزاج میں کسی باعث سے جو شہ ہو جاوے تو حرکتوں کو ترقی ہوتی ہے اور جب مرض کسی خاص جہ پر دہیان لگتا ہے تب اکثر وی کم ہو جاتے ہیں اور سونی وقت اکثر پر ہمیشہ نہیں وی موقوف ہو جاتے ہیں جب یہ مرض خفیف ہوتا ہے تب ایک یا دونوں ٹانہ گاہے گاہے جھک پڑتے ہیں اور بچہ کسی چیز کو سنبھالنے سے ہکڑ نہیں سکتا یا چند عرصہ کے لئے چہرہ کے عضلے ٹھیک پڑتے ہیں لیکن جب یہ بیماری شدید ہو جاتی ہے تب اکثر جسم کی دونوں جانب اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں بچہ کسی شے کو ہکڑ نہیں لکھتا اور جو ہکڑ لیتا بھی ہے تو ایک یا دو لمحہ کے بعد وہ شے ٹانہ سے گر پڑتی

۵- صرع

اس مرض کو انگریزی میں اپی-لپسی- بولتے ہیں اور علامات اسکی بعینہ اسی طور پر ہوتی ہیں جس طور پر جوانوں میں ہائی جاتی میں لیکن بعض دفعہ جب یہ مرض بچہ کو ہوتا ہے تو بجا رنوبت کے وقت بیہوش نہیں ہو جاتا ہے اور کبھی رنوبت کی شروع ہونے سے پیشتر بچہ بغیر کسی قوی باعث کے خوف کہا کر ادھیات بھی بکھڑکتا ہے +

اسباب- یہ مرض موروثی ہے اور خوف کہا جانا یا دفعتاً شدت سے غصہ ہونا یا سر کے بل گر پڑنا شکم کے اندر کرم ہونا اور دانوں کا ٹکنا بھی بواعث اس مرض کے ہیں +

انجام اس مرض کا بڑا ہوتا ہے- علاج یاد رکھنا چاہیے کہ اس مرض کو مفید تبدیل آب و ہوا اور نظام غذا اور ریاضت بدنی سے فائدہ ہوتا ہے اور سفر کسی دوا سے نہیں ہوتا- مرکبات زنک کی تعریف بہت لوگ کرتے ہیں لیکن اکثر اسے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے کو کسی کام میں مشغول کرانا چاہئے کیونکہ یہ بات اکثر دیکھنی میں آتی ہے کہ جب تک بچہ کبیل کو دیا کسی کام میں مشغول رہے تب تک انکو اس مرض کی رنوبت نہیں ہوتی بلکہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب کبیل کو دکر تھک کر بیٹھ رہتی ہیں یا رات کو سوتے وقت یا صبح کو جاگنے کے بعد غذا بیمار کی ہلکی اور معوی ہونی چاہئے اور گوشت بہت کم یا بالکل نہ کھلانا چاہئے کیونکہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جب بچہ کو گوشت کی غذا بہت دی جاتی ہے تب رنوبت بہت جلد جلد اور شدت سے ہوتی ہے اور جب وہ صرف دودھ یا بقولات کی غذا اگر تازہ بہت کم ہو جاتی ہے +

دہجیان ایک انج کی نہائی چوڑی کتر کر پہلے دو دہجیان دونوں میں
 پراسس سے لیکر قینچی کے طور پر اوکھٹو خلاف جانب کو آرٹ کے
 باہر کی حصہ پر لگا دین - دوم ایک دہجی کو سر کی چھری بالون کی انگری کی
 جگہ سے لیکر ناک کی جڑ پر لگا دین - سوم - کئی دہجیان سر کے آری پاس
 ترکیب سے لگا دین کہ دے چند یا پرماندہ قینچی کے ایک دو سر سے
 لمبا دین چارم ایک دہجی اس قدر لمبی لیون کہ جس کے تین پنچ سر کی
 چاروں طرف آجا دین - اسکا پہلا پنچ ہووے گا نوں کے اوپر اور
 اکسی - پی - ٹل - پرو - ٹیو - برسن - کتر کسی قدر نیچے آجا وی تاکہ ساری
 دہجیوں کی نوکین اوس پنچ سے قریب چوتھائی انج نیچے لٹکتے رہیں -
 تب ان نوکوں کو اوس پنچ پر موڑ کر اُنہر باقی دو پنچوں کو اسی
 طور پر لگا دین کہ جس طور پر پہلی پنچ کو ہووے اور کا نوں پر بیٹھا ہوتا
 اس ترکیب سے سر پر ایک مساوی اور مضبوط دباؤ پڑتا ہے لیکن اسکے
 نتائج کو بہ احتیاط تمام دیکھنا چاہئے کسلی کہ اس ترکیب سے بعض فہ
 کم - پری - شن - آفدی - برین یعنی دماغ کے دب جانی کی علامتیں
 پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس وقت اون ہتھیوں کو ہٹا کر دینا چاہیے
 سر سے بانی نکالنا بھی ایک اور علاج اس مرض کا ہے ترکیب جسکی یہ
 ہے کہ ایک باریک سکینولا - اور ٹروکار - لیکر سامنے کے یا فوخ کو ڈیرہ
 انج تفاوت کو کورو - نل - سوچر پر ایک سوراخ کر کے بانی نکال لین
 اور جس وقت بانی نکلتا رہے اور بعد نکل جانے بانی کے بھی سر پر کسی
 قسم کا دباؤ رکھنا چاہیے

بانی بہرہ بنیاد یہ ہوتا ہے کہ بچے سے اپنی سرکا بوجھ سنبھل نہیں سکتا اور
آہستہ آہستہ اور بعض دفعہ اپنی سرکوتا تھوشتی تمام کر جاتا ہے۔ بچہ یا تو
اندھا یا بہرہ ہو جاتا ہے اور کسی جانب کا ہاتھ یا پاؤں اسکا مفلوج
ہو جاتا ہے اور وہ بیوقوف سا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اسکو
کن۔ وشن بھی ہو جاتا ہے۔ اسباب سب اس مرض کے ہنوز
دریافت نہیں ہوئی لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ بیماری دماغ کی انفلاشن
کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

علاج - اگر دوائے کچھ بھی فائدہ حاصل کرنا منظور ہو تو علاج اس
بیماری کا عین ابتدائین کرنا چاہئے چنانچہ بچہ کا سر منڈوا کر اسبہرہ
روز ایک یا دو ڈرامہ ہلکا مرکب پریل آئٹھ منٹ کی مالش کریں اور
سر کو ایک پشیمنے کو کن۔ ٹوٹ سو ڈانک رکھیں تاکہ ہوا لگ کر سینہ
نہ رُک جاوے لیکن اگر بچہ کا سر گرم ہو جاوے تو ٹوپی کو اتار لینا چاہئے
چوتھائی یا آدھا گرین کیا ٹول دینیں دو دفعہ کھلاوین اور اگر دست
لگ جائیں تو صرف مرہم مذکورہ بالا کی مالش کریں اس علاج کو ہر
ایام۔ روز تک برابر جاری رکھیں اور اگر اس سے کچھ فائدہ نہ دے
مقدار کو رفتہ رفتہ گھٹاویں لیکن مالش کے بعد بھی کن ٹوٹ کو ہٹا
دیں اگرچہ یا آہستہ ہفتہ کے بعد جذان فرقی معلوم ہو تو کیا ٹول کے
ہمراہ کو میملکی ڈاؤ۔ ٹک دوا ملا کر استعمال کریں اور گردن کی پیچھے
سٹن یا نیشتر لگاویں۔ اور اگر سر بہت گرم اور بچہ بہت بوجھین ہو تو
سر پر گاہے گاہے جو نکین لگاویں۔ سر کو اسٹی کنگ پلاسٹر سے باندھنا
بھی ایک علاج اس مرض کا ہے جسکی ترکیب یہ ہے کہ پلاسٹر مذکور کے

فشیخص - اس بیماری کو دماغ کے افلا میشن یا کنجین سے فرق کرنا چاہیے
 اس مرض کی پہچان یہ ہے کہ رخصا ری بچہ کے ہیکر اور سرد ہوتی ہیں
 انگلیں نیم دا اور تپلیوں میں حس نہیں ہوتا بچہ دم سرد اور آہستہ
 آہستہ لیتا ہے طفل اگر بہت چوٹا ہو تو اس مرض اور کنجین میں فرق
 کرنے کی نہایت آسان ترکیب یہ ہے کہ اوسکے یا فوخ یعنی تالو کا ملاحظہ
 کریں چنانچہ اگر علامتوں کا باعث زیادہ خون یا افلا میشن ہو تو یا فوخ
 محدب اور اونچا ہوگا اور اگر علامات بسبب کمی خون یا کم خلتی کے پیدا ہوں
 تو تالو مقعر اور دبا ہوا ہوگا +

علاج اس بیماری میں کسی قسم کا تنقیہ منع ہے بچہ کو دودھ یا شوربہ
 پلاوین اور بطور دوا کے اردو - مالٹ - اسپرٹ - اف - ایمنوٹیا یا شیخ یا
 دس قطرے کی مقدار میں چار چار گنٹہ بعد دیوین یا بعض اسکے دیا
 ۱۰ - بوند برانڈمی ہمراہ اراروٹ کی پلاوین اگر اسہال موجود ہو تو اسکو
 روکیں - دائمی یا والدہ کو کہہ دیں کہ بچہ کو کھرا کرے اور اوسکے ماتھے
 یا پاؤں کو ہارچہ پشیمہ سے ڈانک رکھیں +

۳۔ کرانک مائڈروفلس

علامات - اس مرض میں دماغ کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور سہڑکے
 مانند سبوجہ کی ہو جاتا ہے ٹیوین کے جوڑ کھل جاتی ہیں اور پشانی کی
 ہڈی اونچی ہو جاتی ہے اور دونوں جانب کے پھیل جاتی ہیں اور
 پیچھے کی ہڈی بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور بچہ کا چہرہ بد شکل
 مانند شلٹ کے ہو جاتا ہے نتیجہ دماغ کے پھیل جانی اور کاسہ سر کی اندر

ہوتی۔ لیکن چون چون یہ مرض بڑھتا جاتا ہے مریض کو ہڈیاں بڑھتی ہیں اور
 دوسری شکایت زیادہ ہوتی جاتی ہے اور خاف صکر راتین اور سخی نہایت
 تکلیف سے کشتی میں اور اسکو تیز علاج کی بالکل برداشت نہیں ہوتی
 غرض اس صورت میں جب اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے تب پوری
 مقدار مارفیا کے دینے سے اُن علامتوں کو نہایت افادہ ہوتا ہے +
 بلکہ ابتدا میں کہ جب اس بیماری کا بڑا اثر ہو۔ ہوتا ہے بلکہ کالکنا
 نا جائز ہے لیکن جب یہ مرض بڑھ جاوے اور بیمار سست اور بیوش
 ہونے لگے تب سر کے چذیاں پر بلٹر لگانا چاہئے اور اس بلٹر کو خلاف
 اُس قاعدہ کے جو مہنہ فرازا دین صیان میں بتلایا ہے ۱۰۔ یا بارہ گھنٹہ
 تک برابر رکھنا چاہئے کیونکہ یہ بات قابل یاد رکھنی کے ہے کہ مائڈرو-
 کفلس کی بیماری میں جلد پر چھ لادیر سے نکلتا ہے +

۳۔ اسپورٹس۔ مائڈروکفلس

اسپورٹس کے معنی میں کاذب کر۔ علامات اس بیماری کی یہ ہیں
 کہ بچہ کا سر بیماری اور وہ خواب ناک ہوتا ہے۔ اپنی دانتی کی غوش
 میں نیم خواب نہ ڈال ہو کر بڑا رہتا ہے اور نتو اسکو سر اٹھانے کی طاقت ہوتی
 ہے اور نہ سر اٹھانا جاتا ہے انگلیں کبھی تو کھولتا ہے اور کبھی بہ باعث
 کمال ضعف کر بند کر لیتا ہے زبان کسی قدر سفید ہوتی ہے اور جسم سرد
 یہ بیماری کئی مہینہ کی عمر سے دو یا تین برس کی عمر کے بچوں کو ہو جایا
 کرتی ہے اور ایسے بچوں کو ہوتی ہے جو نازک مزاج اور نہایت کمزور
 ہوتے ہیں +

کمی عرق کا استعمال کریں اور جُستِ ایک مرتبہ کھلکر آجاوے تو اسی نمک کو
ہمراہ ٹائٹریٹ۔ اف پوٹاشس کی کھلاوین تاکہ اجابت کھلکر آتی رہی
اور ادرا رہی ہوتا رہے +

سیوم مرکبات پیما ب کو۔ کسی جلاب کو ہمراہ سبجز دست لانے کے
کسی اور فائدہ کے لئے دینا چاہئے۔ سر پہ آب سرد کر لگانے سے بھی
فائدہ ہوتا ہے لیکن اس ترکیب کو اسی حالت میں کرنا چاہئے کہ جب
دماغ میں اجتماع خون ثابت ہو اور بیماری کے درجہ دوم اور سوم
میں بھی لگانا چاہئے

غذا - ابتدا میں کہ جب علامتوں کی شدت ہوتی ہے باخانہ
قبض رہتا ہے اور جی متلے شدت سے ہوتی ہے اس وقت بیمار کو بہت
ہی کم غذا دینی چاہئے۔ لیکن بعد ازاں ہلکی اور مقوی غذا مثلاً ساگوڈا
یا آب یخنی اور سکوضور پلانی چاہئے +

افیون - اس مرض میں افیون کے استعمال کرنے میں نہایت احتیاط
درکار ہے اور ان دو حالتوں کو سوا اسکو کسی اور حالت میں ہرگز نہ استعمال
کرنا چاہئے +

اول - ان صورتوں میں کہ جب یہ مرض نہایت شدت سے ظاہر ہو
اور سچہ کو دیوانہ کے طور پر جوش آجاوے اور بعد تنقیہ تام کے
اگرچہ سر کی گرمی اور چہرہ کی سرخی رفع ہو گئی ہو اور نبض بھی جلد
کمزور چلنی ہو تاہم اگر جوش رفع نہ ہو تو افیون کے کھلاؤ سے چین آجاتا
ہی اور سچہ سو جاتا ہے اور بعد جاگنی کے اسکو نہایت آرام آجاتا ہی +
دوم - ان حالتوں میں کہ جب یہ بیماری بہت شدت سے ظاہر نہیں

تاہم اس موقع پر ہیکیم بتلانا بہ ضرور ہے کہ ایسے بچہ کا خون جتنا مزاج -
اسکرافیلوس ہے نہایت احتیاط سے نکالنا چاہیے اور حقیقت کے اندر ضد
کا سارا مطلب صرف جو نکونکر لگانے سے حاصل ہو سکتا ہے اور اگر ابتدائی
سی اس مرض کے دوسری درجہ کا علاج کرنا پڑے تو ہرگز خون نہ نکالنا
چاہئے ۔

ووم مسہلات - اس مرض میں مسہلات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن
انکو کہلا کر صرف کہلکر دست آفرین بہ اکتفا نہ کرنا چاہئے بلکہ چند روز تک دیکھنا
کو جاری رکھنا چاہئے چنانچہ بعد رفع ہو جانے قبض کے تھوڑی سی تھوڑی مقدار
میں کسی حلاب کو چار چار یا چھ چھ گھنٹہ بعد کہلانا چاہئے لیکن یہ مطلب
اسطور سے نہیں حاصل ہو سکتا ہے کہ ہر روز صبح کے وقت بچہ کو کوئی
تیز حلاب کہلا دیا جاوے کیونکہ علاوہ اندیشہ تے ہو جانے کے اس ترکیب
میں یہ بھی ایک بڑی قباحت ہے کہ جس خوراک سے بچہ کو پہلے دست
آتا ہے دوسری روز وہ خوراک مکتفی نہیں ہوتی لہذا دستوں کو لانی
میں ہر روز ایک نئی قباحت آن پڑتی ہے اس مرض کے ابتدائیں ہمیشہ
جی متلے اور قے ہوا کرتی ہے لیکن یہ علامتیں خون کے نکالنے سے
اس قدر کم ہو جاتی ہیں کہ معده ایک خوراک کیا تو مل اور حلاب یا کیا تو مل
اور اسکا کوئی اثر قبول کر لیتا ہے لیکن جیتک دست نہ آوین -
تبتک ان دوا کو تین تین گھنٹہ بعد کہلانا چاہئے بلکہ ایک حصہ بھی کر دین
تا کہ انکا عمل جلد ہو جاوے لیکن اگر تے تھوڑے تو ان دوا کا استعمال نہ کرنا
ہی بہتر ہے اس صورت میں زیادہ مقدار کیا تو مل میں شکر ملا کر بچہ
کو اکیڑی دفعہ کہلا کر تھوڑی تھوڑی عرصہ بعد سلفٹ ان گنی شیا

نہ آوین پلاتے جاوین اور بعد اسکے دو یا تین راتیں برابر اسکو پھوڑ
 تھوڑی مقدار میں کیا تو مل کہلاوین اور جو کس قدر بخار رہ جاوے
 اور قبض کی شکایت ہو تو دینین ۲ یا ۳ مرتبہ اوپر کے نسخہ کا
 استعمال کریں۔ بلا اشد ضرورت کے سر پر جو کنبین نہ لگا دین اور
 جو ایسی ہی ضرورت ہو تو بہت نہ لگا دین کیونکہ اسکو آفینوس
 مزاج کریں جو نکو خون نکلنے کی برداشت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ بعد
 ہو جائی ان حملہ مرض کے بعض دفعہ بھی ایک مدت تک کمزور رہتی ہیں
 اس صورت میں ادویات ٹانگ کا استعمال کریں مثلاً الفیوژن
 اف۔ کلینا۔ دو آفوس۔ اور دو ڈرام الفیوژن اف روبر
 ساڑھی ۳ ڈرام۔ ٹینیکورارنشیائی۔ دیرہ ڈرام +
 سکو ملا کر تین سالکو سچہ کو مقدار ۳ ڈرام کے دینین دو دفعہ پلاوین
 یا سائیرٹ اف ایرن اور کوئین کا استعمال کریں اور ادویات
 گرین کیا تو مل ہمراہ پانچ یا چھ گرین روبر کے ہر رات یا ہر دو رات
 رات کہلا کر تینین رکھیں +
 اگر سر کی شکایت بار بار ظاہر ہوتی ہو تو گردن کے پیچھے ایک سٹن
 لگا دین کیونکہ رے کے قریب سی مواد کو بخاری رہنے سے مرض ہائیدرو
 فیسیس کا حملہ اکثر رک جاتا ہے۔ جب موقع اس مرض کے کوئی کانہ ملے
 اور یہ بیماری ظاہر ہو پڑے تب ان تین ترکیبوں سے اسکا علاج
 کرنا چاہیے + اول خون نکالنا دو گم مسہلات کا استعمال کرنا +
 سیوم مرکبات نبات کا کہلانا +
 اول خون نکالنا اسکا ذکر اگر جہنم فرابا دین صیان میں بخوبی کر چکے ہیں

دیہات میں رہنا چاہئے اور سرمایہ میں سرمایہ سے بچنا چاہئے غذا اُسکی
سادہ ہونی چاہئے اور جو اوسمیں کسی طرح کا تغیر کرنا منظور ہو تو نہایت
احتیاط سے کرنا چاہئے اور ایک مدت دراز تک اوسکو صرف دودھ ہی پر
پرورش کرنا چاہئے اور جب تک اوسکی چار دائرہ میں اور اوپر اونچے
کی سامنے کے دانت نہ نکل آویں۔ تب تک اوسکی دودھ بڑھائی نہ کرنی چاہئے
اور چون چون بچہ کی عمر نہ یادہ ہوتی جاوے اوسکو محنت دماغی یا جسمی
سہی بالکل احتراز کرنا چاہئے پس اسلئے گو کہلی ہو امین ہو اخوری اُس
بچہ کے لئے نہایت مفید پڑتی ہے تاہم کشتی یا کسی اور قسم کی یاضت
جسمی اوسکو بہرگز نہ کرنی چاہئے۔

اور ایام دانت نکالنے میں اوس بچہ کی حفاظت کرنی چاہئے اور ہاتھی
بھی نہایت احتیاط رکھیں کہ اوس ایام میں اوسکو مرض ہو چک
کاف۔ یا میزکس یا جھک کی جھوت نہ لگ جاوے۔ علاوہ ان باتوں
بچہ کو شکم کا خیال رکھنا چاہئے اور باخانہ کو بہرگز قبض ہونی نہ دینا
چاہئے اور شکم کی ادنی شحایت کو ایک بیماری مرض شمار کرنا چاہئے
اور فوراً کسٹائل یا سٹائا روہب کہلا کر قبض اور شکم کی تسکین
کو رفع کرنا چاہئے اور جب کبھی سرگرم اور بچہ بی چین معلوم ہو تو فوراً
اوسکو ایک یا دو گرمین کیا تول کہلا کر تھوڑی تھوڑی مقدار میں
جب تک کہل کر دست نہ آویں سلفٹ اف مگنی شیا۔ اس طور پر کہلا کر
کہ سلفٹ۔ اف۔ مگنی شیا ۴ ڈرام سرپا اف آرچ۔ ۲ ڈرام
کر۔ ری۔ وی۔ ڈاٹر۔ ۶ ڈرام

سبکو ملا لین اور بتین سال کے بچہ کو مقدار دودھ ۴ ڈرام جب تک

ہونا یا سارے بوجھت اکساٹی ٹنگ - کاز - مین یہ بیماری مین طور سے شروع ہو سکتی مین +

اول سر کی علامتین بتدیج پیدا ہوتی ہیں +
دوم بلا ظاہر ہونے علامات پیشیر کے شدت سے دروسر بخار اور کنو لشن ہو کر یہ مرض دفعتاً شروع ہو پڑتا ہے +

سوم - یہ مرض پوشیدہ طور پر اسطرح شروع ہوتا ہے کہ بعد رفع ہو جانے چھپک یا کسی اور مرض جلدی کے اس مرض کی خفیف علامتین پیدا ہو جاتی ہیں +

نیاج انجام اس مرض کا اکثر خراب ہو لیکن جب یہ بیماری کسی تندرست بچہ کو شدت سے ہو جاتی ہے تب اسکا انجام کسی قدر نیک نکل سکتا ہے پر جب یہ مرض بتدیج یا پوشیدہ طور پر کمزور اسکرافو لشن مزاج کے بچوں کو ہوتا ہے تب اسکا انجام ہمیشہ بد ہوتا ہے +

علاج - اس مرض کے علاج مین اسبات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بقوم شروع ہونی علامات پیشیر کے اگر اسکا علاج کیا جاوے تو یہ بیماری رک سکتی ہے لیکن جب یہ بخوبی ظاہر ہو گئی تب علاج سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا - اسکے روکنی کا علاج بعینہ اوسی طور پر ہی حسب طور پر سئل کے روکنی کی تدبیرین کرتے ہیں کیونکہ اس مرض مین بھی مثل سئل کی مختلف اعضائی مین مادہ ٹیو برکل پیدا ہو جاتا ہے - پس جس خاندان مین کئی بچے اسی مرض مین مر گئی ہوں یا اونکی طبیعت اس مرض کی طرف مائل ہو تو والدہ کو چاہئے کہ آئندہ اپنی بچوں کو دودھ نہ پلاوی بلکہ کسی تندرست دایمی کے دودھ سے اونکی پرورش کریں اوس بچہ کو

اسرا۔ ال ہے اور نبض کے صربان کی طاقت یا توازن اگر کم و بیش ہو تو
اسی اس مرض کے پیدا ہونی میں کچھ شک نہ کرنا چاہئے۔

اس مرض کو ابتدا میں سچون کے ریمی ٹنٹ - فیور سی فری کرنا شکل
پڑتا ہی خانچہ اس بیماری کے شروع ہونے سے ہو ا کرتی ہے۔ لیکن
ریمی ٹنٹ فیور میں اکثر تے نہیں ہوتی اور جو ہو بھی تو عذر موقوف
ہو جاتی ہے اور بعد اسکے اُبکا ئیاں نہیں آتی ہیں جیسے مائڈر و -
کفلس میں تے موقوف ہونی کے بعد آیا کرتی ہیں۔ ریمی ٹنٹ فیور میں
ابتدا ہی سے تپے دست آتی ہیں لیکن مائڈر و کفلس میں ہا خانہ تھوڑا
اور نیلے رنگ کا آتا ہے۔ ریمی ٹنٹ فیور میں شکم کے اندر ہمیشہ درد
رہا کرتا ہے۔ مرض مائڈر و کفلس میں اکل و شرب کی طرف سےی سبب
کو نہایت نفرت ہوتی ہے۔ لیکن ریمی ٹنٹ - فیور میں تشنگی نہایت
شدت سے ہوتی ہے۔ ریمی ٹنٹ - فیور میں جسم بہت گرم رہتا ہے۔
لیکن اس مرض میں کم - ریمی ٹنٹ - فیور - کی علامتوں میں وقفہ
پایا جاتا ہے۔ لیکن اس مرض کے اندر اگرچہ علامتوں میں اختلافات
ہائے جاتی ہیں تاہم کسی خاص وقت پر انکو تحقیق نہیں ہوتی۔
ریمی ٹنٹ فیور پانچویں سال سے بیشتر بہت کم ہوتا ہے اور تین سال
کم عمر کے سچون میں بہت ہی کم پایا جاتا ہے لیکن یہ مرض اکثر پانچویں
سال سے بیشتر ہی پیدا ہوتا ہے +

اسباب سچہ بن اور اسکرافیو کس مزاج اس مرض کو پہنچا دے
پوزنگ - کاڑہ نہیں اور خشک ہو جانا کسی مدت کی جلد کی بیماری کا
تکلیف سہ دانت نکالنا سر پر صدمہ پہنچا دینا خوف کہا جانا یا زیادہ غصہ

ایسے اختلاعات سے اس مرض کی تشخیص میں غلطی نہیں ہوتی ہے +
 علامات ہینا مبر مرض - قبل از ظاہر ہونی اس مرض کی مہینوں یا مہینوں
 سے بچہ کی طاقت کھستی جاتی ہے اور وہ لاغر ہو جاتا ہے اور اسکو
 کما ہر گاہے بخار بھی آ جاتا ہے کسی قدر کھانسی ہوتی ہے جو کہ مہینوں
 ہی یا خانہ اکثر قبض رہتا ہے اور گاہے گاہے ادھر ادھر مہینوں یا مہینوں
 درد بتلانا ہے اور کبھی دیر سے کی شکایت کرتا ہے - آخر کار بچہ کی حالت
 روز بروز مدھی بدتر ہوتی جاتی ہے اور اسکو بخار زیادہ ہوتا ہے
 اور بچہ سست ہو جاتا ہے - لیکن اب سر کی شکایت نہیں کرتا ہے
 مگر دفعتاً کسی رات کو بی چین ہو جاتا ہے اور کھن - دلشن - ہونی لگتا ہے
 اور تب یہ مرض خود ظاہر ہو جاتا ہے +

صورت حال تشریحی بعد وفات - بعد وفات کے دماغ کو کھولنے سے اسکی
 پردہ سفید یا مکدر نظر آتے ہیں اور زرد رنگ کا لطف اور دماغ کی پردہ
 اور دیگر اعضا اندرونی عین ٹیو بہر گل کے چھوٹی چھوٹے دانی باجی
 جانی ہیں اور بطون دماغ میں آب خون پایا جاتا ہے +

تشخیص - کوئی بچہ خاص کر اگر وہ مسلول والدین کے نطفہ سے ہو بلا
 کسی ظاہر اسباب کی مہینوں یا مہینوں سے بیمار ہو اور جب کبھی وہ
 خواب ناک یا سست معلوم ہو اور اسکو کھانسی کی شدت ہو تو اس
 صورت میں - اکیوٹ - مائیکرو کفیس کا گمان کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو
 نہوڑی اور ستوا تر خشک کھانسی اس مرض کی ابتدا میں اکثر ہوا کرتی
 ہے اور اگر اسبات میں شک ہو تو بچہ کو کبھی کبھی تے ہوتی ہے
 یا نہیں اسبات کو دریافت کریں اور یہ معلوم کریں کہ با خانہ کا

لیکن اکثر بعد رفع ہو جانے نوبت کی وہی جانب زیادہ تر مفلوج ہو جاتی ہے۔ جب یہہ بیشتر درجہ بخوبی پیدا ہو جاتا ہے۔ تب سچے ایک باؤن ہیلاکر اور دوسرا شکم پر سکیر کر بیہوش جت بڑا رہتا ہے۔ مانتہ سچے کو تر ہوتا لگتی ہیں اور انسب وہ اپنی لب اور ناک کو نوچتا رہتا ہے حتی کہ خون نکل پڑتا ہے یا ایک مانتہ شرم گاہ پر رہتا ہے اور دوسرے کو سچے اپنی چہرہ اور سر پر بہتا رہتا ہے کبھی تو سر سرد اور کبھی گرم اور کبھی چہرہ سرخ اور کبھی پتھکا رہتا ہے بعض جلد پر نہایت کمزور چلتی ہی آخر کار صرف قلب پر مانتہ رکھو سی نبض کی حرکت محسوس ہوتی ہے اب تہلیان بی حس اور ہیل جانی ہیں اور اونکو روشنی بری معلوم ہوتی۔ اور حالت بیہوشی میں سچے کا منہ خود بخود حرکت کرتا رہتا ہے گویا مکوئی چیز چبا رہا یا نکل رہا ہے۔ بعض دفعہ ایک ہی مرتبہ کنولشن ہو کر سچے راہی عدم کا ہو جاتا ہے یا چند روز تک زندہ بھی رہ سکتا اور تب علامات ردیہ ظاہر ہو کر سچے کو ہلاک کر ڈالتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اکیوٹ۔ ٹ۔ مائیڈرو۔ کفلس جس طور سے بیان کیا گیا ہے ہمیشہ اسی طور سے نہیں ظاہر ہوتا ہے ہر مریض میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پایا جاتا ہے مثلاً کسی کو بہ نسبت دوسرے کی کم۔ ولشن ابتدا ہی میں ہو جاتا ہے اور کسی کو ساری جسم میں اور کسی کو صرف ایک ہی طرف ہوتا ہے اور کسی کو بعد کنولشن کی فالج ہونا ہے اور کسی کے مانتہ باؤن کچھ صرف اینٹھو ہی رہتی ہیں علاوہ بریں کبھی تو بیہوشی رفتہ رفتہ طاری ہوتی ہے اور کبھی دفعتاً ہو جاتی ہے اور کوئی بجائے ایک عرصہ تک بیہوش رہتا ہے اور کوئی جلد مرجا تا۔ لیکن علامتوں کو

بچہ بالکل منہموم اور متفکر رہتا ہے طاقت بیٹنی کی نہیں رہتی اور ہمیشہ
 سونا جا رہتا ہے انگلیں اکثر بند اور ہینا لنی پر شکن چڑھا رہتا ہے کہونکہ
 اوسکو روشنی کی برداشت نہیں ہوتی۔ جسم خشک چہرہ سرخ اور
 سر اکثر گرم رہتا ہے۔ بچہ کو حرکت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور
 جب تک بلایا نہ جاوے خواب ناک پڑا رہتا ہے۔ گفتگو باہوش
 لیکن بہت کم کرتا ہے۔ مزاج چڑچڑا اور ہمیشہ آہ سرد بہتا رہتا ہے
 یا زور زور سے چیخیں مار کر درد سر کی شکایت کرتا ہے۔ جب رات
 آتی ہے تب علامتوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور بچہ کبھی تو زور
 زور سے روتا ہے اور کبھی غریبان میں مبتلا رہتا ہے۔ نبض کمزور اور
 آہستہ چلتی ہے۔ اس درجہ کے ابتدا ہی میں فی اکثر موقوف ہو جاتا
 ہے لیکن اسکے موقوف ہونے سے کچھ بچہ کے کہانی بیٹی کی اشتہا بیٹی
 نہیں ہے۔ باخانہ بہ نسبت درجہ اول کے زیادہ قبض ہو جاتا ہے اور
 اجابت بھی اسی طور پر غیر معمولی آتی ہے اور انٹروین سے ریح
 بالکل دور ہو جاتی ہے اور شکم دب جاتا ہے۔ جب درجہ سوم اس میں
 آتا ہے تب بچہ کو اس قدر غفلت طاری ہوتی ہے کہ اس حالت میں
 اوسکو اوٹھنا یا دشوار ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ کنولشن ہو کر
 بچہ بالکل بیہوش ہو جاتا ہے۔ اور کن۔ وشن کے وقت جسم کی
 ایک جانب پر بہ نسبت دوسرے کر بہت زیادہ تشنج ہوتا ہے اور بعد
 رفع ہو جانی نسبت کی ایک جانب یا تو کسی قدر یا بالکل موقوف ہوتی ہے
 اور دوسری جانب خود بخود حرکت کرتی رہتی ہے یا درکنہا جائے
 کہ کن۔ وشن۔ کو وقت جس جانب میں تشنج زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ نہیں

کم ہوتی ہے اور بعض دفعہ اکل و شرب دونوں سے نفرت ہوتی ہے۔
 بعض دفعہ صرف کھانے کے بعد ہی سچہ قی کر دیتا ہے اور کبھی خلوص معدہ میں
 پہنچے ہو جاتی ہے کہ جس سے ایک سبز رنگ کی رطوبت نکلتی ہے
 پر سچہ کو اس قے سے کچھ بھی افادہ نہیں ہوتا۔ سچہ کو دغین دویا
 نین دفعہ کے زیادہ قی نہیں ہوتی ہے لیکن کئی روز تک متواتر ہونے
 رہتی ہے اور اسکا سر گراں درد و سر زیادہ ہوتا جاتا ہے اور شکم اسحالین بگڑا رہتا ہے کیونکہ
 مریض کو ابتدائی ہی قبض رہتا ہے اور پانچ روز تک مختلف رنگ اور بدبودار آتاجمین صفر جیسا
 کم ہوتا ہے۔ زبان خشک نہیں ہوتی اور کنا رے اور نوک رے کی
 اکثر سرخ ہوتی ہے اور اسکا درمیانہ حصہ سفید ہوتا ہے جسم خشک لیکن
 بہت گرم نہیں ہوتا۔ تنہی خشک انگلیں گدڑا قبض تیز اور بقتلہ
 سچہ خواب آلودہ رہتا ہے اور بعض دفعہ دغین دویا نین وقفہ
 سونا جاتا ہے لیکن بے چین رہتا ہے اور اچھی طور پر سونہیں سکتا
 دانت بیتا ہے سو فی وقت انگلیں نیم وار ہتی ہیں اور ذرہ سہاؤ
 میں یا بلا کسی سبب سچہ خوف کہا کر چونک پڑتا ہے اور رات کیوت
 اوسکو تکی کی روشنی کی برداشت نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز قیاس
 نہ کرنا چاہیے کہ یہ ساری علامتیں ایک ہی سچہ میں بائی جاتی ہیں اور اگر
 موجود ہی ہوں تو برابر اکیسا نہیں رہتی ہیں اور سچہ کی حالت
 ہر لحظہ بدلتی رہتی ہے کیونکہ کبھی تو وہ خوش اور کبھی معنوم رہتا ہے
 یہ درجہ اکثر چار یا پانچ روز تک رہتا ہے اگر اس وقت مرض کمی
 تشخیص نہ ہو سکے یا علاج سے کچھ فائدہ نہ ہو تو دوسرے درجہ کی علامتیں
 پیدا ہونے لگتی ہیں کہ جس وقت یہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے اس درجہ

اسکرافینولس مزاج کو بچون کو ہو جاتا ہے۔ ہلکو۔ ان۔ کف۔ لاسی
نس۔ بولتی ہیں۔ اور دوسرے کو اکیوٹ۔ مائیڈروکفلس۔ کہتی ہیں
لیکن ہلکم قسم کا انفلا مین بچونکو بہت ہی کم ہوتا ہے +

علامات۔ اس مرض کے تین درجہ میں منقسم ہیں +

اول درجہ میں بہتری علامات و ماخ کی کنجشن کی باہمی جاتی ہیں
اور بخار رہتا ہے جسکی آمد و رفت کا کچھ ٹھکانا نہیں بچہ بخوم
رہتا ہے اور اسکا مزاج جڑ جڑا ہو جاتا ہے حرکت کرتے میں سخت
معلوم ہوتا ہے اور روزمرہ کا کھیل کو داسکو نہیں بہا نا۔ اور بعض
طبیعت میں اس کے اس قدر اختلاف پڑ جاتا ہے کہ کھلتی کھلتے دفعتاً
رک جاتا ہے اور دڑکرا اپنے سر کو اپنی والدہ کے آغوش میں
چھپاتا ہے اور اپنی ماتھے سے سر کو پکڑ کر دوسری شکایت کرتا ہے
یا صرف یہی کہتا ہے کہ میں اب تھک گیا ہوں اور سونا چاہتا ہوں
اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سر اسکا گھوم جاتا ہے تب وہ ہچک
کھڑا ہو کر ادھر ادھر گھومتا ہے اور جب یہ علامت رفع ہو جاتی ہے
تب یا تو وہ روتا ہے یا ہوش میں اگر پھر کھیل میں مشغول ہو جاتا
اور بچہ اگر ننھا ہو تو اپنی دائی کے آغوش میں خوف کہا کر اسکو
پکڑ جاتا ہے جو بچہ چل پھر سکتے ہیں تو وہ چلتی وقت اپنی ایک پاؤں کو
کھینچ لیتی ہیں اور رک رک کر چلتے ہیں۔ اشتہا اکثر خراب رہتی ہے
اور بعض دفعہ ایسی مبلوں کہ کھلتے کھلتے دفعتاً بچہ غذا مانگ پھرتا ہے
اور کبھی جب غذا دی جاتی ہے تب انکار کرتا ہے اور بعض اوقات کما
وقت اسکو انکا بیان آتی ہیں اور قی کرنے چاہتا ہے۔ تشنگی اکثر

اور گرم بانی اوٹک یا آب گرم میں رائی گھول کر اسکی مقبول۔
 کراوین۔ اگر ساتھ اس بیماری کے بچہ کو دست لگ جاوین اور
 ماضیہ اوسکا بگڑ جاوے تو غذا اوسکو اچھی دیوین اور اس نسخہ کا
 استعمال کریں جو تین مہینہ کے بچہ کی لئے مفید ہے۔

نسخہ

اکٹھ اگٹ۔ اف۔ سنکونا۔ ۳۔ گرین
 کبیاوڈ ٹینکچر۔ اف۔ سنکونا۔ ۱۔ بوند
 عرق سونف۔ ۱۔ ڈرام
 سبکو ملا کر ایک خوراک کریں اور ایسی تین خوراک ہمراہ دودھ کے
 دن میں تین دفعہ بلاوین۔ اور جون جون بچہ کو افاقہ ہوتا جاوے
 اوسکو تبدیل آب و ہوا کراوین اور اس نسخہ کو استعمال فرمیں کہیں
 جو تین مہینہ کے بچہ کی لئے موزون ہے۔

نسخہ

سٹریٹ۔ اف ایرن۔ ایڈ۔ کوناٹین۔ ۱۔ گرین
 سرب۔ ۳۔ بوند
 ڈسٹیلڈ واٹر۔ ۳۔ بوند
 سب کو ملا کر ایک خوراک کریں اور ایسی تین خوراک دین میں متبہ بلاوین

۲۔ اگیوٹ۔ مائڈر و کفلس

واضح ہو کہ بچوں کے دماغ میں دو قسم کا انفلاشن ہوا کرتا ہے
 ایک تو وہ جو بعض دفعہ تندرست بچوں کو ہوتا ہے اور دوسرا جو اکثر

کر ہی تو اس حالت کا علاج نرمی سے کرنا چاہئے چنانچہ اس صورت میں مہینہ
فصد کے جو تکین لگا دین اور غذا ہلکی دیوین صبح و شام تغیل آب گرم
کر دین اور تیز جلاب کا استعمال نہ کر کر مینات مثلاً کیا تو مل ہمراہ رو بہ
کے دن میں ایک یا دو دفعہ دیوین۔ چوتھائی گرین کیا تو مل اور دو
رو بہ تین مہینہ کے سچے کر لی کافی ہے اور اگر بخار موجود ہو اور سچ
دن کر وقت بہر ارہو اور اسکو شدت سوتے نہ آتی ہو تو اس نسخہ
کا استعمال کرین جو تین مہینہ کے سچے کر لئے موزون ہے +

نسخہ

بائی - کار - پونٹ - اف - پوٹاس _____ ۳ - گرین
سائیک - اسٹ _____ ۱ - گرین
وائیم - ابی - کے - کوانا _____ ۳ - پونڈ
ٹینکچراف - ٹا بو - سٹی - مس _____ ۳ - پونڈ
سرب _____ ۳ - پونڈ
ڈیسٹلڈ واٹر _____ ۳ - پونڈ

سبکو ملا کر ایک خوراک کرین اور ایسی ایک خوراک چہ چہ گنٹہ بعد
یا دین +

علاج - بی - سیو - کن - جنجن - کا اسحالت میں فصد کی ضرورت
نہیں ہوتی اور اگر جو تکین لگا دین تو صرف اسی مطلب سے لگانا
چاہئے کہ جسے دماغ کی رگوں کا تنقیہ ہو جاوے اور اس خیال سے
نہیں کہ خون نکال کر سچے کو آرام کرین۔ لیکن سب سے زیادہ تر خیال
اس بات کا رکھنا چاہئے کہ سچے کو غذا اچھی ملے اور پاخانہ اچھی طور پر آوی

پیدا ہو گیا ہو تو فوراً تے کرانی جا سہی کہ جو علاج اور حالتوں میں مضمکیا بلکہ
 مہلک ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس اگر یہ بیماری دماغ میں صد نہ پہنچنے کے باعث
 یاد انت نکلنے کے سبب سے پیدا ہو تو ایسا ہی علاج کریں۔ اگر دیکھیں کہ
 خون کے نکلنے سے بھی بچہ کو آفاقہ نہیں ہوا تو اس کو ایسے مکان میں
 رکھیں کہ جو سرد اور شور و غل سے محفوظ ہو اور سر پر اوسکی سردی
 لگا دیں (دیکھو فراہادین صیان) اور چونکہ ابتدا ہی سے اس مرض
 میں قبض رہا کرتا ہے تو ایک کڑا جلاب ضرور دیوین اگر ان ترکیبوں سے
 بچہ کو آفاقہ ہو جاوے تاہم چند روز تک اسکا علاج جاری رکھنا چاہیے
 چنانچہ لیٹات سے دست خلاصہ رکھیں مثلاً تھوڑے تھوڑے مقدار میں
 دن کے اندر دو یا تین مرتبہ کیا لول کا استعمال کریں یا اس نسخہ
 کو ساتھ کیا لول کہلا دیں +

نسخہ

نائٹر _____ ۵۔ گرین
 سلفٹ اف۔ گنی۔ شیا _____ ۳۔ گرین
 سرب۔ اف۔ لین _____ ۴۔ ڈرام
 ڈیسلڈ واٹر _____ ۹۔ ڈرام

سبکو ملا کر مقدار ایک ڈرام کے دشمن تین مرتبہ پلا دیں۔ یہ نسخہ
 مہینہ کے بچہ کے واسطے موزوں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ تیز علاج
 ہر حالت میں جائز نہیں ہے مثلاً جب یہ بیماری تدریج پیدا ہوتی
 خفیف بخار اور گاہے گاہے فی اور قبض کے اور بچہ کی بیوی مر جاوے
 نیند بخوبی نہ آوی اور بچہ درد سر یا دھت و پابیر کہو منہ کی نکاسیت

دوم علامات - پی - سیو - کجشجن - جن بچو نکو ایک مدت سے شدید
 ہونگ کان - رہتا ہے اکثر اونکر چہرہ اور لبون میں تہج یعنی ورم
 پایا جاتا ہے اور رنگت اونکی اودی ہوتی ہے اور چہرہ فکر مند نظر آتا ہے
 اور بچہ اپنے سر کی نہایت شکایت کرتا ہے لیکن جسم اوسکا مریوب اور
 سرد رہتا ہے اور نبض اگرچہ بلکہ چلتی ہے پر ملائم ہوتی ہے - ان علامتوں
 پہی ثابت ہوتا ہے کہ دماغ کی رگیں خون سے پر ہیں ۔

اسباب - جس کسی سبب سے بچہ کو سر میں زیادہ خون پہنچتا ہے وہی
 باعث - اک - ٹیو - کجشجن - کا ہوتا ہے مثلاً چھک کے نکلنے وقت یا
 دانت کے نکلنے وقت یا طیش آفتاب یا سر پر صدمہ پہنچا بواعث - اک - ٹیو
 کجشجن کے ہیں اور جس کسی سبب سے دماغ کا خون بہت رک رک کر
 لوٹتا ہے وہ باعث - پی - سیو - کجشجن کا ہوتا ہے مثلاً ہونگ کان
 میں اس قسم کا کجشجن اکثر ہوا کرتا ہے یا جب گھسیکھ کی مرض میں گلو
 کی رگوں کے دب جائیں یا جب کوئی برانگیل گلائڈ مادہ یو بیکل
 کی پیدا ہونے سے بڑا ہو جاتا ہے اور گلی کے جو - گیو - لہ - وین کو دباتا
 ہے تب ہی بہہ مرض پیدا ہوتا ہے اور سب خراب ہوا یا خراب غذا کو
 دوران خون سے تڑپتا ہے تب ہی اس قسم کا کجشجن ہو جاتا ہے +
 علاج - اک - ٹیو - کجشجن - اس مرض کے علاج کو لئے کوئی خاص
 مقرر کرنا مشکل ہے کیونکہ بواعث اسکے مختلف ہیں پس سب کو
 دریافت کر کے اس بیماری کا علاج کرنا چاہئے مثلاً اگر چھک میں بہہ
 مرض ہو جاوے تو اون قواعد کو پابند رہ کر جو قرا بادین ثبیان میں
 بتلائے گئے ہیں مضد یا جو نکین لگانی جائیں اگر بہہ مرض داخل کر یا

اوسکو تکلیف ہوتی ہے اور جن بچوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ خود ہی
 سرور کی شکایت کرتے ہیں۔ اکثر اس مرض میں تے ہی متواتر ہوتے
 ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ علامت قی کی اکثر دماغ کی بیماری میں ظاہر
 ہوتی ہے لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبل از ظاہر ہونے کسی مرض
 دماغ کے بچہ پیشتر ہی سے قی کرنے لگتا ہے۔ اس مرض میں جو بچا
 ہوتا ہے اوسکی شدت اور آمدورفت کی اوقات میں اختلاف پایا
 جاتا ہے لیکن نبض اکثر جلد چلتی ہے اور اگر سچہ کی سر کی ہڈیاں سخت
 نہ ہو گئی ہوں تو سامنے کا یا فوخ تنہا ہوا اور اونچا اور اوسکے اندر
 دماغ کی تڑپ نظر آتی ہے۔ نیند سچہ کی ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اکثر
 چونک چونک پڑتا ہے اور بعض دفعہ اوسکے چہرہ کے عضلون اور
 بچوں کی ٹینڈنوں میں اختلاج ہے ہو اگر تاہی اس حالت میں سچہ کئی
 روز تک رہ کر بلا علاج کر تندرست ہو جاسکتا ہے لیکن اونی سبب سے
 یہ بیماری پھر لوٹ سکتی ہے چنانچہ دانت نکلنے میں یہ بات ہے
 ہی کہ جب کوئی دانت نکل پڑتا ہے تب فوراً ایہ علامات رفع ہو جاتی
 ہیں اور سچہ تندرست نظر آتا ہے لیکن جب دوسرا دانت نکلے لگتا ہی
 تب پھر وہی علامات عود کرتی ہیں اور اگرچہ بعض دفعہ یہ علامتیں
 جنکا ذکر اوپر کیا گیا ہے خود بخود رفع ہو جاتی ہیں تاہم اس بات پر
 اعتما و نکرنا چاہیے کیونکہ ان علامتوں کے ظاہر ہونے سے بعض دفعہ
 یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرض۔ اکیوٹ۔ مائیڈروکفلکس ظاہر ہونے
 والا ہے اور گو یہ بات نہ بھی ثابت ہوتا ہم دماغ میں اجتماع خون کا
 ہونا ایک خوفناک بلکہ بعض دفعہ مہلک مرض ہوتا ہے۔

لہذا کیا لوہل ایک یا دو گرین رات کو کھلا دوی اور صبح کو سناکتھر یا
کشتہ لیل پلا دوی اور پہ پہی لازم ہے کہ پادنگر ایک ہڈلی یا بازو یا کان
کے پچھی ایک جھوٹا سا لمبٹر لگا یا جاوے اور کئی مہینہ تک اسکی
زخم کو کشتہ رادس آئیٹ منٹ یا ساون آئیٹ منٹ سے ڈریں کر کے
اوسکا مواد جاری رکھا جاوے اگر لمبٹر کا لگانا منظور نہ ہو تو مقامات
مذکورہ بالا پر ٹارٹار امیک آئیٹ منٹ کی مالش کرے
اور جن سچوں کو کنولشن کا خوف ہوا وکی غذا کی بڑی احتیاط جائے
مخفی نہ رہے کہ جب کنولشن ہو نیوالا ہوتا ہے تو سچ کے ساتھ کا انگوٹھا
ہتیلی کی طرف گھوم جاتا ہے یہ علامت ایسی معتبر ہے کہ
اوسکے ظاہر ہونے سے بھی گمان ہوتا ہے کہ اب کنولشن شروع ہونے
والا ہے اور بچہ دغا ہر مونی اس علامت کی سچہ کو دانت اور غذا اور
بچانہ کا خیال رکھنا چاہئے +

۱۔ کن۔ جشچن۔ آفندی برین

یعنی دماغ میں خون کا جمع ہونا یہ دو طور کا ہوتا ہے ایک تو اک
ٹو۔ یعنی شدید۔ دوسرا۔ پی۔ سیو۔ یعنی خفیف۔
اک۔ ٹو۔ کن۔ جشچن +

علامات۔ یا نوہم مرض دفعتاً پیدا ہو کر اسقدر خوفناک ہو جاسکتا
ہے کہ جبکہ علاج فوراً کرنا چاہئے یا یہ بیماری اسطور سے شروع ہوتی
ہے کہ سچہ بی چین اور چند روز تک اوسکو قبض رہتا ہے اور تب
سراوسکا بند رچ گرم ہوتا جاتا ہے اور طبیعت سچہ کی بے چین اور
مزاج بگڑ جاتا ہے اور روشنی اور شور و غل سے یا دفعتاً حرکت کر نیسے

مرض - اپو پلکسی یا دماغ میں بہت اجتماع خون کی باعث پیدا ہوتا ہے
حبس بعض دفعہ مرض ہو ننگ - کاف - یا تشنجی کروپ کے اندر ہوا
کرتا ہے +

علاج - بجز شروع ہونی علامات کنولشن کو سچہ کو گرم باقی مٹین دوی
اور اوکے سر پر سرد پانی ڈالے اور فوراً دوا مٹین گرین کیا لوگ
کہلا کر بعد ایک گھنٹی کے کسٹریل یا سناکسچر یا اسکا مونی کا جلاب دیوی
مگر اس مرض میں کسٹریل اور روغن تارپین کا جلاب بہت مفید ہے
سچہ کو گرم پانی سے اٹھا کر ایک لمبا سا سٹرڈ بلا سٹر او سکی رٹیک کی ٹہری
پر گردن سے لیکر سیکم ہڈی تک لگا دیوی اور ایک سٹرڈ بلا سٹر
باؤن کے ٹوئپر بھی لگا دے - بر تقدیر اگر پھر بھی کنولشن ہو جاوی
تو کُن ٹی پر جو ٹکین لگا دی مگر جو کون کا لگانا صرف اوسی حالت میں
جائز ہے کہ جب سچہ کے جسم میں زیادتی خون کی باقی جاوی اگر بعد
کہلا کر آئی دستونکری بھی کنولشن کی علامات موجود رہیں تو لاڈ نم اور
پانی ملا کر بچکاری کرنے سے علامات مذکورہ کو بہت آفاقہ ہوتا ہے -
لاڈ نم کی بچکاری کو بعد جا رہا گھنٹی کے دی سکتے ہیں سر کو آب سردی
تر رکھو - اگر اس بات کا ذرا بھی گمان ہو کہ دانت نکلنے والے ہیں - تو
مسوڑ و نکو بائخ دینا جائز ہے تاہم اگر کنولشن کے علامتیں جاری رہیں
تو بعد دو دو گھنٹے کے کیا تو مل کا استعمال کری اور بذریعہ مسہلات کو
مٹین رکھو اور بعض سٹرڈ بلا سٹر کے رٹیک کی ٹہری پر ایک بلٹرڈ پینچ
چوڑا اور چہرے سے آٹھ انچ تک لمبا لگا دی اور بعد رفع ہو جانے علامات
کو اس کے بعد اسات ضروری کہ کئی روز تک بیمار کا دست مٹین رہی

ہین کہ سفیدی نظر آتی ہے اور تہلیان دفعتاً پھیل جاتی ہیں اور چہرہ بہت خوف ناک اور فکر مند ہو جاتا ہے اور بچہ یا تو چیخ مارتا ہے یا بعض دفعہ رونو لگتا ہے غرض کہ بڑا خیر کی علامتیں ایسی ہیں کہ انکو ظاہر ہو بیسی۔ کن۔ وشن کے ہو جائیگا نہایت خوف ہوتا ہے +

علامات خاص کنوشن۔ کی نوبت کی۔ چہرہ کے عضلے پھڑکتے ہیں ہلے تھارا جسم سخت اور بے حرکت رہتا ہے اور بعد تھوڑے ہی عرصہ کے پھڑکنے لگتا ہے سر اور گردن پیچھے کو کھینچ جاتی ہے اور بچہ ماتھے پاؤں مارنے لگتا ہے کبھی تو یہ حرکت صرف بعض عضلوں ہی میں ہوتی ہیں اور کبھی جسم کی صرف ایک ہی جانب پر محدود رہتی ہیں اور بچہ بالکل بیہوش ہو جاتا ہے۔ انکو نین ملنگی بندہ جاتی ہے اور بصارت جاتی رہتی ہے تہلیان بے حرکت اور یا تو سگری رہتی ہیں یا پھیل جاتی ہیں + کانوں کی شنوای جاتی رہتی ہے نبض کمزور اور اسقدر جلد جلتی ہے کہ بعض دفعہ اسکا شمار کرنا دشوار ہوتا ہے۔ تنفس جلد جلد تھاہ اور ساتھ تکلیف کو لیا جاتا ہے اور جسم بچہ کا عریق قہو جاتا ہے جب یہ علامتیں ایک یا ۱۰ منٹ یا ایک یا زیادہ گھنٹہ تک رہتی ہیں تب کنوشن موقوف ہو جاتا ہے اوس وقت بچہ یا تو سو جاتا یا تھوڑے عرصہ تک بیچک سا رہ جاتا ہے یا رونو لگتا ہے اور یا تو ہوش میں آ جاتا ہے یا بے ہوش ہو کر بالکل بے حرکت رہتا ہے یا چند عضلوں میں اختلاج ہونے لگتا ہے یا یہ بات ہوتی ہے کہ کن وشن کی نوبت بچہ کو اندر طفل مسافر راہ عدم کا ہو جاتا ہے لیکن یہ بات خاصہ کراؤ ہوتی ہے کہ جب سبب اگلی بیماری کی بچہ کمزور ہو گیا ہو یا جب کنوشن

جھک نکلتی ہے اور یہ بھی بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ دماغ میں جیسے زیادہ خون کی باعث کنوٹشن ہو جاتا ہے اسی طور پر یہ علامت کسی خون کی سبب بھی پیدا ہو سکتے ہیں +

علامات پیشرو۔ قبل از شروع ہونی خاص نوبت کے پہلے علامتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بچہ اس ڈھپ سے بڑا رہتا ہے کہ گویا سوتا ہے اور نیم والنگھون سے پلکین جھپکتا ہے اور اسکے چہرہ کے عضلے آہستہ آہستہ پھرتے ہیں اور لبیں اسطور سے ہلتی ہیں کہ گویا بچہ مسکرا رہا ہے جب یہ حالتیں طول پکڑ جاتی ہیں تب بچہ سانسین تکلیف سے لیتا ہے۔ اور بعض اوقات چند لمحہ کی لٹری دم رک بھی جاتا ہے اور تب دہن کے چاروں طرف ایک اودھی جگر پیدا ہو جاتی ہے ذرہ سی آواز سے بچہ جاگ پڑتا ہے اور کرمانی لگتا ہے اور نیند میں دودھ ڈالتا ہے اور اکثر شکم سے بہت سی ریح نکل جاتی ہے۔ اگر یہ علامتیں سبب ابتلا یا بد مضمی کے پیدا ہوں تو بجز درفع ہونے خرابی شکم کی وی مفقود ہو جاتی ہیں اور جب تک زیادہ تر شدید پیشرو علامتیں ظاہر ہوں خاص مرض۔ کنوٹشن کی بھی ظاہر ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا لیکن اس مرض کے پیدا ہونیکا زیادہ تر اندیشہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب یا تو عادتاً یا سوتی وقت بچہ کے ماتھے کے انگھوٹھی طرف ہتھیلی کے ٹرائی میں اور سوتی وقت بچہ کی انگھین نیم والی ہوتی ہیں اور احتلاج صرف چہرہ کی عضلون ہی میں نہیں ہوتا بلکہ دست و پا بھی پھرتے لگتی ہیں اور جب بچہ دفعتاً چونک پڑتا ہے تو اس وقت اسکا چہرہ سرخ یا اودا بڑ جاتا ہے اور اسکی انگھین اسطور سے کھلی رہتی

دماغ کے فعلوں کو بگاڑ دیا ہے اور بعض اوقات جب بچوں کو تشنج ہوتا ہے تو وہ تشنج نتیجہ کسی خاص مرض دماغ کا نہیں ہوتا بلکہ صرف اسی باعث ہوتا ہے کہ بچہ کے دماغ کی رگین بہت جوانوں کے خوشی جلد پڑ ہو جاتی ہیں اور اسلئے بچہ کو دماغ میں کنجشن یعنی اجتماع خون کا ہو کر کنجشن - وشن - ہو جاتا ہے مثلاً اس قسم کا کنولشن مرض کروپ میں ہو جا کر رہتا ہے کیونکہ اس مرض پر سب تکلیف نفس کو دماغ کا خون سنجوبی لوٹ نہیں سکتا اور اس باعث دماغ پر خون جمع ہو کر بچہ کو کنجشن - وشن - ہو جاتا ہے لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو جا کر بہت کنولشن بھی فوراً دفع ہو جاتا ہے +

اکسا میٹنگ کانز - جوانوں کو بخار میں لرزہ ہوتا ہے لیکن کچھ جوانوں کو لرزہ کر کنجشن - وشن ہو جا کر رہتا ہے علاوہ برین پاخانہ کا قبض بہ شکم کے اندر کرم کا ہونا اگر وہ میں پتھر کا ہونا دانتوں کا تکلیف سے نکلنا ایسے سارے ہی باعث کنجشن - وشن کے پیدا کر کے ہیں - پس یہ حالت کنجشن - وشن میں حکیم کو یہ دریافت کرنا چاہیے کہ کس مقام کی خراش کی باعث بچہ کو کنجشن - وشن ہوا ہے - چنانچہ اگر نوبت اس بیماری کی کسی شدید مرض کے درجہ اخیر میں ہو اگرین تو اسے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اب موت غفریب ہی - اگر کنجشن - وشن - ہو چکا ہو - کاف - کر اندر ہو جاوی تو اس سے دماغ میں کنجشن - وشن - چشجن ثابت ہوتا ہے اگر یہ مرض کسی تندرست بچہ کو ہو جاوی تو اسے معدہ کا امتلا اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچہ نے کوئی شے نفیل کھا لی ہے اور اگر انہیں سے کوئی بھی بات نہ ہو تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کو

ہو جاتا ہے بچوں کی نظام عصبی کی بیماریوں کا تجربہ حاصل کرنا مشکل ہو
 کیونکہ جب اونکو یہ امراض ہوا کرتی ہیں اور اونکو ہوش و حواس و
 حس و حرکت میں فرق پڑ جاتا ہے تو ان علامتوں کو دے بالکل
 بیان نہیں کر سکتے اور اسلئے حکیم شخص میں غلطی کہا جاتا ہے۔ ایک
 عام علامت دماغ کی بیماریوں کی۔ کن۔ وشن۔ ہے۔ اور چونکہ بچوں کو
 کن۔ وشن۔ اکثر ہو جاتا ہے اسلئے اسکا بیان علیحدہ کرنا پڑو

بیان کنولشن۔ یعنی ام الصبیان

واضح ہو کہ جب دماغ میں کوئی شدید مرض ہوتا ہے تو اسکو کئی کئی
 درجہ میں یہ علامت اکثر پیدا ہوتی ہے اور اس بات کو یاد رکھنا چا
 کہ جس طرح جو اوزن کو زبان ہوا کرتا ہے اور وہ دہیات بکری
 لگتی ہیں۔ اسی طور پہ بچوں کو کنولشن ہو جاتا ہے کہ جو علامت
 زبان کی نہایت مشابہت ہے۔ ساری جسم کی اندر دو ہی معتبر
 فعل ہیں ایک تو حس اور دوسرا حرکت۔ لیکن بچہ بن میں دماغ کا
 فعل صرف جسم کی حرکت کو انتظام کے لئے زیادہ تر مصروف رہتا ہے
 کیونکہ عہد طفولیت میں دماغ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسی معتبر ترین
 افعال مثلاً ادراک فہم اور عقل کا انتظام ہو سکے۔ پس بچہ کی شدید
 امراض میں مثلاً شدید۔ نیو۔ مو۔ نیا وغیرہ میں جب اونکو کنولشن
 ہوتا ہے تو اسلئے ایسا قیاس نہ کرنا چاہئے کہ دماغ کے اندر کوئی
 نئی بیماری ہوئی ہے۔ بلکہ اسلئے یہ گمان کرنا چاہئے کہ مرض مذکور
 یعنی۔ نیو۔ مونیو۔ اسقدر شدید ہو گیا کہ اسنے ساری جسم کی اور خاص کر

باب اول

امراض دماغ و عصاب

واضح ہو کہ نقشہ جات موت سے یہ بات ثابت ہے کہ دماغ اور اعصاب کی بیماری
 سی اکثر سبب مر جاتے ہیں اور وجہ اسکی دو معلوم ہوتی ہیں +
 اول - یہ کہ جسم کے اندر سیوا اور رحم محمولہ کے اور کوئی عضو اسقدر نہیں
 بڑھتا ہے کہ جقدر سچون کا دماغ بڑھا کر تا ہے کیونکہ دو ہی برس کی عمر
 کو اندر سفدار اس عضو کے دو فی ہوجاتی ہے اور ساتویں سال تک یہ
 قریب اپنی کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ پس اسی واسطے سچون کے دماغ میں بہت
 جوانوں کے زیادہ تر مرض ہوا کرتا ہے +

دوسری - وجہ سچون کے دماغ میں زیادہ تر بیماری ہونے کی یہ ہے
 کہ انکو کاسہ سر کے ٹھکان ملائم ہوتی ہیں اور جو ٹمضبوط نہیں ہوتے
 اسلئے دماغ کی رگوں کو بخوبی سہارا نہیں ملتا۔ پس سچہ کی سر کا دوران
 خون جب کسی وجہ سے بگڑ جاتا ہے۔ مثلاً ہونٹنگ کاف - کی نوبت کو
 وقت اگر وریدوں کا خون کشید دماغ سے بخوبی واپس نہ آسکے یا نچا
 کر شروع میں یا کسی عضو رئیس کے اکیٹوانفلانیشن کے اندر جب شرائین کا
 دوران خون نیر ہوجاتا ہے تب دماغ میں اجتماع خون ہو کر سچہ کو کنوٹن

اگر بچہ اوس آلہ کو دیکھ کر خوف نہ کہا جائے تو اسکو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹے گا
 کہ حکیم صاحب یہ کہلو نا بنا۔ می سی پہلا فی کے لئے لائے ہیں اور یہ
 سمجھ کر مٹھاری اوس بازی میں وہ بھی شریک ہو جاوے گا اور اس
 آلہ سے کھیلنے لگے گا +

وہیں بچوں کی زبان اور مسوڑوں کا حال دریافت کرنا نہایت مشکل ہے
 اگر پہلے پہل بچہ رو دیا تو اسکی زبان کو دیکھ لینا جا ہی اور اگر
 ضرورت ہو تو اس کے مسوڑوں پر بھی اپنی انگلی پھیر لینی چاہیے ورنہ
 وہیں کا امتحان اگر سب سے پہلے کیا جاوے تو بہتر ہے اور اگر پہلے
 پہل بچہ نہ روے تو سب اعضا کے امتحان سے پہلے اپنی انگلی سے
 اسکی لبوں کو چونا چاہیے کہ جسے بچہ آپ ہی منہ کھول دے گا تب
 اسکی زبان حلق اور مسوڑوں کا امتحان بخوبی کر سکتے ہیں۔ لیکن
 جن بچوں کی عمر کسی قدر زیادہ ہوتی ہے انکو اس بات کی لئے بہت پرہیز
 پڑتا ہے۔ علاوہ ان باتوں کے یہ بھی دریافت کرنا پر ضرور ہے کہ
 وہ مرض کیونکر شروع ہوا اور اس کے ابتدائی علامتیں کیا تھیں
 کیونکہ اس سے بھی تشخیص کو بہت مدد ملتی ہے +

حال ہنٹ پر کان لگا کر سننے سے بخوبی دریافت ہو سکتا ہے کسٹم کے
 ہنخی بچہ اکثر شب و روز جٹ لیٹی رہا کرتے ہیں کہ جس باعث سارا خون
 ہپٹرون کا اسی جانب کو رجوع ہوتا ہے اور بطن بھی اسی جانب
 کی برائگیل۔ ٹیوب میں زیادہ تر رجوع ہوتا ہے بہ نسبت اور حصہ
 ہپٹرو کے۔ پس اگر یہ بات دریافت ہو جاوے کہ ہپٹرون کے
 بچھو کی جانب میں ہوا کی آمد و رفت بخوبی ہے اور اگر اوس جانب میں
 بہت زیادہ۔ کرسی۔ پی۔ ٹنٹ۔ رائکس۔ بھی نہ سنائی دیوے
 تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہپٹرون کے سامنے کی جانب میں۔
 کوئی ایسی مہلک بیماری نہیں ہے +

جب تینے ساری پٹہ پر کان لگا کر بخوبی سن لیا تب اسپر۔ پرکشن
 کرنا چاہیے اور پہلی پرکشن اور پچھو اسکلٹی۔ شن۔ ہرگز نہ کرنا چاہیے
 جیسا جو انون میں اکثر کیا کرتے ہیں کیونکہ اگرچہ کتنی ہی آسٹگی سٹی
 پرکشن کر دتا ہم بچہ چیخ پڑتا ہے کہ جس سے پیراؤسکے سینہ کی آواز
 سننے اکثر مشکل ہو جاتی ہے۔ اپنی ماتہ کی انگلیاں سینہ پر جا کر آہستہ
 آہستہ آہستہ ٹھونکنا چاہیے اور ہمیشہ ایک جانب کی آواز کو سینہ کے
 دوسری جانب کی آواز سے ملاحظت کرنی چاہیے ورنہ غلطی کا جمال
 ہی اور یہ کہ اوسی جانب کی سینہ کی آواز کے حصہ کی آواز کو نیچے
 کی حصہ کے آواز سے بھی مقابلہ کرنا چاہیے۔ بعد امتحان ہنٹ کی اگر بچہ
 اجازت دی تو سینہ کی جانب اور سامنے کو بھی امتحان کر لین۔ لیکن
 بچہ نکی سینہ کی سامنے کو بغیر سینہ میں کے اکثر امتحان نہیں کیا جاسکتا
 اور بچوں میں سینہ میں کا استعمال کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ

کوئی چیز مثلاً مٹھاری گھڑی یا اسٹی۔ تھس۔ گوب کو بطور کہلو نو کے
دیکھلاؤ اور جب اس ترکیب تمیز او کے ذہن اور فہم کو دریافت
کر لیا بت او کے سر پہ ہاتھ پیر کر او کے یا فوخ یعنی تالو اور سر کی
حرارت کو ملاحظہ کرو ۛ

شکم۔ بچہ کے شکم کی امتحان میں نہایت احتیاط درکار ہے کیونکہ
اگر تم کہلائی کی گود میں بچہ کو چٹ لٹا کر او سکا پیٹ ٹوٹنا جا ہو
تو اسے بچہ خوف کھا کر روئی لگے گا کہ جسے شکم او سکا کھچر سخت ہو جائے
اور بت نمکویہ معلوم ہو گا کہ آیا بچہ سبب دبا فی شکم کے روتا ہے یا
وہ رونا در دکی باعث ہے بلکہ شکم کے امتحان کرنے کی بہتر ترکیب
یہ ہے کہ جس وقت کہلائی بچہ کو گود میں لیکر پھرتی ہو اس وقت اپنا
ہاتھ اس بچہ کے کپڑوں کے اندر داخل کر کے او سکا پیٹ ٹولیں
اور دائی کو کھدین کہ اس وقت بچہ کو باتوں میں مشغول رکھے
یا او سکو کسی کپڑے کے پاس روشنی دکھلا دیں کہ جسے بچہ نہایت
مغوش ہوتے ہیں۔ اگر شکم میں درد ہو تو بچہ او کے دبا فی سے نہیں
رووی گا اور جو نفخ کے باعث درد ہوتا ہو تو شکم کے دبا مینی او سکو
آرام آجائے گا ۛ

سینہ کو اگر صرف کان لگا کر سنیں تو بہتر ہے کیونکہ۔ اسٹی تھس
گوب سے اکثر بچہ وق ہوتے ہیں اور بہتر ترکیب یہ ہے کہ کہلائی
یا والدہ کو کہیں کہ بچہ کو سیدنا اپنی سینہ اور گلے سے لگا لی۔ تب
اوسکی پیٹھ کا کپڑا اٹھا کر اس پر اپنا کان لگا دیں کیونکہ یہ بات یاد
رہی کہ بچہ پن میں جتنی شدید بیماریاں سینہ کی اندر ہوتی ہیں سارو

پر کرو کہ بچہ جاگ نہ پڑے۔ والدہ یا کہلائی کو چاہئے کہ بچہ کو آہستہ سوجھا دے
 اور جگاتے وقت اس بات کی احتیاط رکھیں کہ پہلے پہل بچہ کی نظر کسی
 شکل غیر مانوس پر نہ جا پڑے اور تھارے جانی بہ بچہ اگر جاگتا ہو تو سید
 ہی کہ چند منٹ کے بعد وہ متنی اس قدر مانوس ہو جائے گا کہ اولکے ماتھے کے
 چھوٹی یا نبض کے دیکھنے سے اوسکو انکار نہ ہوگا اور یاد رہی کہ سب سے
 اول نبض کو دیکھنا چاہئے تاکہ بچہ کے پریشان ہو بیسی پیشتر یہ بات
 حاصل ہو جاوے کہ کسٹھ کہ یہ قاعدہ ہے کہ ادنیٰ سبب سے ہی جب
 بچے پریشان ہوتی ہیں تو اونکی نبض میں ایک منٹ کی اندر یہ ضرب
 کا فرق پڑ جاتا ہے اور اوس حالت پر نشانی کی نبض شمار میں اکثر
 غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ علاوہ نبض کے بچہ کی حرکات تنفس کو ہی
 شمار کرنا چاہئے کیونکہ مرض کی تشخیص کا کل کے لئے ان دونوں باتوں کا
 حاصل کرنا بہ ضروری لیکن بچہ کو پہلے ہی دفعہ کی ملاقات میں ان
 باتوں کی درست دریافت کرینے کے لئے زیادہ پریشان نہ کرنا چاہئے کیونکہ باوجود
 تھارے ہی کوششوں کی بھی شاید ان باتوں کا علم نہ ہو حاصل نہ ہو
 اور جو ہو جائے تو سبب اوسکو پریشان کرینے اوس کا اعتماد تم پر
 سے جاتا رہے کہ جس کا حاصل کرنا تم پر واجب اور لازم ہے لیکن
 ہوتی ہی احتیاط اور ملائمت سے تم ان باتوں کو حاصل کر سکتے ہو۔
 جب اوسکی نبض کو تم دیکھو یا شکم پر ماتھے رکھ کر اوسکی حرکات تنفس
 کا شمار کرو تو اوس وقت اوسکے جسم کی حرارت اور جلد کی حالت کو
 بھی دریافت کر سکتے ہو۔ جب یہ باتیں اتم کو حاصل ہو جاوے تو اس
 بچہ سے گفتگو کرنے کی کوشش کرو یا اوسکے خوش ہونے کے لئے

دھنگ بھی نہایت جلد آجاتا ہے تاہم چند اشارات درباب امتحان طفل
 بیمار کو واسطے رہنمائی نوآموزوں کے لکھو اس جگہ پر تملانی پر ضرور
 پس یہ بات ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو انہی بیماریوں
 میں امید رکھتا ہے کہ وہی اسٹی ساتھ خلق اور رحم سے پیش آویں
 غرض یہ باتیں بچہ کی بیماریوں میں زیادہ تر ہونی چاہئیں پس
 جب تم کسی بیمار طفل کے علاج کو جاؤ تو ہرگز ایسا نکرنا کہ جس میں وہ
 سے خوف کہا جاوے اور جب تم اس بات سے بچ رہو تو پھر اس کا
 اعتماد تم پر جلد ہو جائے گا جس کی ترکیب یہ ہے کہ مریض میں داخل
 ہوتی ہی بچہ کی نزدیک بن جاؤ بلکہ اس سے اس قدر دور بیٹھو کہ اس کا
 خیال تم پر نہ آسکے اور وہاں بیٹھو اس کو جب چپ کر دیکھتے ہو
 اور اس کی والدہ یا کھلائی سہراؤسکی مرض کا خیال دریافت کر لیتے ہو
 اس دھنگ سے تم کو اس کی نسبت بہت سی باتیں حاصل ہو جائیں گی
 چنانچہ اس کے بشیر اور تنفس کا حال کہ وہ دم متواتر آیا آستہ یا
 باقاعدہ یا بے قاعدہ لیتا ہے معلوم ہو سکتا ہے اور اگر بچہ روزی لگے
 تو اس کو بھی توجہ سے سنا جاوے اور جب یہ ساری باتیں حاصل
 کر لو تو بچہ کی طرف ہرگز گہوڑا نہ جاوے کیونکہ تنہی بچہ اس بات سے
 خوف کہا جاتی اور رونے لگتی ہیں اگر بچہ تمہارے آنے پر سوتا ہو
 تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ آرام سے سوتا ہے یا چونک چونک بڑتا
 یا اس کی آنکھیں بالکل بند ہیں یا کسی قدر کھلی کہ چوہات اکثر دماغ کی
 بیماری میں ہوا کرتی ہے اور اگر وہ بچہ سوتا ہو تو تم اس کی حرکات
 تنفس اور زبان نبض کو گن سکتے ہو لیکن ان باتوں کو اس طریق

ہر لیکن جب تک اسباب میں توجہ نہ کی جاوے تب تک وہ زبان سمجھ میں نہیں
 آسکتی کیونکہ وہ اشاروں کی بولی ہے اور وہی اشاری ایسے ہیں
 کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتے اور جس کی کو بچہ کی محبت نہیں ہوتی ہے
 وہی ان اشاروں کو ہرگز سمجھ نہیں سکتے کیونکہ بچہ اس شخص کو فوراً
 مار جاتا ہے جو اس کو پیار کرتا ہے اور جب وہ بیمار پڑتا ہے تب اسی
 شخص کو اپنی دل کا حال یا تو باتوں یا اشاروں سے بتلاتا ہے علاوہ ان
 امراض جہان کی تشخیص کو لئی ایک خاص ڈھنگ چاہئے چنانچہ اگر بزرگ
 کسی بیمار بچہ کے کمرے میں گھسکر ملتا ملے اس کو گھورنی لگے اور اونچی آواز
 سے اس کی دائمی یا والدہ سے اس کی مرض کا حال دریافت کر لے لگے
 تو وہ بچہ جسے کبھی تمکو دیکھا ہی نہیں ہے خوف کہا کر رونی لگے گا اس وقت
 اس کی نبض اور سانس جلد جلد چلنے لگے گی اور چہرہ اس کا سرخ ہو جائے گا
 پس اس حالت میں متسی بہت سی باتیں اس کی مرض کی باب میں دریافت
 نہیں ہو سکیں گی۔ علاوہ اس نقصان کے ایک اور بڑا نقصان
 تمہارا یہ ہوگا کہ اگر بچہ تم سے ایک دفعہ خوف کہا گیا تو جب تک تم اس کے
 پاس موجود رہو گے تب تک تمہارا خوف اس پر غالب رہے گا اور جو اس
 حالت میں تم اس کی زبان کو دیکھنا یا اس کے سینہ کو استمان کرنا چاہو
 تو وہ اور بھی شدت سے چچین مارنے لگے گا۔ اس وقت دق ہو کر
 تمکو وہ مکان چھوڑنا پڑے گا اور دل میں شاید یہ کہو گے کہ بچہ کی
 مرضوں کی تشخیص ایک امر محال مطلق ہے لیکن اس امتحان کو دست
 ترکیب سے اگر کرتے تو نتیجہ اس کا اور بھی کچھ نکلتا اور اگرچہ ہلکا سا بتا
 یقین ہے کہ جسکو بچہ ن سے محبت ہوتی ہے اس کو بیمار بچہ کی استمان کر کے

اطوار اور بولی اوسی شہر کے طور پر ہے کہ جسکو تینے ابھی چھوڑا ہے لیکن جب
تکو یہ معلوم ہوگا کہ اونکی بول چال اور ہی اور عادات اور طور ہے
نرالی ہی بت حیرت آویگی۔ پس بچوں کی بیماری میں تشخیص حاصل کرینو الونکا
بھی ایسا ہی حال ہوا کرتا ہے کیونکہ بچہ بچہ کو سوال کچھ بوجہ نہیں
سکتی اور جو وہ جواب دینے کے قابل بھی ہو تو بسبب خوف یا نہ سمجھنے پتا
بولی کے کچھ کا کچھ کہہ دیتا ہے اوس وقت جو تم جاہو کہ اوسکے بشرہ
سی کوئی بات حاصل کرو وہ بھی اکثر اوقات نہیں ہو سکتا کیونکہ بچہ
رونی لگتا ہے اور تمکو اپنی شکل دیکھلانے نہیں جاتا اوسکی نبض اگر
دیکھنا چاہو تو وہ خوف کھا کر اسقدر بے قرار ہو جاتا ہے کہ اوس ترکیب
بھی تم اوسکی مرض کو پہچان نہیں سکتے اور اگر سینہ بن کے ذریعہ اسکے
سینہ کو امتحان کرنا چاہو تو وہ دفعتاً شدت سے چنچن مارنی لگتا ہے
پس یہ ایسی مشکلات ہیں کہ بعض حکیم انکو حل نہیں کر سکتے اور آخر کا
وق ہو کر بچہ کی بیماریوں کا علاج معالجہ ترک کر دیتی ہیں اور لوگوں پر
یہ مشہور کر دیتی ہیں کہ انکی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے اور یہ بیماریاں
اس قابل نہیں ہیں کہ خاکسراں پر توجہ کجاوے مگر جابے افسوس ہے
کہ یہ غلطی صرف خود انہیں کی بیوقوفی کا نتیجہ ہے کیونکہ پہلے ہی
بسم اللہ میں انہوں نے یہ غلطی کی کہ اپنی نئے مرضیوں کو سول
کرنے کا ڈھنگ نہ سیکھا۔ پس ایسا سطر انکو جواب بھی باصواب غلا
بچہ کو پوچھنے کے باب میں ہم یہ کہتی ہیں کہ اگرچہ انکو بات کرنی نہیں
آتی تاہم اونکی بھی خاص ایک زبان ہے۔ پس جو شخص بچہ کا حکیم
ہونا چاہی اوسکو پہلے پہل اوس زبان سے واقفیت کرنی نہایت ضرور

کیونکہ سچے سائنس لینا معلوم کرنا اور کسی چیز پر خیال جانا رفتہ رفتہ ہی سیکھنا
 اور اس کے جسم میں بھی ہر روز تغیر و تبدل رہا کرتا ہے تاکہ وہ نئے
 کاموں کو قابل ہو جاویں اور جسم کی بالیدگی اور طاقت بھی روز بروز
 زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ باری صرف حالت حال ہی کو نہیں بدل دیتی
 بلکہ اثر آئندہ کے حالات پر بھی موثر ہو جاتا ہے اور بیماری کے
 ہونے سے صرف فعل حال عموماً مؤثر کا نہیں بگڑتا بلکہ ٹھوڑی عرصہ کے
 لئے اس مرض کو باعث سارے جسم کا فعل رکا ہوا رہتا ہے علاوہ
 برین عہد طفولیت میں ایسی ہی اوقات ہیں جیسے دندان شیر اور
 بچے دانت نکلنے کی وقت کہ جن وقتوں میں بچے کے جسم کی اندر بڑی بڑی
 تغیرات پیدا ہوا کرتے ہیں جسے خوف بیماری کا ہوتا ہے کیونکہ ان
 ایام میں بہ نسبت اور وقتوں کے بیماری اکثر خوفناک ہوتی ہے پس
 اس ایام میں جو مرض پیدا ہوتا ہے اوس میں دونا اندیشہ ہوتا ہے
 اور برعکس اسکے جب یے ایام دانت نکلنے کے چیز و عافیت سے گزر جاتے
 ہیں تب اکثر وی امراض نہیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو پہلے کثرت سے
 ہوتی تھی +

امراض صبیان کے تجربہ میں پہلی پہل ایک ایسی مشکل سدا رہ ہوتی ہے
 کہ اکثر حکیم مایوس ہو کر ان امراض کی تحقیق کے درپے نہیں ہوتے
 وہ مشکل یہ ہے کہ مہارسی اگلی ترکیبیں مرض کی تشخیص کے اکثر اوقات
 اس موقع پر کار آمد ہونگی اور نہ کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا نئی صورت ہے
 پھر فن طبابت سیکھنا پڑا یا تم ایسا سمجھو گے کہ اب میں ایک نئی شہر میں
 وارد ہوا ہوں جسکے باشندوں کو تم ایسا خیال کر وگو کہ انکی عادات و

صحت نہ سمجھنا چاہئے اور یہ بات کسی مرض میں اس قدر نہیں پائی جاتی
 ہی جیسے سچہ کی دماغ کی بیماریوں میں کہ جن میں موت کی تھوڑی ہی عرصہ
 بیشتر سچہ ہوش میں آجاتا ہے بلکہ ہوش کی باتیں ہی کرنے لگتا ہے
 لیکن یاد رہی کہ یہ علامتیں بظاہر صحت نہیں ہیں بلکہ موکل موت ہیں

ترکیب بیماریاں بچوں کے امتحان کرنے کی

بچوں کی بیماریوں میں خاص کر زیادہ توجہ کی اس لئے ضرورت ہوتی ہے
 کہ ان کی امراض اکثر مہلک ہو ا کرتی ہیں کیونکہ ایک سال کی عمر کے بچے میں
 اکثر ایک مرتبہ ہے اور پانچ سال کی عمر کے اندر تین میں ایک مر ا کرتا ہے
 علاوہ برین بچوں میں صرف یہی بات نہیں پائی جاتی ہے کہ بہ نسبت
 جو انون کے وہی نازک تر ہوتی ہیں بلکہ ان کی مختلف اعضا کے اندر
 اسپین زیادہ تر شرکت پہ ہوتی ہے چنانچہ اس واسطے جب ایک عضو میں
 بیماری ہوتی ہے تو سارا جسم اوس بیماری کا شریک ہو جاتا ہے۔ کہ
 جس باعث اکثر اوقات کچھ خاص مقام کی مرض کی تشخیص میں وقت
 پڑتی ہے۔ پس حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کا یہ شعر بچوں
 ہی کی بیماریوں میں زیادہ تر راست آتا ہے کہ ششہا جو عضو بدر
 آور و روزگار + و اگر عضو مارا مندا ن قرار + اور علاوہ اس شرکت
 کی سبب بن میں چونکہ فعل نشو و نما کا ہر دم ہوتا رہتا ہے اس لئے جب
 ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو نتیجہ اوس بیماری کا طرح طرح کا ہوتا
 ہے چنانچہ جو انون میں ہر عضو اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے
 افعال جیسے کل تھوڑی سی آج پر لیکن صباں میں یہ بات نہیں ہوتی

کیسا ہی خفیف ہو ہمیشہ ایک مدت دراز تک رہتا ہے پس اس حالت میں
ایسا نہ کہہ دیں کہ بچہ کو علبہ شفا ہوگی بلکہ اس بات کو سمجھ کر نتیجہ کہنا جائے
کہ یہ مرض دیر پا اور ٹھیک ہے اور اس میں دماغ اور سینہ کی اندر نسبت
کی مرض ہو نیوالا ہے۔ اور واضح ہو کہ نتیجہ گوئی کی احتیاط کسی اور
مرض میں اس قدر نہیں ہوتی ہے جبکہ مرض کمرہ میں ہونی چاہی
کیونکہ جب بچہ کو یہ بیماری ہوتی ہے تب شرکت کی باعث اکثر دماغ میں ہے
مرض ہو جایا کرتا ہے نتیجہ گوئی کے وقت اس امر کا بھی لحاظ رکھیں کہ
اگر کسی خاص مرض کی وبا پہلی ہو تو اس وبا کی خاصیت کو دریافت
کر کے مرض کا نتیجہ بیان کریں۔ مثلاً ہوٹنگ کاف یا مرض میزلس کی
وبا اگر پہلی ہو تو دیکھیں کہ وہ خفیف ہے یا شدید اور تب ان بیماریوں کا
نتیجہ بیان کریں کیونکہ بعض موسم میں ان بیماریوں کی وبا خفیف ہو اگر تری ہو
اور بعض میں شدید ۲

جب بچہ نے اپنی والدین سے کسی مرض کا ورثہ حاصل کیا ہو اور وہ مرض
اس میں پیدا ہو جاوے تو اس صورت میں نتیجہ برا ہوتا ہے پس اسی
تدبیر کریں کہ جس میں وہ مرض ظاہر نہونے پاوے اور ان امراض کے
لئی بھی یہی قاعدہ رہتا ہے جو کسی خاص جگہ کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہیں
بچوں کی بیماری کی علامتوں میں کہ جب وہ مرض مہلک ہونی لگتا ہے
ایک خاص بات ایسی پائی جاتی ہے کہ بچہ اس بات سے نا تجربہ کا حکیم کو
آگاہ کرنا پر ضرور ہے وہ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ جب بچہ قریب المرگ
ہوتا ہے تب علامتوں کو یا تو تخفیف ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ اس مرض
کی شدت علامتوں بالکل مفقود ہو جاتی ہیں غرض اس تخفیف کو پیغامبر

عموماً ہم یہ بات بتلاتے ہیں کہ کسی شدید مرض کے درجہ اول میں بچہ
 کیسا ہی بیمار ہو جاوے اور فرسوس و زہ میں وہ کتنا ہی دبلا ہو جاوے
 اور ان حالتوں میں ہماری نتیجہ گوئی کیسی ہی خراب ہو تھی مایوس ہو کر
 بچہ کا علاج بھڑونا چاہئے کیونکہ لیٹے کم حکیم ہونگی جنہوں نے نہایت شدید
 درجہ مرض میں علاج مناسب سو فیادہ نہ حاصل کیا ہوگا یا جب بچہ قریب
 ہوس وقت بھی علاج مناسب سے اوسکو شفا ہوتے نہ کیا ہوگا اور اس بات
 کا ذکر کیا گیا ہے کہ بچہ نگو شرکی امراض اکثر ہو جایا کرتی ہیں اور مستقل بیماری
 کی نسبت شرکت کی بیماریاں کم خطرناک ہوا کرتی ہیں خاصکر اگر مرض کی
 تشخیص عین ابتدا میں ہو جاوے اور اگر مستقل مرض علاج پذیر ہی ہوا۔
 اور اس بات کو یاد رکھیں کہ باعث شرکت اعضا کے اگر کسی عضو کے
 فعل میں خلل پڑ جاوے اور وہ خلل ایک مدت دراز تک رفع نہ کیا جاوے
 تو اوس عضو کی ساخت میں بیماری سرایت کر جاوے گی پس اس وقت میں
 بہ نسبت مستقل مرض کے جسکی شرکت کی باعث پہلے اوس عضو کی فعل
 میں خلل واقع ہوا تھا اور بعد ایک مدت کے اوسکی ساخت میں بیماری پڑ
 تھی یہ شرکتی مرض زیادہ تر خطرناک ہو کر سکتا ہے پس نتیجہ گوئی کے
 وقت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ اور بچوں کا یہ میلان طبع طرف
 شرکی بیماری کی یا طرف اون امراض کے جو کسی اور مرض کے ہونے
 سے پیدا ہو جایا کرتی ہیں ایک خاص باعث اندیشہ کا ہوتا ہے لہذا
 جب ہنگو یہ معلوم ہو جاوے کہ کوئی بیماری ایک مدت دراز تک سہمی
 والی ہے تو اوس صورت میں نتیجہ گوئی میں محتاط ہونا چاہئے۔ اور
 دفعتاً شفا کا وعدہ نہ کرنا چاہئے مثلاً سچہ بخار بھی سنٹ۔ فیور ابتدائی

جوانوں کے بچے زود تر دلوں پڑ جاتی ہیں۔ اگر بچہ ایک دن درازت بیمار ہو تو نہایت لاغر ہو جاتا ہے جلد کی رنگت جانی رہتے ہے اور اوسمین شکن پڑ جاتی ہیں اور وہ کمر دوری اور خشک بھی ہو جاتی ہے اور چہرہ بچہ کا ایسا ہو جاتا ہے جیسے سن آدھونکا ہوتا ہے +

سوم۔ پراگ۔ نو سس

یعنی پیش گوئی بچہ کی بیمار پونہین

یہ بات ظاہر ہے کہ جب مرض کی تشخیص ہو چکی تب اسکا انجام نیک یا بد کہنا کچھ مشکل نہیں ہوتا مثلاً خاص ایک قسم کا مرض ٹائڈروفلس ہی کہ جو ہمیشہ مہلک ہوتا ہے لیکن برخلاف اسکے آتشک کی بیماری بچہ کو کیسی ہی شدید ہو قابل شفا کے ہی اور ایسی ہی اور بیمار یونکو با بچہ ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم اونکو بچان لیں +

واضح ہو کہ درست تشخیص کی ضرورت کسی اور امراض میں اسقدر نہیں ہوتی جیسے بچوں کی بیماریوں میں ہوا کرتی ہے کیونکہ بروقت اگر اونکو نہ بچانیں تو موقع علاج کا ماتھہ سے جاتا رہتا ہے چنانچہ جتنی بیماریاں از قتر شدید انفلا میشن کی ہیں وی ساری خوفناک ہوتی ہیں لیکن بروقت اگر اونکو بچان کر مناسب طور پر اونکا علاج کریں تو اون کا انجام نیک نکل سکتا ہے اور جب درجہ شدید اون امراض کا رفع ہو جاتا ہے تبھی امید انجام نیک کی ہوتی ہے اگرچہ کسی عضو اندرونی کی ساخت میں بھی کسی طرح کا فتور برپا ہو جاوے کیونکہ بچہ کی طبیعت میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ اوس فتور کو بھی رفع کر دی سکتا ہے +

پیدا ہوتی ہے اور اسکو یاد رکھیں کہ جو بات جوان کی آواز سے باہمی جاتی ہے
 وہ بات بچہ کو رونے سے حاصل ہوتی ہے۔ عموماً جب شدید انفلا میشن کی
 باعث بچہ کو درد ہوتا ہے تب وہ چیخ مار کر۔ و نہن سکتا بلکہ اوس وقت
 کارونا ایک یاس کا ہوتا ہے درد کے مقام کو دریافت کرنے کے لئے کئی سہانچو
 ملاحظہ کرنا چاہئے کہ بچہ اپنے ماتھو کو کسی مقام پر رکھتا ہے یا سر پر یا
 گلو یا شکم پر اور اس نشان کو اگر اور علامتوں کی بھی مدد پہنچی اور بچہ
 کو اگر جھٹ بھی نہ لگے ہو تو جس حصہ جسم پر بچہ ماتھہ رکھے درد کو بھی اسی
 مقام پر سمجھنا چاہئے اور بچہ اگر سمجھ دار ہو تو صرف اوسکی اس بات پر نہ
 جانا چاہئے کہ میرے سر یا شکم یا کسی اور مقام میں درد ہوتا ہے بلکہ اسکو
 کہیں کہ وہ اپنے ماتھہ سے اوس مقام کو بتلا دے کیونکہ بچہ اکثر کچھ کچھ
 کہہ دیتا ہے اور بشرہ سے بھی درد کا مقام دریافت ہو سکتا ہے مثلاً جب
 سر میں درد ہوتا ہے بچہ کی تپڑی چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور جب شکم میں
 درد ہوتا ہے تو لبین کچی ہوئی اور فرق ہوتی ہیں اور جب دم لینی
 ٹھنک اور درد ہوتا ہے تب ناک کے انتہی حرکت کرنے لگتی ہیں بچہ کا دہلا
 ہو جانا اور اس کے عضلوں کا ملائم ہو جانا ہی ذریعہ تشخیص کے ہیں لیکن اس
 حالت کا امتحان صرف چہرہ ہی کو دیکھ کر نہ کریں کیونکہ چہرہ پر نظر آسکتا ہے
 اگرچہ سارا جسم بچہ کا دہلا بھی ہو جاوے۔ می۔ سن۔ ٹری۔ کی
 بیمار یون میں مثلاً ٹری۔ بس۔ می۔ سن۔ ٹی۔ ریکا۔ کی اندر بچہ دہلا
 تو ضرور ہو جاتا ہے لیکن تدریج۔ جب انٹرویو کے میو کس ممبرین
 میں کسی طرح کا خلل واقع ہوتا ہے تو بچہ کے عضلہ ملائم اور دہلی پڑ جاتے
 ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ جب ماضیہ میں خلل واقع ہونا ہو تب نسبت

اور سینہ کی عضلہوں کے ذریعہ لیا جاتا ہے اور بت ناک کی تھوہر اس بات کا کچھ
 بھی اثر نہیں پیدا ہوتا ہے اگرچہ تنفس بہت جلد جلد بھی لیا جاوے +
 واضح ہو کہ بہ نسبت نبض کے جلد کی حرارت سے بچون کی بیماریاں زیادہ تر
 پہچانی جاتی ہیں۔ چنانچہ جلد کی حرارت اگر سو درجہ سے زیادہ ہو تو
 اس سے بخار قیاس کرنا چاہئے۔ اگر نبض تیز ہو اور تنفس بھی جلد جلد لیا
 جاوے اور جلد کی حرارت ۱۰۶ درجہ یا اگر ۱۰۴-۱۰۵ درجہ تک بھی ہو تو اس
 مرض نیو-مونیا ثابت کرنا چاہئے لیکن انٹریونک انفلامیشن اگر کیسی ہی
 شدید ہوتا ہم جلد کی حرارت ۱۰۴ درجہ سے زیادہ نہیں ٹہرتی +
 بچہ کو درد ہوتا ہے یا نہیں اور وہ درد کس مقام میں ہوتا ہے۔ یا
 کس سبب سے بچہ روتا ہے ان باتوں کو دریافت کرنا اگرچہ مشکل ہی بہ نسبت
 ضروری مثلاً درد اگر شدید ہو تو بچہ ایک خاص طور سے روتا ہے
 اور شدید نہ ہو تو اوس وقت کا رونا اور ہر قسم کا رونا مختلف طور کا ہوتا ہے
 بچہ اگر چوٹا ہے اور تازہ اور توانا ہے اور اسکو شدت کا درد ہوتا ہو
 تو اوس وقت کا رونا اوسکا صاف تیز بلند اور کیساں ہوگا اور بہ نسبت
 دم کشی کے برآمدگی دم کے ساتھ وہ زیادہ رو دینگا بچہ اگر کمزور ہو
 اور وہ سبب وق ہونے کو روتا ہو اور درسی نہیں تو اوس صورت میں
 دم کشی کے وقت وہ زیادہ تر رو دویگا اور اس حالت میں بچہ ٹھنڈی
 سانسین بہرے گا اور رونے کی آواز اگر بہاری ہو اور وہ رونا سبب
 کمزوری کو ہو تو اوس صورت میں بچہ کی لارنگس کی طرف توجہ کرنی چاہئے
 اور جب بچہ مرض کو وہاں اور گلو کی تشنج کو باعث روتا ہے تو آواز
 رونے کی ایسی تیز ہوتی ہے کہ جیسے کسی دھات کی برتن میں ٹھونکنی ہو

جب تک مرض کی کوئی معترف علامت پائی نہ جاوے تب تک تشخیص میں محتاط ہونا چاہئے ۔

سینہ کی بیماریوں میں کہا نسی ہمیشہ ہوا کرتے ہیں۔ بچہ کی کہا نسی یا تو شدید یا تشنجی ہوا کرتی ہے اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ننھی بچوں کو جب ہونگ کا ہو جاتا ہے تو اس مرض میں دم کشی کے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ ان بچوں میں نہیں پیدا ہو سکتی ہے اگر بیماری خجھرہ میں ہو تو کہا نسی تیز اور سوٹی ہوتی ہے اور وہ کہا نسی ہمیشہ تشنجی ہوا کرتی ہے اور مرض کروپ میں جو کہا نسی ہوتی ہے وہ ایک ایسی عجیب کہا نسی ہوتی ہے کہ جس کو ایک مرتبہ سنے سے بہر نہیں بھولی جاتی ہے۔ بچوں کی بلغم سی او نکی سینہ کی بیماری کی تشخیص نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ بلغم کو نکل جاتی ہیں۔ بچوں اور جوانوں کی اسکلٹی شین۔ اور پرکش کی علامتیں بعض مراتب کے اندر بڑا فرق ہے۔ پس قبل از تشخیص مرض کے بچہ میں اسکلٹی شین۔ اور پرکش کی علامتوں کو سیکنا پر ضرور ہے جبکہ ہم آگے بیان کریں گے لیکن ماسوا، ان دونوں ترکیبوں کے بچہ کو نشہ اور اوٹھنی بیٹھنے کے ڈھنگ سے بھی سینہ کی بیماری کا گمان ہو سکتا ہے۔ مثلاً جب سینہ کی اندر کوئی شدید یا وسیع انفلا میشن ہوتا ہو تب تنفس جلد جلد لیا جاتا ہے چہرہ کی رنگت بدل جاتی ہے آنکھیں کم و بیش تھرائی لگتی ہیں اور ناک کے نچھتے پھیلے ہوئے اور جلد جلد حرکت کرنے لگتی ہیں اور حرکات تنفس کم و بیش سہل۔ ڈایا۔ فرام۔ اور دیگر عضلات شکم سے انجام پاتے ہیں اور سینہ کے عضلے قریب قریب حرکت رہتی ہیں اور خلاف اسکے جب شکم کے اندر بیماری ہوتی ہے تب شکم کے عضلے قریب حرکت ہوتی ہیں

اور نہ آنکھوں کی پلکوں میں کسی طرح کا فرق پایا جاتا ہے۔ جلد گرم سکڑی ہوئی اور
گہرہ دوری معلوم ہوتی ہے بچہ لاغر ہو جاتا ہے اور سکونٹنگی کمال ہوتی ہے
اور خا صکر سرد پانی کے لٹو بہت ہی ضد کرتا ہے اور بی علامتین کسی وقت
زیادہ شدید ہوتی ہیں اور زبان خشک سرخ اور جانب سے سکڑی ہوتی
ہی اور اسپر ایک گاڑی ہی رطوبت چھٹی ہوئی ہوتی ہے اور منہ کے اندر
چھالی بھی ہو سکتی ہیں اور اکثر دست بھی لگ جاتے ہیں کہ جو اکثر تپے سبز
یا سیلے رنگ کر بدبودار ہوتے ہیں۔ جب بی علامتین پائی جاوین تو یقیناً
جانبین کہ شکم کی اندر مرض ہے اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ باتیں اکثر
دودھ بڑھائی کے وقت پائی جاتی ہیں جیسا کہ اگلی علامتین جنکا ذکر ہم
بشرہ اول میں کر چکے ہیں دانت نکالنے کے ایام میں پیدا ہوتی ہیں۔
بارش کو موسم میں اکثر ہمارے علاج میں ایسے سچے آتی ہیں کہ جو اپنی
کھلائی کی آغوش میں نڈھال پڑے۔ ہتھی میں چہرہ اونکا پیکا اور زرد
ناک اور لبین ہوتی ہیں آنکھیں دبی ہوئی اور اونکے گرد کی جلد
اور لبین نیلی ہوتی ہیں اور جس وقت ہم کھلائی سے پوچھتے ہیں تو وہ
یہ کہتی ہے کہ بچہ کو دست وقتی جاری ہے پر پوچھو کی کچھ حاجت بھی نہیں
ہوتی کیونکہ تجربہ کار حکیم کی ایک نگاہ اس بات کو کہنے کو کافی ہوتی ہے کہ
بچہ نے ہیضہ کیا ہے +

جب کسی بچہ کو کیا نہی ہو آنکھیں اور کسی سُرخ ناک ہتھی ہو اور چنکین
آتی ہوں تب اس سے نکالنا ثابت ہوتا ہے لیکن ان علامتوں سے ہم
یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ کو منیر اس یعنی کہہا ہونے والا سی یا وہ بچہ کسی
دبا میں جو اس وقت موجود ہو مبتلا ہونے والا ہے بلکہ اس میں اور عین

بدبودار اور گہری رنگ کا آتا ہو اور ماتہ گرم اور پاؤں سرد ہوں اور
 ایک گال اگر کمتر متما یا ہو نظر آوے۔ تب اس بات کو یقین جانیں کہ بچہ
 دماغ ہی کے اندر بیماری ہے پر وہ کوئی خاص مرض ہے اور آیا وہ خود
 مستقل بیماری ہے یا کسی اور مقام کی مرض کی شرکت کے باعث وہ
 بیماری دماغ کی پیدا ہوئی ہے یہ باتیں اون علامتوں سے دریافت ہوں
 کہ جنکا بیان ہم آئندہ کریں گے بعض دفعہ ہمارے علاج میں ایسی ہی بچہ
 آتے ہیں کہ جو بالکل نڈمال پڑے ہو مگر مین ماتہ پاؤں بالکل ہلکی
 اور بی حرکت ہوتی ہیں۔ شکم دبا ہوا ہوتا ہے انکھیں بند ہی ہوتی ہیں
 وا ہوتی ہیں اور اوستہ کھلائی ہے جسے یہ بھی کہتی ہے کہ حکیم صی صاحب
 بچہ اتنا اچھا ہے پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ اوستہ کو تشنج ہوتا تھا کہ جواب
 موقوف ہے اور بچہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر دماغ کی بیماری کا گمان
 کیسا بلکہ اوستہ کے خادم اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ کو اتنی تسکین ہے
 اور ہم ایسی ہی بچہ دیکھتی ہیں کہ جبکہ ایک یا دو مین ماتہ یا پاؤں مغلوج
 ہو گئے ہیں اور کسی کو اس بات کی بالکل خبر ہی نہیں ہوتی۔ بچہ کا اور
 ایک قسم کا بشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے نہایت تکلیف ثابت ہوتی ہے
 اور جو بشرہ اول سے بڑا مختلف ہوتا ہے اور جنکا بیان ہم اوپر کر چکے
 ہیں چنانچہ یہ بشرہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لین سقدہ سکر می اور
 کچی ہوئی ہوتی ہیں کہ مسوڑے یا دانت نظر آنے لگتی ہیں چہرہ بچہ کا
 فق یا پھکا اور دبا ہوا ہوتا ہے بچہ حرکت کرنے سے خوف کھاتا ہے اور
 اور اپنے گھٹنوں کو سکیڑ کر چپ لیتا رہتا ہے اور اوستہ کے شکم کو دبائے
 سے درد محسوس کرتا ہے اس بشرہ میں تھوڑی سی جڑ ہی ہوتی ہوتی ہے

بچہ کا سر کھلائی کے بازو پر سبب گرانی کو لگتا ہے یا بچہ سر کو تکیہ پر رکھ کر
 اوپر اڑھر مارتا ہے اور اس بات کو بھی دیکھیں کہ بچہ کی گردن سخت اور
 تنی ہوئی ہے یا نہیں کیونکہ ایسا بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے اور
 اس بات کو بھی ملاحظہ کریں یا کھلائی سے بوجھیں کہ بچہ کبھی اپنے ماتھ کو
 سر پر بھی رکھتا ہے یا نہیں کیونکہ صحت میں بچہ اپنے ماتھ کو اکثر منہ
 سے زیادہ اوپر نہیں لے جاتی ہیں۔ اوسکے ماتھ پاؤں کو دیکھیں کہ آیا
 وہ کچھ ہوئی یا ڈھیلے ہیں یا وہ بوجھت ہیں یا بچہ انکو اوپر اوپر
 مارتا ہے اور انہیں تشنج بھی ہوتا ہے یا نہیں اور خاصکر اس بات کو
 تو ضرور دیکھیں کہ ماتھ کی ہڈیاں بند ہی ہیں اور انگوٹھے ہتھیلی کی طرف
 مڑی ہوئی اور پاؤں کی انگلیاں بھی تلوؤں کی طرف مڑے ہوئی ہیں
 یا نہیں اور اوسکو بھی دیکھیں کہ بچے بائیں صرف ماتھوں یا صرف
 پاؤں ہی میں پائی جاتی ہیں اور یہ کہ صرف ایک ماتھ یا پاؤں یا
 دونوں ماتھ پاؤں میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس سے دلہن کی مرض کی
 جگہ اور اوسکی وسعت دریافت ہو سکتی ہے بعد ازاں آنکھوں کی پتلیوں
 ملاحظہ کریں کیونکہ شاید یہ سگری ہوئی ہوں کہ جس وقت بچہ کو چوڑے
 سے وہ خوف کہا کر چونک پڑتا۔ اور چمچیں مارنے لگتا ہے یا شاید
 یہ ہو کہ تہلیاں پہلی ہوئی ہوں اور اینر روشنی کا کچھ بھی اثر نہ ہوا ہو
 اور بچہ بالکل بے حس و حرکت پڑا ہو ساتھ ان علامتوں کے جن کا
 بیان ہم اوپر کر چکے ہیں اگر یہ علامتیں بھی پائی جائیں کہ بچہ سوئی
 چونک پڑتا ہے دانت پیسا ہے یا لبو نکو ملتا ہے اور خوف کہا کر جاگ
 پڑتا ہے یا چمچیں مارنے لگتا ہے اور یا تو پاخانہ شدت سے قبض ہو یا پاخانہ

پاس آدمی تو پہلے اسکے بشرہ کو دیکھنا چاہئے بعد ازاں اسکے لیٹر کھڑکی
 ہونی اور بیٹھنے کے طریق کو اور بت اسکے ماتہ پاؤں اور جسم کو کیونکہ
 بچوں میں خاصکر ایسا ہوتا ہے کہ انکے بشرہ سے خاص اعضا کی بیماری
 ثابت ہوتی ہے چنانچہ اس عمر میں چہرہ کے عضلون میں زیادہ حرکت
 نہیں ہوتی ہے اور چہرہ کی حرکات سی بدن کا حال زیادہ تر کہلاتا ہے
 بہ نسبت دل کو حالات کی کیونکہ اس عمر کے اندر چہرہ پر بہ نسبت خیالات
 کو حس اندرونی کا اثر زیادہ تر ہوتا ہے۔ پس واضح ہو کہ بچہ کی چہرہ سے
 مین نہایت معتبر باتیں پائی جاتی ہیں یعنی بچہ کے دماغ میں مرض ہوتا ہے
 تب بشرہ اسکا اور طور کا ہوتا ہے اور سینہ کی بیماری میں چہرہ پر
 اور ہی بات پائی جاتی ہے اور شکم کی امراض میں بشرہ اور ہی قسم کا
 نظر آتا ہے چنانچہ چہرہ کو اوپر کے حصہ کے اور پٹیاں بیہوش اور انکھوں کی
 حرکات سے دماغ اور پٹوں کی بیماریاں ثابت ہوتی ہیں اور حرکات
 درمیانہ حصہ چہرہ سے اور خاصکر ناگوں کی حرکتوں سے پہنچتی اور
 دل کی بیماریاں پائی جاتی ہیں اور جب شکم میں بیماری ہوتی ہے
 تو اسکی علامتیں نبض یا لبون کی حرکتوں سے پائی جاتی ہیں۔ اب
 ہم ان علامتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں مثلاً۔ اگر پہوؤں پر توڑی
 ہو اور انکھوں میں ٹکٹی بندہ جاوے تو اسکی بچہ کے دماغ کا خیال
 کرنا چاہئے چنانچہ کو دیکھیں کہ وہ حالت صحت سے زیادہ گرم ہے
 یا نہیں اور رنگین اسکے خون سے پر یا زیادہ ٹھنپی ہیں اور بچہ کے
 سر کا تالو یعنی یا فوخ کو ملاحظہ کریں کہ وہ اونچا ہے یا دبا ہوا ہے بعد
 ازاں اسکے لیٹر یا بیٹھنے کے دھنگ کو ملاحظہ کریں اور دیکھیں کیا

اور جب تک بیماری بچانی نہ جاوے تب تک امراض مزمنہ کا بھی علاج
 دشوار ہے کسلے کے بیمار سچے اپنی حالات بتلا نہیں سکتے اور جو بتلاتی ہیں
 مین تو ایسی کہ جسے حکیم بہک جاتا ہے لیکن اگرچہ یہ بات درست ہو یا ہم
 تجربہ کار حکیم کو اونکو بشیر سے اونکی ساری امراض کا حال کہل جاتا ہے
 کہ جو بات تو سچہ اور نہ اوسکے خدسگاروں سے دریافت ہو سکتی ہے بلکہ
 خدمت گاروں سے مرض کو شروع ہونیکا حال پیشہ دریافت کرنے کی ضرورت پڑتی
 ہے۔ تندرست بچہ موٹا نازہ خوش و خورم ہوتا ہے اور ہمیشہ کہل کو د
 کی طرف طبیعت اوسکی مایل رہتی ہے اور یہی جانتا ہے کہ کوی مچکو گود
 مین لیکر پلہ پری۔ شکم بڑا اور ملائم ہوتا ہے اور اوسکو دبانے سے بچہ خوش
 ہوتا ہے اور اوسکو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوتی۔ زبان اکثر سفید ہوتی
 ہے۔ لیکن اسپر کسی طرح کی رطوبت نہیں ہوتی اور دہن ہمیشہ تر رہتا ہے
 اور پاؤں اور مٹھوں کو سمیٹتی ہوئے کر وٹ پر سوتا رہتا ہے اور وقت معمول
 پر اوسکو نیند آ جاتی ہے اور جاگتے ہی خوش ہو کر دودھ پینا جاتا ہے۔
 بول و براز بدستور آتا ہے۔ لیکن بیا ر بچوں مین یہ باتیں نہیں باجی تری
 مین۔ بیمار بچہ کا مزاج ہمیشہ جڑا ہوتا ہے کوی شخص اگر اوسکو گود مین
 لینا چاہی یا چونا چاہے تو ناخوشی کر وٹے لگتا ہے اور اوسکے سونے کا
 کوی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اور استراحت اوسکو اچھو طور پر نہیں ہوتی
 اور نیند مین دفعتاً چونک کر رہ پڑتا ہے جسم سکا گرم اور خشک ہوتا ہے
 اور خاکہ مٹا تہ اور پاؤں اور سر گرم ہو اکر تا ہے گوشت ملائم اور بڑا
 ہوتے مین دہن خشک اور تشنگی موجود رہتی ہے ہوک کا بھی کچھ ٹھکانہ
 نہیں اور بول و براز غیر معمولی آتے مین جب کوی بیمار بچہ نہا رہے

چنانچہ نہایت تھوچون کی آنکھیں اجا یا کرتی ہیں اور سچ بعض دفعہ اپنی ما کے پیٹ سے - کھٹی - رکٹ - کی بیماری لیکر پیدا ہونے میں اور بعض کے پتلی ہمیشہ کربے پہیلی ہوئی ہوتی ہے اور سچون کی آنکھیں اگر کار نیامین نہ ضم ہوجا سکتا ہے تب وہ پردہ مکدر ہو جاتا ہے اور سچون کی آنکھوں میں اکثر گونجی بھی ہو جاتی ہے سچون کے کانون میں بھی درد اکثر ہو جاتا ہے اور یہ درد بعض دفعہ پھیلی دائروں میں کپڑے لگ جائیں پید ہوتا ہے پر اکثر سردی کے باعث ہی زیادہ ہو ا کرتا ہے رفتہ رفتہ کانون میں انفلامیشن ہو کر پیپ بڑ جاتی ہے اور بگنے کی گلیاں پھول جاتی ہیں اور کان کی ڈیونٹین نہ ضم ہوجا کر وہ نہ ضم جب سر کی ہڈی اور دماغ کے پردہ میں سرایت کر جاتا ہے تب بچہ کو مرض فری - نائیس ہو جاتا ہے کہ جو اکثر مہلک ہو ا کرتا ہے اور علی ہذا القیاس ناک کا پردہ بھی پھول جاتا ہے اور اس میں پیپ بڑ جاتی ہے +

اسکرافیولا بھی مرض سچون کا ہے یہ مرض اکثر ساتوین برس یا بچے دانت نکلنے کو وقت ظاہر ہوتا ہے اور پہلا اثر اس مرض کا اکثر گلو کی گلیٹو پرنمایان ہوتا ہے کہ جو پھولکر بڑہ جاتی ہیں لیکن صرف انہیں گلیٹون کے بڑہنے سے مرض اسکرافیولا نہیں ثابت ہوتا ہے - کیونکہ سچون کی گلیاں اکثر بڑہ جاتا کرتی ہیں +

دوم تشخیص سچون کی بیماریوں کی

سچون کی بیماریوں کی تشخیص میں کمال پیدا کرنا بہ ضرور ہی کیونکہ انہی شدید امراض کے علاج کا کارگر ہونا صرف بیماری کی پہچان پر موقوف ہے

عمر کی بچہ نکو لیکن انہیں سے بہت بیماریاں اس قسم کی ہیں کہ وہی خاصکر
جوانوں ہی کو ہوا کرتی ہیں +

اعضائی بول کی بیماریاں بچہ نکو اکثر کم اور خفیف ہو کرتی ہیں لیکن مثلاً
کا خلل نہایت تہی بچہ نکو ہی ہو جاتا ہے اور جب بچہ کی غذا میں کچھی
طرح کا فرق پڑ جاتا ہے تب یا تو پیشاب میں ایک سفید در در جاتا ہے
یا پیشاب سفید آنے لگتا ہے۔ اور بچہ میں ریت ہی اکثر پیدا ہو جاتی ہے
ہی اور یہ بات خاصکر غریبوں اور اونکی بچہ کو ہو کرتی ہے جو بدھنی
یا نقرص کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ ریت سرخ قسم کی ہوتی
ہی ان حالات کے یاد رکھنے سے یہ فائدہ ہے کہ بروقت علاج کر کے بچہ
رفع کر دیں تاکہ پھر سے پیدا ہونے پاوی جو اکثر غریبوں کی بچہ میں
پیدا ہو جاتا کرتی ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ جب دانت نکلنے وقت
بچہ نکو سجار ہو جاتا کرتا ہے اور خاصکر اوس وقت اگر دماغ میں بھی
خلل واقع ہو تب پیشاب اکثر بند ہو جاتا ہے پس اوس وقت اگر دوا
سے یا از خود پیشاب کھل کر ہونے لگے تو فوراً افادہ ہو جاتا ہے۔ گرد و بخی
بیماری کے باعث بھی پیشاب کم پیدا ہو سکتا ہے اور بچہ نکو وہی گروہ
کی بیماری اکثر ہوتی ہے جسکو اصطلاح میں البیو۔ می۔ نیو۔ ریا۔
بولتے ہیں اور یہ بیماری مرض اسکار۔ لی۔ ٹینک کے بعد یا سروجی
باعث پیدا ہوتی ہے اور سلسل بول ہی بچہ نکو ایک خاص بیمار یونین
سے ہے اور یہ مرض خاصکر دانت نکلنے وقت ہو جاتا کرتا ہے اور جب بچہ
کو ٹائیڈ روکٹس کی بیماری ہو نیوالی ہوتے ہے تب بھی پیشاب بار بار
اور زیادہ پیدا ہوتا ہے بچہ نکو آنکھ کی بیماری بھی اکثر ہو جاتی ہے

تاہم ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ۷ یا ۱۰ برس کے آدمی کو بھی کہسار اور
چھبک ہو گئی ہے یہ بات بہتر ہے کہ بچہ نکو یہ بیمار یا ن عین ابتدا میں
ہو جاوین +

حکیم سواسبات کی صلاح لی جاسکتی ہے کہ آیا بچہ کو ان بیماریوں کو اثر
میں چھوڑ دینا چاہے یا اوسکو ایسی بچانا چاہے۔ واضح ہو کہ اگر جب
تندرست ہو اور وبا امراض مذکورہ بالا کی خفیف تو مناسب ہے کہ بچہ کو
اونکو اثر میں چھوڑ دین لیکن اگر طفل ضعیف الجسم یا دانت نکالتا ہو یا کسر
بیماری سے حال میں شفا پاتا ہو اور چاہی یہ باتیں ہوں یا نہ ہوں اگر
وبا چھبک کی نہایت شدید اور مہلک ہو تو بچہ کو بہر صورت اس سے بچانا
چاہے اور اسبات کو ضرور یاد رکھیں کہ جب ان بیماریوں کا اختلاط
ہوتا ہے اور جب دافو اسنے پک جاتی ہیں اور کہ نہ جھرنے لگتا ہے تو اون
دفتوں میں ان بیماریوں کی چھوت اکثر لگ جاتی ہے۔ پس ان
ایام میں بچہ نکو ہرگز باہر نہ نکالیں اور انکی بڑی جزداری کریں +
بہ نسبت ملائم ہونے جلد کے بچہ نکو جلد کی بیماریاں اکثر ہو جاتی ہیں
اور تب اونکا معدہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ بعض اُنہیں سے ایسی ہیں کہ جن کا
بیدا ہونا بچہ کو معینڈ پڑتا ہے مثلاً وحی کہ جو دماغ کی بیماری یا امراض شکم
کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں یا ایام دانت نکلنے میں ظاہر ہوتی ہیں عرض
انکو جلد خشک نہ کرنا چاہے پر عموماً یہی قاعدہ ہے کہ ان بیماریوں کے
بہت روز تک رہنے سے بچہ کی صحت بگڑ جاتی ہے اور وہ لاغر ہو جاتا
اور شکم کی بیماری اوسکو ہو جاتی ہے انہیں سے چند بیماریاں ایسی
ہیں کہ وحی خاص کر نہایت تھو بچہ ہی کو ہو اگر قی ہیں اور بعض زیادہ

وہ سبب ہونی روشنی اور تازہ ہوا کی بیٹھ بڑتا ہے اور ان دونوں اشیاء
 کی ہوشیاری جتنی امراض بائی ہین دی ہی شدت سے پہل بڑتی ہیں +
 نہ ہی بچ نکو ہی امراض متعدی کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ اس بات میں لوگوں کو
 شک ہی پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچہ ما کے پیٹ ہی سے چپک میں مبتلا ہو کر پیدا
 ہوا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ نہایت نہی بچے بھی ان امراض متعدی
 میں مبتلا ہو سکتے ہیں اگرچہ قبل از نکلنے دانت کے ایسا کم ہوا کرتا ہے +
 بچہ نکو جب بخار ہوتا ہے تو اکثر کسی اور مرض کی باعث ہوتا ہے مثلاً جب
 کوئی مرض انفلا میشن کا سر یا سینہ یا شکم میں ہوتا ہے تب اکثر بخار بھی
 ہو جاتا کرتا ہے اور خاص کر شکم کی بیماری میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے +
 ایک خاص مباحث کی بیماریاں ایسی ہیں جو خاص کر بچوں ہی کو ہوا کرتی ہیں
 مثلاً کھسار یعنی میزلس اور ہونگ کاف وغیرہ ان مرضوں کا یہ قاعدہ
 ہے کہ چند مدت تک رکھ رہے مفقود ہو جاتے ہیں اور یہ کہ ان امراض کے
 موجود ہونے میں کوئی اور مرض بھی پیدا ہو جاتا ہے مثلاً جس بچہ کو
 میزلس ہوتا ہے تو اس کو زکام اور برانکائٹس بھی ہو جاتا ہے
 اور مرض اسکارلی۔ ٹینا میں شکم کی بیماریاں اور اس کے اخیر میں ماغ
 کا انفلا میشن ہو جاتا ہے اور چپک میں اگرچہ پردہ پورا میں دفعتاً۔
 انفلا میشن ہو جاتا ہے تاہم اس مرض میں شکم ہی کی بیماریاں زیادہ تر
 ہوا کرتی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امراض شرکی اکثر نہی بچوں میں
 زیادہ ہوا کرتی ہیں اور یہ کہ ان امراض چپک و کھسار وغیرہ کا یہ قاعدہ
 قاعدہ ہے کہ یہ خاص کر بچوں ہی کو ہوا کرتی ہیں اور اکثر مدت العمر میں
 ایسی مرتبہ ہوتی ہیں اور اگرچہ جو انون کو یہ بیماریاں کم ہوا کرتی ہیں

اپر پیدا ہوتا ہے کہ چہرہ ہیکا اور وی دیکے بڑھاتے ہیں اور بچہ اگر دفعتاً
 خوف کہا جاوے یا ڈر جاوے بہی اوسکو نقصان ہوتا ہے چنانچہ ہمیں
 ایسا بارنا دیکھا ہے کہ دفعتاً خوف کھانے کے باعث بچہ کو تشنج ہو گیا ہے
 بعض بیماری بچوں کی تو لدی ہوتی ہے مثلاً آتشک اور مرض مائید
 گفلس اور بعض مرض خاص کر فوراً بعد پیدائش کے پیدا ہوتی ہیں
 مثلاً - ہو - رولنٹ - افہال - میا - اور بعض بیماری کسی خاندان میں
 سوروئی ہوتی ہیں مثلاً مرض - کرپ - اور مائید و گفلس بقیہ عدی
 غذا یا کسی خراب چیز کا کھانا ایک بڑا باعث بچہ کی بیماری کا ہے -
 چنانچہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچہ ذرہ ہی کوئی شے نفیل کھا جائے
 تو فوراً اوسکو بد ہضمی ہو کر دست لگ جاتی ہیں اور یہ بات اکثر دودھ
 بڑائی کے وقت ہوا کرتی ہے اور زیادہ سردی یا رطوبت اور اختلاف
 آب و ہوا اگرچہ ہر عمر میں باعث مرض کا ہوا کرتا ہے تاہم بچوں میں
 ان باتوں کا اثر زیادہ تر نمایاں ہوتا ہے اور اس بات میں تعجب
 بھی نہ کرنا چاہئے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بچہ کو حرارت غریزی پیدا کرنے
 کی طاقت بہت کم ہوتی ہے اور اسلئے سردی کا اثر بد بھی اپر
 زود تر نمایاں ہوتا ہے اور خاص کر جس وقت بچہ سوتا ہے اوس وقت
 سردی اور رطوبت کا اثر اس پر زیادہ پیدا ہوتا ہے کسلئی کہ جس وقت
 بچہ سوتا ہے اوس وقت حرارت جسمی اس میں کم پیدا ہوتی ہے اور
 دوران خون کی تیزی بھی کم ہٹ جاتی ہے روشنی اور تازہ ہوا
 کا نہونا بھی سبب بیماری کا ہے چنانچہ اس طور سے اسکا مضمولہ - کی
 بیماری یا تو پیدا ہو جاتی ہے یا اوسکا مادہ جو پہلے سے موجود تھا -

یاد رکھنا چاہئے کہ ایسی بیماریاں جو خاصکے ٹھون کی کہلاتی ہیں بچپن میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اگرچہ اونکو نظامِ عصبی میں ادنیٰ بات کا اثر جلد پسند ہو جاتا ہے لیکن جب ٹھون کی بیماریاں بچوں کو ہوتی ہیں۔ تب اکثر ایسی قسم کی ہوتی ہیں جیسے تشنج کہ جس میں بچہ بیہوش ہو کر ماتہ اوپر مار مار کر لگتا ہے اور یہ تشنج اوس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب دماغ یا حرام مغز میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے یا جب وہ خرابی شکم میں ہوتی ہے تب سببِ شکت کی اوسکا اثر دماغ اور حرام مغز میں پہنچتا ہے۔

اوس وقت تشنج پیدا ہوتا ہے +

واضح ہو کہ تشنج ننھے بچوں کو ہوتا ہے یعنی پیدائش سے دو برس کی عمر تک کو طفلوں کو اور مرگی اور رعشہ جبکو انگریزی میں کو ریا بولتے ہیں دو برس سے آٹھ سال کی بچوں کو ہوتا ہے اور کو ریا خاصکر چوتھے یا پانچویں برس کے بچوں کو ہو جایا کرتا ہے لیکن ایسے ٹھونکی بیماری جیسے مہتر یا یعنی باؤگولا۔ یا مائی۔ پوکن۔ ڈرائی۔ سس۔ اس عمر میں نہیں ہو کرتا ہے اور رد نیوریلجیا بھی اس عمر میں نساذ ونا ہوتا ہے +

واضح ہو کہ فکر رنج اور غم کا اثر بچوں کے دماغ اور ٹھون پر اسقدر نمایاں نہیں ہوتا جقدر جو انون پر ہوا کرتا ہے کیلئے کہ بچوں کو تو آئندہ کا خیال ہوتا اور نہ وے گذشتہ تکلیفوں کو یاد رکھتے ہیں اور طبیعت انکی یکساں اور خوش رہتی ہے اور اپنی خیالات اور توانیات کا کچھ بھی اثر نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگرچہ یہ بات صحیح ہوتا ہم بعض دفعہ جب بچوں کو تعلیم اور تربیت کر لئے ناحق سختی کیجاتی ہے۔ تب اس سختی کا اثر

پیدا ہو جاتی ہے لیکن دماغ میں اکثر شرکی بو عث سی خراش پیدا ہوتی
 ہے مثلاً جب شکم میں یا پیٹھ میں مرض ہوتا ہی اور خاصکر اگر کہانی
 بھی نہایت شدت کی ہو جیسے ہونیک کاف میں تو دماغ میں نہایت جلد
 خراش پیدا ہو جاتی ہے اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہ نسبت امراض
 سینہ کو شکم کی بیمار یوں کا اثر دماغ پر زیادہ ہوتا ہے اور پیٹھ کے نسبت
 امراض دماغ کے شکم کی بیماریوں کا اثر پیٹھ پر زیادہ ہوتا ہے
 لیکن محدہ اور انٹریوں پر سب بیماریوں کا اثر بہت جلد پیدا ہوتا ہی
 واضح ہو کہ اکثر سچ کی بیماریاں انفلامیشن کے قسم کی ہو ا کرتی ہیں اور
 سچ میں انفلامیشن نہایت شدت سے ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون کا
 زور زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ بات باعث مرض کا نہیں ہوتی جیسے جوان
 میں ہو ا کرتی ہے۔ سچ اگر موٹا تازہ ہو تو اس کو تندرست کہیں گے
 اور ایسے سچے مرض میں کم مبتلا ہوتے ہیں بہ نسبت اونکی جو دہلی اور بلی
 اور نانہ و نعمت سے پہلے ہوئی ہوتی ہیں +

خاصکر بچوں میں یہ بات اکثر ہو ا کرتی ہے کہ مرض ایک مقام سے دوسرے
 مقام میں انتقال کر جاتا ہے چنانچہ اسبواسطی جب کوئی مرض جلدی
 مثلاً چیچک وغیرہ دب جاتا ہے تو عوام الناس خوف کہاتے ہیں -
 پس جلد کے انفلامیشن کو چاہیے اس میں سجا رہو یا نہو مثلاً چیچک
 یا خارش یا اور کوئی جلد کی بیماری کو دفعتاً روکنا نہ چاہئے کیونکہ
 اونکی دفعتاً رک جانے سے شکم یا پیٹھ یا دماغ میں بیماری پیدا ہو جا
 ہی ایسی صورت میں شکم اکثر مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن میزلس
 میں اکثر پیٹھ ہی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں +

مزمن ہو جاتا ہے تو پھر خطرہ جاتا رہتا ہے کیونکہ بچوں کی اعضا و سبب جلد بڑھنے کو
 حالت اصلی پر جلد مراحبت کر جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ بچوں کے پھیو ادنی سی
 بات میں متحرک ہو جاتے ہیں اور اوس باعث اکثر اعضا سے میں خراش
 پیدا ہوتی ہے غرض یہ ایک بڑا باعث بچوں کی بیماری کا ہے ادنی سبب سے
 بچوں کے کسی عضو میں خراش پیدا ہو سکتی ہے چاہے اوس سبب کا اثر خاص
 اوس عضو پر ہو کسی مقام پر ہو کہ اوس عضو پر اثر پیدا کرے اور یہ خراش
 شرکی تو بچوں میں اکثر پای جاتی ہے اور شدت بھی اسکی نہایت زور شور
 سے نمایاں ہوتی ہے بچے کی انٹری اور معدہ کی کسی مقام پر خاص بیوٹکا
 اثر جلد تر پیدا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی شے ثقیل بچہ کھا جاوے تو وہ ایک
 سبب مرض کا ایسا ہوتا ہے کہ جبکا اثر خاص کر بچے کے معدہ پر پیدا ہو کر
 انواع و اقسام کی بیماری پیدا کر دیتا ہے اور یہ بیماریاں نہایت شدید
 ہو جاتی ہیں خاص کر اگر انکا اثر شرکی دماغ پر بھی پیدا ہو جاوے جب
 اثر سردی کا خاص کر پیٹرون پر پیدا ہوتا ہے تب اون اعضا میں خراش
 پیدا ہوتی ہے لیکن پیٹرون میں اکثر شرکی سبب خراش زیادہ تر پیدا
 ہو جا یا کرتی ہے مثلاً جب شکم یا دماغ میں بیماری ہوتی ہے تو پیٹرون
 بھی سبب شرکت کو اکثر مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں +

حالت اول میں جو کہا نسی ہوتی ہے وہ اکثر دیر پا اور شدید ہوتی ہے
 اور جب دماغ یا شکم کی مرض میں پیٹرون سبب شرکت کو ماروٹ ہو جا
 میں اور اوس وقت جو کہا نسی پیدا ہوتی ہے وہ تشنجی کہا نسی ہو کرتی
 ہے دماغ میں کسی خاص سبب کا اثر کم پیدا ہوتا ہے اگرچہ بعض دفعہ
 سبب تمازت آفتاب یا رنج و غم سے اوس عضو میں بھی خراش

ہین اور ادنیٰ سبب سے متحرک ہو جاتی ہیں تو کمکواسبات کا سبب دریا بہت
 کہ اونکو بیماری کیونکر اسقدر جلد ہو جاتی ہے مثلاً دانت نکلنے کے ایام میں
 چونکہ دماغ اور انٹریون کا میوکس ممبرین جلد بڑھتی لگتا ہے اور اوس
 میوکس ممبرین میں جو گلیٹیان ہوتی ہیں وہی بھی اوس ایام میں جلد جلد
 پیدا ہونی لگتے ہیں اسلئے اوس ایام میں دماغ اور ہڈی مرض میں مبتلا
 ہونے کے لئے زیادہ تر مایل رہتی ہیں اور انٹری کے میوکس ممبرین کا
 بھی علیٰ ہذا القیاس یہی حال ہوتا ہے کہ اوس ایام کی اندر کسی حنفیف
 سبب سے بھی بچہ کو دست لگ جاتے ہیں حکیم کو چاہئے کہ ان باتوں کو
 یاد رکھتا کہ بچہ کے دانت نکلنے وقت وہ اون اعضا کے حال سے واقف
 رہے اور عوام الناس کے طور پر ایسا خیال نہ کرے کہ جو بیماری بچہ کو اس
 عمر میں ہو جاتی ہے وہ دانت نکلنے کے باعث سے ہی پیدا ہوتی ہے
 نہیں اوسکو یہ جاننا چاہئے کہ دانت نکلنے کا کچھ قصور نہیں ہے بلکہ
 دانت نکلنے کی عمر میں جو مختلف اعضا جلد جلد بڑھتی لگتے ہیں اوس باعث
 ادنیٰ سبب اونکو افعال میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ
 اگرچہ بچوں کے اعضا کی جلد بڑھتی ہے اونکی طبیعت بیماری کی طرف
 زیادہ تر مایل ہوتی ہے تاہم یہ جلد بڑھنا اعضا کا اونکی لئے مفید
 بھی پڑتا ہے کیونکہ جب شدید درجہ اون بیماریوں کا رفع ہو جاتا ہے
 تو جلد نقصان اوس بیماری کے باعث اعضا میں پہنچتا ہے وہ نقصان
 بہ سبب جلد بڑھتی اعضا کے آسانی سے پورا ہو جاتا ہے کہ جو بات
 اسقدر آسانی سے جو انون میں نہیں ہونی پاتی ہے۔ پس بچوں کو مرض
 اکثر مہلک ہو اگر تاہی اور جب شدت اوسکی رفع ہو جاتی ہے اور مرض

حصہ سوم

امراض صبیان متعلقہ طبیب

قبل از بیان امراض مختلفہ صبیان یہ بیان کرنا ضرور ہے کہ بچوں کی بیماریوں کے پیدا ہونے کے اسباب اور ان کی تشخیص اور انجام نیک و کی بیشین گوئی کا طریقہ کیا ہے چنانچہ

اول بچہ کی بیماریوں کی اسباب

حب ہمہ بن باتو نگا خیال کرتے ہیں کہ بچہ بن میں جسم کے ساری افعال کس قدر تیز و تند ہوتی ہیں اور خاص کر بھوکہ کیسی اونے باعث سے متحرک ہو جاتے ہیں اور یہ کہ بچوں میں خون کی رگیں اور خاص کر باریک رگیں کس قدر کثرت سے پہلی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ کہو تعجب نہ کرنا چاہئے کہ ان کی طبیعت مرض میں دفعتاً مبتلا ہونے کے لئے کیوں ہمیشہ مایل رہتی ہے اور ان کی بیماری کیونکر جلد بڑھ کر مہلک ہو جاتی ہے اور علاوہ اس تیزی افعال ہر عضو جسم کے جو نشو و نما کے لئے نہایت ضرور ہے جب ہم ہاتھ کو بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ کے خد خاص غصوبہ نسبت اور اعضا کے جلد تیز تر

حقنہ کر فیسر خطرہ ہے۔ چار آنوس عرق ایک ننھو بچہ کے لئو کافی ہے اور
بعد ۵ برس کی عمر کے چہہ آنوس سے زیادہ نہ چاہئے اور عہد طفولیت
یعنی آٹھ برس کی عمر تک آٹھ آنوس سے زیادہ عرق کی ضرورت نہیں
پڑتی یہ نسخہ حقنہ کا بہت عمدہ ہے +

نسخہ

ڈیکا کٹم۔ مار۔ ڈیای یعنی آتش جو _____ ۵۔ آنوس
کہا نیکنامک _____ ۳۔ ڈرام

الیو ایل یعنی روغن جلبانی _____ ۵۔ ڈرام
سبکو ملا لین۔ اور اگر شکم میں بہت ریح ہو تو اسمین ایک یا دو ڈرام
اسپرٹس۔ اف۔ رٹرین ڈائٹین۔ بھی ملا سکتے ہیں +
و آضع ہو کہ بچاری کی نلی کو اگر احتیاط سے انٹریون کے اندر کسی قدر
دور تک پہنچایا جاوے تاکہ اسکے اندر سے ریح نکلتی رہی تو بچہ کو بہت
افاقہ ہوتا ہے کیونکہ ریح کے جمع ہو فیسر بعض دفعہ بچہ کا دم بند ہو جاتا ہو
اور ریح کو اخراج کرنے کی نہایت عمدہ ترکیب یہ بھی ہے کہ بعد حقنہ کرنی
کے بچاری کی نلی کو مقعد کے اندر رہنویں +

دوسرا حصہ ختم ہوا

ہو سکتی ہے پس سیوسطو اس دو کو شدت کی قبض اور شکم کے کرم نکالنے کے
لئے دیا کرتے ہیں۔ سب سے نہایت سریع الاثر اور ملکہ جلاب کا نسخہ یہ ہے +

نسخہ

روبرب پاؤڈر _____ ۱۰۔ گرین

اسکا موئی پاؤڈر _____ ۱۰۔ گرین

سلفٹ اف پوٹاش کی قلمیں _____ ۱۰۔ گرین

ان سب کو خوب باریک پیسکر ملا کر تباہ اوں سفوف میں ارومانک پاؤڈر

۵ گرین ملا دیں +

خوراک اسکی تین گرین سے ۶۔ گرین تک تین تین گھنٹہ بعد جب تک

دست نہ آویں +

حقنہ۔ اسکو عربی میں عمل بھی کہتے ہیں۔ اور انگریزی میں پیر۔ گو۔ ٹیو۔

اینا۔ بولتے ہیں جب شدت سے قبض ہو جاوے تب حقنہ کی ضرورت پڑتی

ہی لیکن بچہ کو حقنہ کرنے میں احتیاط درکار ہے کیلئے کہ نادان آدمی جب

حقنہ کرتی ہیں تو اکثر اذ کو ضرب شدید پہنچاتا ہے +

ترکیب حقنہ کریںچی یہ ہے کہ بچہ کو پیار کرتے جاوین تاکہ وہ روئے

اور حرکت کرے نہ پاوے بعد ازان حقنہ کی نلی کو آستہ آستہ نہایت

احتیاط سے اکتھبائیں طرف کو داخل کریں اور تباہ اوکے دستہ کو آستہ

اور بتدریج ٹھیلے تاکہ انٹریوں کے اندر حقنہ کا عرق تھوڑا تھوڑا پہنچے

بچہ کی انٹریاں یہ آسانی پھیل جاتی ہیں اور حقنہ کے عرق سے وہ زیادہ

تھن جاوین تو پھر سکڑتی نہیں ہیں اور بچہ جلد چھوٹا ہوتا ہے

یہ بات بھی زیادہ ہوتی ہے پس زیادہ عرق کے داخل کر فیہ بار بار

بسو ملا کر ہمراہ شکر کر پیکر کھلا یا جاوے تو اسکا بد ذائقہ دور ہو جاتا ہے
 جلب کا اکثر اکٹ بچون کے لئے بہتر ہے کیونکہ عمل اسکا ہلکا ہوتا ہے۔ جلب کی
 ہمراہ کسی اور مسہل کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اسکو۔ اپنی۔ کے کوانا۔ کے ہمراہ
 اگر دیا جاوے تو بہتر ہے اور خاص کر جلب اور اپنی۔ کے۔ کیوانا کا جلب
 سینہ کے افضل امین کی بیماریوں میں بہت مفید پڑتا ہے اور جلب کے ہمراہ
 اگر کیا تو مل ملا یا جاوے تو عمل اسکا تیز ہو جاتا ہے اور جو دشت تیلے لازمی منظور
 ہوں اور اس ترکیب سے متفقہ جاری رکھنا مطلوب ہو تو جلب کو کسی مکین
 جلب کر ساتھ دیا کرتے ہیں مثلاً فارا۔ کو پیا کا کپا وڈ پاڈراف جلب حبین
 اسڈٹارٹارٹریٹ اف پوٹاش۔ پٹا ہی ایک عمدہ مرکب بچون کی مرضی کو
 لئے ہے خاص کر اگر استفا بھی موجود ہو اور جب یہ مطلب ہو کہ تیلے دست
 پہی اوین اور انٹروین کو خوب تحریک ہو یا قبض رفع ہو یا دماغ کا عالم
 ہو جاوے تو اوصورت میں جلب کو ہمراہ اسکا مونی کے دینا چاہیے +
 اسکا مونی۔ یعنی سقمونیا۔ یہ ایک نہایت تیز جلب ہے لیکن اسکی کہانی
 مروڑی لگ جاتی ہیں اور انٹروین کے میو کس ممبرین کو خراش ہوتی
 ہے جس اسکے استعمال میں احتیاط درکار ہے۔ اگر اسکو بطور سفوف کے
 دینا منظور ہو تو اسکو خوب باریک پیکر کسی خوشبودار سفوف کے
 ساتھ ملا کر استعمال کریں۔ لیکن اسکا مونی۔ اگرچہ بعض دفعہ بچوں کو موافق
 نہیں پڑتا تاہم اونکی بیماریوں میں اکثر اوقات اسکے استعمال کرنے کی
 ضرورت پڑتی ہے خاص کر اسوقت کہ جب نہایت شدت سے قبض ہو جاوے
 یا امعاء کے اندر اجتمع میو کس رطوبت کا کثرت سے ہو کہ جس باعث دیگر
 سہلات کا اثر ادسہر اچھی طور پر نہ ہو سکے غرض بات اسکا مونی سے رفع

وہ نکل جاتی ہے اور تب قبض ہو جاتا ہے اور یہ دوا ملکا سہل بھی ہے کہ جس سبب سے اسکو نہایت ننھو بچو نکو بھی دی سکتے ہیں چنانچہ دو دھیتے بارہ مہینہ کی تک کی بچہ کو تین گرین سے ۶ - گرین تک دی سکتے ہیں اور اس سے زیادہ عمر کے بچہ کو ۱۰ - گرین سے ۲۰ - گرین تک دیا جاسکتا ہے لیکن اسکے ہمراہ اگر گھنی شیا ملا یا جاوے تو عمل اسکا زود تر ہوتا ہے چنانچہ یہ نسخہ مجرب ہے +

نسخہ

روبرب سفوف _____ ۳ - گرین
گھنی شیا _____ ۴ - گرین
کپاوند - اسپرٹ - اف - ایمونیا _____ ۲ - بوند
ڈل واٹر _____ ۲ - آنوس
سرب _____ ۲ - ڈرام

سبکو ملا کر مقدار ایک چمچہ چائے کے دود یا تین تین گھنٹہ بعد بلا دین جب تک دست شروع نہوں +

تذکرہ - اگرچہ یہ دوا تیز سہل ہے ہر اسکے عمل پر زیادہ اعتبار نہیں کیا جاسکتا ہے اور جب کوئی خرابی جگر یا معدہ میں ہو تو یہ موافق نہیں آتا اور اسکے کہانی سے قی ہوتی ہے اور مروڑی لگ جاتی ہیں لیکن چونکہ اسکا اثر ساری بچ کے حصہ اثر لویہ نہر یہ ہوتا ہے کہ اونکی حرکت اصلی زیادہ ہوتی ہے اور اوسنی سیرم خوب ہوتا ہے اسلئے بچوں کی ان مرضوں میں یہ جلاب مفید پڑتا ہے کہ جو سبب متلا یا زیادہ خورش کے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اسنی شکم کا تنقیہ نام ہو جاتا ہے - جب کی جڑ اگر بیہونی جاوے تو اس سے قے اور ورد قوی لچ کم ہوتا ہے اور اگر اسمین خند قشری روغن

انٹریون پر ہوتا ہے اور صرف اسکے تنہا استعمال کرینسی بھی مرڈر انہین ہوتا
 بلکہ جب اسکو کسی اور مسہل کے ساتھ مثلاً اسکا مو-نی- اور سٹاکر ملا کر دیا
 جاتا ہے تو اونکی مرڈر ابید کرنے والی خاصیت کو زایل کر دیتا ہے +
 خوراک ان نمکین مسہلات کی ہے - گرین سے ہے - گرین تک دو دویا
 تین تین گھنٹہ بعد جب تک عمل نہو تب تک کھلاتے جاوین +
 روشل سالٹ - ایک تیز جلاب ہی اسکی اسکو صرف بڑی لڑکون ہی کو
 کھلایا کرتے ہیں اور اسکو اکثر ایفوزن اف - سنا - کو ہمراہ بلایا کرتے
 ہیں اور خجرا اور انفلا تین کی بیماریون میں جب کوئی تیز - سی - ڈی - ٹیو
 یعنی سست کر نیوالی دوا کا استعمال منظور ہو تو اکثر اسی نمک کو ہمراہ ٹارٹار
 امٹک کو ملا کر دیا کرتے ہیں +

سلفٹ - اف - مگنی - شیا + اوس وقت مفید پڑتا ہے کہ جب معدہ میں
 خراش یا شکم میں قولنج کا درد موجود ہو اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ معدہ
 فرج جب کسی قسم کے جلاب کو قبول نہیں کیا ہے تب اس نمک کو ہمراہ بودینہ
 کو حینا ندہ کے پلانچ سے دست آگے ہیں - اس میں اگر لمبو کا چمکایا - باجی
 ٹارٹریٹ اف پوٹاش - ملا دیا جاوے تو اسکا بد ذائقہ دور ہو جاتا ہے +
 روبرب یعنی ریونڈ چینی یہ دوا مقوی اور قابض اور ملین ہے اور قابض
 اور ملین فائدہ اسکے خوراک پر موقوف ہے چنانچہ جب اس دوا کو تھوڑے
 مقدار میں دیا جاتا ہے تب اسے قبض ہوتا ہے اور جب زیادہ مقدار میں
 کھلایا جاتا ہے تو پہلے دست آتی ہیں اور تب قبض ہوتا ہے پس اسکو
 اس دوا کو خاص کر بچوں کی ملکی قسم کے اسہال میں دیتی ہیں کیونکہ اسکے
 کھانے سے پہلے دست آتی ہیں کہ جبکہ ہمراہ اگر شکم میں کوئی شے فاسد ہو

گٹرک جو س - کو ساتھ ملکر جم جاتا ہے اور بدون اسکے وہ مبہم نہیں ہوتا
پس دودھ کا جتنا صحت میں داخل ہے اور مرض میں نہیں +

نملکین سہلات - اس قسم کے قبضے جلاب میں دی سجون کو بخارا و الفلاش
کی بیماریوں میں خاصکر معینہ ہوتی ہیں اور انکی کہانی سے تنفیہ تام ہو جاتا ہے
اور ان جلابوں میں سے سجون کے خاصکر ٹار - ٹریٹ - اف - پوٹاش -
اور سلفٹ - اف - گنی - شیا - نہایت فایده مند ہیں اور ٹار - ٹریٹ - اف
سوڈا - اور سلفٹ - اف - پوٹاش کو بھی بعض دفعہ استعمال کرتے ہیں
مگر سلفٹ اف سوڈا کو بہت کم یا بالکل نہیں دیا کرتے کیونکہ کہانی سے
انٹریوں کے میوکس ممبرین میں خراش پیدا ہوتی ہے اور پانی کے طور پر
بتلہ دست آتے ہیں مگر کوئی سہ نہین نکلتا یا درکہنا جاسکتا کہ اون
نملکوں میں سے جسکا استعمال کریں او سکو خوب بتلا کر کے کھلا دیں تاکہ
میوکس ممبرین میں خراش پیدا نہو اور دست بھی کھلے اور آوین اور دستوں کو
کھلے آنے کے لئے تیر تیر یہی کہ تھوڑے عرصہ بعد پنی نمک کے سچہ کو
کوئی عرق بلاوین اور اس نمک کو آتش جو یا آب یخنی کے ساتھ گرم
بلاوین +

فاس - اف - سوڈا - اس دوا کا ذائقہ چونکہ بعینہ کہانی کے نمک کو
طو - پر ہی ہوتا اسکو آب یخنی کے ہمراہ بلانے سے سچہ اسبات کو بالکل معلوم
نہین کر سکتا ہی کہ میں دوا پیا ہوں - یہ جلابیخہ نازک اور چڑچڑانج
کے لئے نہایت معینہ ہے لیکن ٹار ٹریٹ - اف - پوٹاش سجون کے بخارا
اور الفلاش کی بیماریوں کے لئے ایک نہایت ہلکا اور معینہ جلاب ہے
اور اسی دوا کو حکماء اکثر بہتہ کرتے ہیں کیونکہ عمل اسکا جلد اور ساری

کو بلا تری جاوین +

گنئی شیا۔ چونکہ یہ دوا ایک ہلکا سہل اور خوش ترشی اور سی۔ ڈمی۔ ٹیوہی
اسلمی اسکو بچو نکو اکثر دیا کرتے ہیں۔ جب شکم میں ترشی زیادہ ہوتی ہے
تو اس سے دست فوراً آجاتی ہیں اور جب شکم کی خرابی سے تینج ہو جاتا
ہے تب اسکا جلاب فائدہ۔ سی۔ ڈمی۔ ٹیوہی۔ کا بھی کرنا ہے۔ جب یہ دوا
جو انون کو ایک عرصہ تک کھلائی جاتی ہے تو شکم کی اندر جم کر کھٹکا بن
جاتا ہے لیکن بچوں میں اس بات کا اندیشہ نہیں ہے نہایت سہل ترکیب
اس دوا کے کھلانے کی یہ ہے کہ اگر شکم کے اندر ترشی بائی جاوے اور بچہ
کو قبض ہو تو اسکی غذا کی ساتھ گنئی شیا ملا دین اور یہ بھی ترکیب
ہے کہ بچہ کی رات کی غذا کی ہمراہ گنئی شیا۔ ملا دین تاکہ صبح کی وقت اسکو
دست آجائے۔ گنئی شیا کو اکثر ہمراہ دیگر سہلات کی دیا کرتے ہیں
اور جب یہ دوا شربت گلاب یا شیر حنٹ کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔
جیسا کہ نسخہ جات بالامین مرقوم ہے تب یہ نہایت سہل ہوتا ہے +
خوراک اسکی مختلف ہے چنانچہ ننھے بچوں سے لیکر دو یا تین برس کے
عمر تک چند گریں سے ۱۰ گریں تک دی سکتے ہیں اور بعد اس عمر کے
آدھا ڈرامہ دن میں دو یا تین دفعہ کھلانا چاہئے +

اس جگہ پر کہو یہ بات جملانی پر ضرور ہے کہ بچہ جب بائی کا دودھ پی
کر دیتا ہے تو وہ دودھ ہمیشہ جا ہوا نکلتا ہے بچہ کی والدہ اس سے
یہ قیاس کرتی ہے کہ بچہ کے معدہ میں ترشی کا بڑا غلبہ ہے اور بانجیال
اس ترشی کے رفع کرنے کے لئے بچہ کو وہ گنیشا بار بار کھلاتی ہے مگر یہ بات
نہایت مضر ہے کیونکہ دودھ جب معدہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو

اس دوا کے تنہا کہلائی ہو اگر تا ہے یا شیر خشت کو کسی اور ملین دوا کے ساتھ استعمال کریں تاکہ اسکے عمل میں خطا نہ ہو۔ شیر خشت کا فائدہ کسی مزلوق یعنی ڈیاسنٹ اور مدر یعنی ڈائیو۔ رٹیک بھی بتلاتی ہیں۔
 بس اسکو ہمراہ کسی ملین عرق کے ملا کر بچونکو زکام اور بخار میں دے سکتے ہیں جنانچہ یہ دوا نسخہ شیر خشت کے عرق کے مجرب ہیں +
 نسخہ

نہایت اچھی شیر خشت _____ ۳۴ ڈرام
 میو۔ سی۔ لچ _____ ۳۴ ڈرام
 شربت بنفشہ _____ ۲۔ ڈرام
 سبکو خوبطرح ملا کر جہان ڈالین۔ اور بت او سمین ایک آنوس۔ پی۔
 ہر۔ منٹ۔ واٹر۔ ملا کر بمقدار ایک یا دو ڈرام کے جب تک عمل نگرہ تین
 تین گھنٹہ بعد پلاوین +
 نسخہ

الفیوژن۔ اف۔ سنا _____ ایک آنوس
 پی۔ ہر۔ منٹ۔ واٹر _____ ۳۴ ڈرام
 شیر خشت _____ ۲ ڈرام
 سب کو خوبطرح ملا کر جہان ڈالین اور بت او سمین ان چیزوں کو ملا لیں +
 گمنی۔ شیا _____ ۲۔ گرہین
 ٹینکچر۔ اف۔ روبرب _____ ۱۔ ڈرام
 سرپ۔ اف۔ روز _____ ۲ ڈرام
 اس عرق کو بمقدار ایک یا دو ڈرام کے جب تک عمل نہو بعد تین تین گھنٹہ

شریت سنا بھی بچوں کے لئے ہلکے جلاب مین +

کسٹرائیل کے پلائی سے دست کھلکرا جاتے ہیں اور شکم صاف ہو جاتا ہے۔ پس اسی واسطے اوس جلاب کو اوس حالت میں دیا کرتے ہیں کہ جب انٹروین کے اندر کوئی شے مضر موجود ہو مثلاً ہرانے سیدی یا بچہ کوئی شے نگل گیا ہو یا کسٹرائیل کو اوس وقت دیتی ہیں کہ جب کیا لول یا اسکامونی وغیرہ جلاب سے دست نہ آئی ہوں اور کسٹرائیل کو ابتدا اسہال میں اس واسطے بھی دیتی ہیں کہ جب یہ مرض بسبب خراب غذا یا اسٹلاسی پیدا ہوتا ہے اور اسہال کے بیچ میں بھی پلا یا کرتے ہیں اگر شکم کے اندر موجودگی سدون کی بائی جادوی +

بچہ کی عمر چھنے سال کی ہو اتنی ہی ڈرام اسکو کسٹرائیل پلاوین +

دانت نکلنے کو ایام میں اگر باخانہ قبض ہو جاوے تو اوسکے رفع کرنے کو لئی کسٹرائیل ایک سفید دوا ہے + یہ نسخہ نہایت مجرب ہے +

نسخہ

کسٹرائیل	_____	ایک آنوس
کھسائیڈ گنی شیا	_____	۲- ڈرام
مصری	_____	۳ ڈرام
روغن سولف	_____	۲- بوند

سب کو خوب طرح ملا کر مقدار ایک یا دو چمچہ جائے گی پلاوین اور جو ضرورت ہو تو ایسی خوراک کو بہرہ دو بارہ پلاوین +

شیر خشت یعنی می - نا - یہ دوا بسبب ہونی شیرین کی بچہ کو اکثر کھلائی جاتی ہے۔ نہایت اچھی شیر خشت کا استعمال کرنا چاہئے اور مقدار آدھی یا ایک یا دو ڈرام کو ہمراہ کسی خوشبودار عرق کے پلاوین تاکہ نفخ یا مروڑ پیدا نہ ہو جو

پانی میں آدھی ڈرام سے دو ڈرام تک آمبو ڈا کیڈہ - اف - بوٹا سیم ملا لیں +

مہلات یعنی جلاب

بچوں کو جلاب کی حاجت اکثر ہوا کرتی ہے لیکن اونکو ہمیشہ جلاب دینا بھی مضہر اور اگر غذا کی احتیاط کی جاوے تو جلاب کی احتیاج کم پڑتی ہے اور جو کس قدر احتیاج ہو بھی تو وہ صرف آب گرم کے حقنہ یا بطور شیانہ کی کپڑی کی بتی داخل کرنے سے رفع ہو سکتی ہے۔ بچوں کو جب قبض ہو جاتا ہے یا اونکی رطوبات بگڑ جاتی ہیں تو اکثر اونکی صحت بھی بگڑ جاتی ہے اور بعض اوقات نہایت شدت سے بیمار پڑ جاتی ہیں کیونکہ شکم میں ترشی اور نفخ ہو جاتا ہے اور یا تو مروڑا یا دست لگ جاتی ہیں یا خانہ قبض ہو جاتا ہے اور معدہ بگڑ جاتا ہے بخار کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں نیند خراب ہو جاتی ہے اور دماغ غیر خلل ہو کر اکثر تشنج ہو جایا کرتا ہے۔ اس حالت میں اگر دانائی سے کوئی جلاب دیا جاوے تو دوسری علامتیں رفع ہو سکتی ہیں اسی واسطے بچوں میں جلاب اکثر مفید پڑتا ہے لیکن یاد رہے کہ نادانیشی جلاب کو دینے سے بھی بے علامتیں پیدا ہو سکتی ہیں +

بچوں کو جب جلاب دیتی ہیں تو پہلا مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ قبض رفع ہو جاوے پس نہ بچوں میں اس مطلب کے حاصل کرنے کے لئے نہایت ملکی تدبیر و نکا استعمال کرنا چاہئے چنانچہ ایک ڈرام کسٹریل مہراہ شکر یا کسی خوشبودار عرق کے ساتھ ملا کر بلا دین اور شربت بنفشہ اگر اچھا اور نازم بنا ہو تو اس کے ایک ڈرام دو ڈرام تک بلانی سے بھی دست آجاتی ہیں یا اس شربت کو کسٹریل کے ساتھ ملا کر بلا دین اور شربت گلاب اور

بعد از ان کسی قدر لرزہ ہوتا ہے اور جو غوطہ دفعتاً دیا جاوے نوں دوسرے سیم
بر ایک صدمہ پہنچتا ہے اور فوراً بعد اس صدمہ کی سردی رفع ہو کر گرمی معلوم
ہوئی لگتی ہے کہ جو جلد ساری جسم میں پھیل پڑتی ہے اور اس وقت اگر حمام سے
نکل کر سچے کپڑے پہن لے تو طبیعت اوستی نہایت خوش ہو جاتی ہے۔ نہایت
چھوٹی بچوں کو آب سرد سے غسل نہ کرانا چاہیو +

می۔ ڈی۔ کی۔ ٹڈ۔ باتہ۔ یعنی غسل ادویہ جسکو عربی اصطلاح میں نقول کہتے ہیں
جلد کی بیماریوں میں اکثر مفید پڑتا ہے۔ چھوٹی بچوں کے لئی بانی میں صرف
صابون کھول کر نہلانا کافی ہے لیکن بڑے لڑکوں کو لئی تیز تر نمکین جبین
جائین مثلاً کار۔ بو۔ نٹ۔ اف۔ پوٹاش۔ یا کاربونت۔ اف۔ سوڈا۔
چنانچہ پاؤں سے آدھ سیر صابون دو برس سے ۵۔ برس کی عمر کو سچے کی
نقویل کے لئے کافی ہے اور اگر سوڈا یا پوٹاش کا استعمال کریں تو
فی گیلن بانی میں تین ڈرام سے چھ ڈرام تک سوڈا یا پوٹاش لے لیں
اور گندک نک نقویل سب جلد کی امراض میں کرتے ہیں جبکہ سوڈا یا پوٹاش
کی نقویل سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اور خاصکر گندک کی نقویل سوراخی۔
سس اور لپیر اور پھون کی بیماریوں مثلاً کوریا میں بہت مفید پڑتی
ہے۔ اس قسم کی غسل میں سلفٹ اف پوٹاش کا استعمال اکثر کرتے
ہیں چنانچہ ایک گیلن میں آدھا ڈرام لیکن دوسری ترکیب اس غسل
کی یہ ہے کہ ایک بوتل کھولتے ہوئے بانی میں آدھی آنوس سے ایک آنوس
تک گندک کو ۱۰۔ گھنٹہ تک بکا کر غسل کے بانی میں ملا دیں +
آئیوڈین۔ کی نقویل۔ یہ غسل اسکیرا فیوکس مزاج کے بچوں اور اونکو
جو کسی شدید مرض جلدی میں مبتلا ہوں مفید پڑتا ہے چنانچہ فی گیلن

حام کرانیکے اسکے جسم کو خوبطرح پونجہ کر گرم کپڑے سے ڈٹانک دین کیونکہ
 اوس وقت سردی کا لگنا مضر ہے۔ ہاشوا ایک نہایت عمدہ ترکیب ہاتھ کی
 ہی جیسے۔ کاؤن۔ ٹر۔ اری۔ ٹی۔ شن۔ یعنی کس مقام کا مالہ ہوتا ہے
 اور سر کی امراض میں ہاشوا اکثر کراتے ہیں۔ کرانک انفلامیشن کی تائید
 خاصکر جلد اور شکم کے اور بعض قسم کے بخار میں آب گرم تفیل کی ضرورت پڑتی
 ہے اور چیچک و کہسر میں بھی خاصکر جب ان امراض میں تشنج ہو جاوے
 اور دانی لپچے طور پر نہ نکلین یا دوب جاوین تفیل آب گرم مفید پڑتی ہے
 اور شکم کی پرانی بیماریوں میں مثلاً کرانک۔ پی۔ ری۔ ٹو۔ نامی۔ ٹس۔
 اور کرانک انٹی۔ راسی۔ ٹس۔ اور بہت دنوں کو اسہال میں سچے نگوگٹون
 تک گرم حمام میں کہنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن اوس حمام کی گرمی
 اور اس کے اندر رہنے کی مدت کو سچے کی مرضی پر چوڑ دینا چاہئے۔ گرم
 حمام کی باب میں اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ کہ سچے کو بار بار حمام کروائیں
 اور اوس میں بہت دیر تک رہنے سے اونکو زکام ہو جا یا کرتا ہے پس
 حمام کو دینے میں بہت ہی احتیاط رکھیں۔

حام کرانیکا وقت۔ اگر کسی شدید مرض کو لئے حمام کرانا منظور ہو تو جس وقت
 ضرورت پڑے اس وقت کرانا چاہئے لیکن کبھی کبھی بیمار کی ضرورت پڑے تو پہلے اندازہ لگایا جائے کہ
 پتھر حمام کرانا چاہئے اس میں مطلب یہ ہے کہ فوراً بعد وہ پتھر کے سچے کو حمام
 نہ کرانا چاہئے اور نہ اوس وقت حمام کروائیں کہ جس وقت بعد کھیل کود
 کی یا سوتے سے اٹھ کر سچے کو پسینہ آتا ہو۔

کولڈ بانجھ یعنی آب سرد سے غسل کرانا۔ جب کسی سچے تندرست کو آب سرد میں
 دلا یا جاتا ہے تو ہم کفایت پیدا ہوتی ہیں کہ پہلے اسکو سردی معلوم ہے

خاکر سر پہ ہمیشہ سردی لگایا کرتے ہیں اور شکم پر آب گرم کی نمکد کیا کرتی ہیں تازی اور ٹہنڈی ہوا بھی ایک عمدہ بار دشنے پر غرض جب بچہ کسی انفلا میشن یا سنجار میں مبتلا ہو تو اسکو ایسی رکائیں نہ رکھنا چاہی جو بہت گرم ہو یا جسم میں بہت لوگوں کا مجمع ہو بلکہ بچہ کو ایسی جگہ میں رکھیں جہاں تازی ہوا کی آمد رفت ہو۔

تفصیل و حصول

بچہ کو آب گرم کا حمام اکثر کرتے ہیں تاکہ کسی مقام کی خراش یا درد رفع ہو چن آجاوے اور سنجار کی علامتیں رفع ہو جاویں۔ واضح ہو کہ بچہ کو حمام کو ہرگز زیادہ گرم نہونا چاہئے یعنی اسکی حرارت ۹۸ درجہ سے زیادہ نہونی چاہی۔ بلکہ عموماً ۹۶ درجہ ہی تک ہو تو بہتر ہے اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب جسم بہت گرم ہو اور اس گرمی کو رفع کرنا اور نبض کو گھٹانا منظور ہو تاکہ درد اور تشنج رفع ہو جاویں تو ۹۴ درجہ گرم کا حمام اکثر مفید پڑتا ہے۔ یاد رکھنا چاہی کہ شدید انفلا میشن کی بیماریوں میں گرم حمام بالکل ممنوع ہے کیونکہ اسکے کر نیسے دم لینی میں تکلیف اور دوران خون اس قدر تیز ہو جاتا ہے کہ وہ بیماری خالص اگر پہلے ہی میں ہو تو بڑھ جاتی ہے لیکن جب کوئی بیماری انفلا میشن کی شکم کے اندر ہو تو ٹاٹ باہر یعنی گرم حمام کے کر نیسے جذبان مضائقہ نہیں لیکن تاہم اس قاعدہ کو یاد رکھیں کہ علی العموم شدید مرضوں میں کسی خاص مقام جسم پر ہاتھ کو محسوس نہ کرنا چاہی۔

اگر حمام بہت گرم نہو تو بچہ کو اس میں ۱۰ یا ۱۵ منٹ تک رکھ سکتے ہیں اور بعد

بگڑ جاوی تو اسکو موقوف کرنا چاہی یا ہمراہ قدری افیون کے کھلانا چاہی۔
 بوند سے ۱۰۔ بوند تک دینین مین یا چار مرتبہ ناٹیک ایٹر کر کھلانی سے بونگی
 بیماری کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔

ادویات بارد

ان دواؤ کو انگریزی مین ریفری جرنٹ بولتی مین سرد پانی سب سے عمدہ سرد
 دوا ہے۔ سچے جب بخار مین مبتلا ہوتی مین۔ تب ہمیشہ انگلیس معلوم ہوتی ہے
 پس اس حالت مین سچے کو سرد پانی حقیقہ چاہی پلا سکتے مین۔ اگر عمدہ مین
 خراش موجود ہو تو اس صورت مین پانی کو برف سے ٹھنڈا کر کے پلانا
 چاہی۔ اس بات کو یاد رکھین کہ جب بجار سچے کو پیاس لگے تو بیشک اسکو سرد
 پانی پلانا چاہئے۔ سرد پانی پلائیے ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ سچے کو
 پسینہ آجاتا ہے اور پسینہ نہ آوی تو بدنگو سرد یا شیر گرم پانی سے بونچہ
 ڈالین۔ یا حمام کروا دیں۔ مگر ان باتوں کو کرنے مین احتیاط درکار ہے۔ جب
 کسی خاص مقام پر سردی لگانی منظور ہو تو اسطور سے لگا دی کہ وہ مقام
 ہمیشہ سرد رہی اور ایسی ترکیب سے لگا دی کہ سچے کو اس سردی سے کھپائی
 نہوجاوی کہ ایسا اکثر دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب سرد پانی لگایا گیا ہے
 تو سچے کا جسم سارا تر ہو گیا ہے اور اسکو شدت سے کھانسی ہو گئی ہے۔ تب
 ترکیب یہ ہے کہ بکری پاگائی کے شانہ مین برف کو ٹکڑے بہر کر سرد پانی
 پشت کی مڈی پر لگا دیں۔ اور مرض کنوٹشن یعنی سچے کو جب شینج ہو جاوی
 تو سرد پانی کا تار اچھوڑیں اور سینہ تک اسکو آب گرم مین پھیلادیں
 ان ترکیبوں سے جب سردی لگانی منظور ہو تو برابر کئی گھنٹے پاکئی
 دن جب تک سوزش اس مقام کی رفع نہوجاوی سردی لگانی چاہئے۔

تکلیف ہوتی ہے اور جب بخار نہیں رہتا ہے اس دوا کو اکثر تنہا نہیں کہلاتے
 اور جو تنہا کہلانا منظور ہو تو ہم بوند شربت اسکویل کا یا ۱۰ بوند اسٹیم سلی
 کا بعد تین تین گھنٹے کو کہلا سکتے ہیں۔ یا نہیں تو نسخہ جات مذکورہ بالا کے
 ساتھ اسکویل کہلاتی ہیں اسکویل کو کسی کہا رو ا کے ساتھ ملا کر سے
 اوسکی خدائش پیدا کر نیوالی تاثیر جاتی رہتی ہے اور اوسکی اسپیکٹورنٹ فائدہ
 تین کسی طرح نقصان نہیں ہوتا۔ پو۔ لی۔ گی۔ لا۔ سی۔ سکا۔ یہ دوا آہستہ
 تیز اسپیکٹورنٹ ہی پسکو اوس حالت میں کہلانا چاہی کہ جب علامات سفوف
 کی رفع ہو جاوین۔ اس دوا کے کہا میںی دست وقتی ہی آجاتی ہیں +

ادویات معرق

ان دواؤں کو انگریزی میں ڈایا فورٹیک بولتی ہیں۔ بچوں کو پسینہ لانیوالی دوا
 اسلئے کم دیا کرتی ہیں کہ انکو پسینہ بہت کم آیا کرتا ہے اور سر یا شکم کی بیماری
 جو ان مقاموں پر پسینہ آتا ہے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ
 نقصان ہو ا کرتا ہے۔ پس بچوں کو بخار میں جب جلد نہایت گرم ہو تو اوسکا تیز
 ادویات ریفری جرنٹ۔ یعنی سرد اور ادویات ڈائیورٹک یعنی مدد کا
 استعمال کرنا چاہی اور غسل سی ہی فائدہ ہوتا ہے نائٹر یعنی قلمی شورہ
 بچوں کے بخار میں نہایت فائدہ مند ہے اور اس دوا کو ساتھ ابی کیو انا
 کے کہلایا جاوے تو مفید پڑتا ہے چنانچہ چوتھائی یا آدھا گرین ابی کیو انا
 کا ہمراہ دویا چار یا چھ گرین شورہ کے تین تین گھنٹے بعد کہلا سکتے ہیں
 اس مرکب کو کہلا میںے بخار کی حرارت بہت جلد رفع ہو جاتی ہے اگر مرض
 بہت شدید ہو تو اس صورت میں بعض ابی کے کیو انا کی انٹی معر تیل
 باوڈر یا جمس باوڈر کا استعمال بہتر ہے۔ شورہ کو استعمال کرنے سے آگے

رگ جاتی ہے اور اسلئے کہ اس دوا ہی تو غور سے باوی اسکے ساتھ کاربونت
اف سوڈا یا کاربونت اف پوٹاش ساتھ قدری ایفون کے ملا دینا چاہیے
جہاںچہ نسخہ مرقومہ ذیل اسحاقین مفید پڑتا ہے اور ہونک کاف یا اور کوئی
تشخی کہاںسی میں بھی یہ نسخہ فائدہ مند ہو سکتا ہے +

نسخہ

صاف بانی _____ دیرہ آنوس

ابی کی۔ کیوانا۔ وائین _____ دیرہ ڈرام

بائی۔ کار۔ بونت۔ اف سوڈا _____ ۱۳۔ گرین

شیرہ _____ ۲۔ ڈرام

لاڈنم۔ _____ ۴۔ بوند

سبکو ملا کر بمقدار ایک یا دو ڈرام کی دودھ کنٹری بعد ملاوین جب ایکوٹ
افلامین کا علاج کرنا منظور ہو تو ٹارٹار امٹک سے کرنا چاہیے اگر اسکے کہانی
بچہ کمزور ہو جاوی تو اس میں با تو قدری کمفر مکسچر یا اسپرٹس اف لونڈریا
ٹینک اف سنی من ملا دی۔ لیکن اگر ساتھ اس کمزوری کی بہتری میں
بھی ہو اور رنگ بچہ کا قدری نیلا پڑ جاوی تو اس صورت میں ٹارٹار امٹک
کی ہمراہ قدری اور وٹنگ اسپرٹ اف ایمونیا ملا دینا چاہیے اگر سینہ کی بیماری
بہت شدید ہو تو قبضہ ٹارٹار امٹک استعمال کرنا چاہیے نیز تو صرٹ ٹارٹار امٹک کا کھلانا بھی فی ہر خاصہ
اگر بچہ کمزور ہو تو ہرگز قبضہ نہیں لے سکتی میں پس اس حالت میں صرف
ٹارٹار امٹک کھلانا چاہیے +

اسکوئل۔ اس دوا کو پرائی کہاںسی میں کھلاتی ہیں اور خاصہ اس وقت
دیتی ہیں کہ جب بلغم نہایت گاڑا ہو جائے اور اسکے نکالنے میں بجا کو

سبکو ملا کر مقدار ایک ڈرامہ کر دو دو گنٹھ بعد بلا دین یا اوس سے بھئی یادہ
 زیادہ عرصہ بعد بلا دین منہن نسخہ ذیل کی خواک کے درمیان بلا دین :
 نسخہ

ابی کے کیوانا _____ ۱۰۔ گرین
 کیا لول _____ ۱۰۔ گرین
 شکر _____ ۲۰۔ گرین

سبکو ملا کر مقدار ایک یا دو گرین کے ہر قسمی گنٹھ بعد کھلا دین۔ اس مرکب کی
 ایک گرین میں چوتھا گھی بھائی کے کیوانا اور چوتھا ہی گرین کیا لول سہی اور
 یہ خوراک ایک برس کے بچہ کے واسطے ہے اور بعد اوس عمر کے دو گرین تک
 دی سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو آدھا یا ایک گرین اوس میں دوسرے ڈرامہ
 بھی ملا سکتے ہیں سفر میں کیا لول کو اسی طور پر ابی کے کیوانا کے ساتھ آٹھ
 ملا دیتی ہیں۔ کہ جب علامات سوزش کی مود ہوں لیکن جب یہ بات نہ ہو تو۔
 کیا لول کے دینی سے اسلئے ضرر منصور ہے کہ اسلئے کہا میسر انٹریون میں خراش
 پیدا ہوتی ہے۔ پس جب انٹریون میں ذرہ بھی خراش بائی جاوی تو بارہ کا
 استعمال ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ ہمراہ پہنچے
 کی سوزش کے جب معدہ یا انٹریون میں بھی خراش رہتی ہے تو اوس
 حالت میں علاج کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس بات کی ہونیشی پہنچے کی
 سوزش بڑھ بھی جاسکتی ہے اس صورت میں ٹارٹار امک نہیں کھلا سکتی
 اور اگر بارہ کا استعمال کیا بھی جاوی تو نہایت کم مقدار میں اور ہمراہ افیون
 کے کھانا چاہئے لیکن اس حالت میں صرف ابی کے کیوانا کا استعمال کرنا بہتر ہے
 کہ اگر اس سے قوی نہ ہوئی تو اس کے کہانیسے انٹریون کی خراش

دافع ہو کہ جن دوا کے کہانی سرتے آتی ہے جب اذکو تھوڑی تھوڑی مقدار میں برابر کئی غور اک تک کھلایا جاتا ہے تو فائدہ اسپکٹوینٹ کا ہوتا ہے بلغم کے نکالنے کے لئے بچونکو اکثر اپی کے کیوانا کھلایا کرتی ہیں چنانچہ چوتھائی یا نصف گرین دھین مین یا چار مرتبہ کھلانے سے زکام اور کھانسی کو بعض دفعہ بالکل آرام آجاتا ہے لیکن شدید برانکائٹس کو صرف اپی کے کیوانا سی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بعد صند اور طار طار اسٹیک کی استعمال کے جب شدید علا متوں کو تخفیف ہو جاوی اور بہت سا بلغم نکلنے لگے تو اس صورت میں اپی کے کیوانا بہت مفید پڑتا ہے۔ اس دوا کو ہمراہ ٹارٹار میٹک بطور عرق کے پلا سکتے ہیں یا بطور سفوف کے ہمراہ کیا تول کے دی سکتے ہیں۔ اور کھانسی کی شدت کو رفع کرنے کے لئے اور اسلئے کہ سعدہ اپی کے کیوانا کو قبول کر لے ہمراہ اس دوا کے قدر سی افیون بطور لادوئم یا ڈورس پاڈور کے اکثر ملا دیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ اگر مقدار افیون کی زیادہ ہوگی تو اس سے نقصان ہوگا کسلئے کہ اس حالت میں زیادہ افیون کی کھانسی بلغم رک جاتا ہے اور کھانسی بھی رک رک کر آتی ہے جس سے بیمار کو دم لینی میں تکلیف ہوتی ہے +

نسخہ دافع بلغم

جلایا ہوا ابانی	_____	اک آنوس
میوسج	_____	آٹا آنوس
ابی کے کیوانا داین	_____	۲۔ ڈرام
شربت لمبو	_____	۱۔ ڈرام
شربت پوست	_____	۱۔ ڈرام

کہلانا چاہیے کہ جب معدہ یا انٹریون مین خراش موجود ہو اور ہر حالت میں
اس قاعدہ کے پابند رہیں کہ جب تک معدہ مین قدری بابی نہ پڑے جب تک
اس دو اکو نہ کہلانا چاہیے کیلئے کہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ خلو معدہ مین
اسکو کہلانیے سچہ کو نہ ہر ہو جاتا ہے پس قبل از کہلانی ٹارٹار اسٹک کو
سچہ کو دودہ یا بابی بلوانا چاہیے یہ دو نسخہ واسطی کہلانی ٹارٹار اسٹک کو
عمدہ مین +
نسخہ

ٹیکٹا یا ہوا بابی _____ دیرہ آؤس
ٹارٹار اسٹک _____ ایک گرین
شیرہ _____ آدھا آؤس

سکو ملائین - اس عرق کو ایک ڈرام مین ایک گرین کا سولہوان حصہ
ٹارٹار اسٹک ہی پس جب تک قی نہو اس عرق کو ایک مین یا مین ڈرام تک
پلاتے جاوین اور اسلئے کہ ٹارٹار اسٹک خطانہ کھا جاوے اگر اس نسخہ
مین آدھا آؤس ابی کے کیوانا وائین ملا دین تو بہتر ہے +

نسخہ

ٹیکٹا یا ہوا بابی _____ ایک آؤس
ابی کے کیوانا وائین _____ آدھا آؤس
سولہوشن اف ٹارٹار اسٹک _____ ۲ ڈرام
سرب اف اسکوئل _____ ۲ ڈرام

سکو ملا کر جب تک قی نہو ایک یا دو ڈرام پلاتی جاوین +

ادویات دافعہ بلغم

ان دو اکو انگریزی مین اسکو نکالنی ہیں

شکر مین ملا کر جب تک قی نہو باؤ باؤ گھنٹے بعد کھلاوین یا اسی طور سے
 اپنی کے کیواناوائین بمقدار ۲- یا ۳- بوند یا ایک ڈرامہ کی ملا سکتے ہیں
 جب سچ ایک سال کا ہو جاوی تو خوراک مذکورہ بالا دگنا تھوڑے
 تھوڑے عرصہ بعد کھلا سکتے ہیں۔ ماسوا مقوی فائدہ کر ابی کے کیوانا کر
 کہاٹیسے دست بند ہوتی ہیں اور پسینہ بھی آتا ہے بعد کھلا فی ابی کے کیوانا
 کے قی کی اعانت کر لئی اب گرم جلد نہ بلانا چاہئے کھلے کہ اوسکی ملاٹیسے
 پہلی ہی قے مین دوا نکل جاوے گی اور انجی معدہ کا امتلا جو نکالتیوں
 رہ جاوے گا بلکہ باقی اس وقت بلانا چاہی کہ جب ایک یا دو مرتبہ قے
 ہو جاوے یا سچی متلافی لگے جب سچ نکو ابی کے کیوانا سے قے کرانی منظور ہو
 تو نسخہ ذیل کے طور پر کھلاوین +

نسخہ

بانی _____ ایک آنوس
 ابی کے کیواناوائین _____ آدھا آنوس
 شیر _____ آدھا آنوس

سبکو ملا کر ایک یا دو ڈرامہ بلانی جاوین جب تک قی نہو ٹارٹار امٹک یہ
 دوائیز مقوی ہے لیکن بعض دفعہ اس سے قے نہیں بھی ہوتی ہے۔
 علاوہ ازین اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دوا کی کھاٹیسے یا تو پسینہ آتا
 ہی یا دست لگ جاتے ہیں۔ اسلئے سینہ کی شدید مراض سوزشی میں اس
 دوا کو بہتر جانتی ہیں۔ چھوٹی سچو نکو لئے ایک گرین کا سولہوان یا آٹھوان
 حصہ کافی ہے۔ لیکن جب اسکے کھاٹیسے سبب ہو جاوے تو اس
 حلقین اسکوٹیل یا ابی کے کیوانا بہتر ہے ٹارٹار امٹک کو اوسحالت میں

میں مبتلا ہو یا وہ عضو کسی غذا، ثقیل سے بھر ہو غرض اس حالت میں قری کی
 کروانے سے سب علامات فوراً رفع ہو جاتی ہیں چنانچہ اگر اس باعث سیجہ
 کو تشنج یا انگریز ہٹ ہو یا شکم میں باہی بہر جاوے یا درد ہو تو لگے یا سچے کو تے
 ہو یا قبض یا دست لگ جاوے تو یہ سب علامتیں مفعود ہو جاتی ہیں یا د
 رکھنا چاہئے کہ اسپہال کے اندر اگر علین ابتدا میں تے کرائی جاوے تو
 فائدہ ہو سکتا ہے نہ میں تو معدہ میں سوزش پیدا ہو کر مرض مذکور اور
 بھی بڑھ جاسکتا ہے۔ سچے نازک اور اسکرافیو لیس مزاج کو جنگلی اشتہا نہایت
 تیز ہو مگر طاقت ناقصہ بہت کم اگر گاہے گاہے کسی ہلکی مقوی دوا سے تے
 کرائی جاوے تو معدہ میں اکثر طاقت پیدا ہوتی ہے کسلے کہ اس ترکیب سے
 معدہ میں حقد ر خراب و رطوبات جمع رہتی ہیں وہی سب نکل جاتی ہیں
 علاوہ ازین سارے جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے کسلے کہ قری کے کرینسے قوائے
 دافنہ اور جاذبہ کو تحریک ہوتی ہے اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ
 جن سے مواد اسکرافیو لا تحلیل پا جاتا ہے سچے کو ہلکی دوا سے قری کرانی
 چاہئے چنانچہ اپنی کے کیوانا سب سے بہتر ہی ٹارٹار امٹیک بھی خوب
 دوا ہے لیکن بغیر کسی اچھے سبب کے اس دوا کو نہ کہلانا چاہیے گو سپر
 اف اسکوئیل سچے کو اکثر دیا کرتے ہیں اور یہ دوا سیرج التاثر بھی ہے
 مگر چونکہ اثر اسکا نہایت تیز ہوتا ہے اسلئے اس دوا کو نہ کہلانا چاہیے
 جب مرض ہونیک کاف بڑھ جاتا ہے اور سچے کو بلغم دفع کرنے کی طاقت
 نہیں رہتی ہے تب سلفٹ اف زنک سری قری کر وائسے اکثر بہت فائدہ
 ہوتا ہے۔ اپنی کے کیوانا قری کر لئی ایسی ہلکی دوا ہے کہ نہایت چھوٹے
 سچے کو بھی کہلا سکتے ہیں چنانچہ نصف یا ایک گریں اس دوا کا لیکر قدرے

ادویات مقوی

ان دواؤں کو انگریزی میں - ایٹمی ٹیکس بولتے ہیں سچو نکو میڈوا
 اکثر کہلا یا کرتے ہیں اور خاص کر اس صورت میں تو یہ نہایت مفید پڑتے
 ہیں کہ جب کوئی مرض سوزشی یا بخار کی بیماری شروع ہو گئی ہو وغیرہ
 ان بیماریوں کے عین ابتدا میں اگر مقوی دوا کہلائی جاوے تو اکثر نہیں
 تخفیف ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ دوسری رک بھی جاتی ہیں اور خاص کر
 مرض جذری میں مثلاً جھپک سرخ باد آور سٹرا وغیرہ اس جماعت کے
 بیماریوں میں جب دانے اچھی طور پر نہ نکلیں تو قوی دوا سے اوس بات
 کو بہت مدد مل سکتی ہے لیکن مرض برانکائٹس میں سچو نکو ان دوا کی
 نہایت ضرورت ہوتی ہے کیلئے کہ اوس حالت میں انکی کھانسی سے ہو کی
 نالیوں میں جو بلغم جمع رہتا ہے وہ بالکل نکل جاتا ہے۔ اور سچو کے
 معده میں اس سبب سے بلغم اکثر جمع رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسکو نکل دیتا ہے
 غرض قے کر کے وہ بلغم بھی دفع ہو جاتا ہے اور اس وقت کہ جب سبب
 اجتماع بلغم کے جیسا کہ کھانسی اور بخاروں میں ہوا کرتا ہے سچو کا دم کھٹ
 جاتا ہے تب اسوا مٹے کر انکو سچو کی جان بچاؤ کی اور کوئی صورت نہیں ہے
 اور جو قوی دوا سے ہوا کی نالیان کھل جاتی ہیں یہ بات کر وہ سچی
 بیماری میں خوب ظاہر ہے کہ جسم میں ایک پردہ کاذب حجبہ میں پیدا ہو کہ
 سچو کا دم گھونٹ دیتا ہے غرض جب اس مرض میں قے کر دانیسے ٹکڑے
 پردہ مذکورہ کو نکل آتے ہیں تب سچو کو نہایت افادہ ہو جاتا ہے قے کی
 دوا اوس حالت میں نہ کہلائی جائے کہ جب دماغ میں کوئی بیماری ہو یا
 معده سچو کا گڑا ہو قوی دوا اسوقت نہایت مفید پڑتی ہے کہ جب معده

وہ زخم خشک ہو جاوے تب اسی مقام پر دوبارہ یا سہ بارہ بعد خشک ہو جانے
 زخم کے بلشر لگانا بہتر ہے کیلئے کہ زخم سابق پر اگر تیز مرہم لگا کر مواد جاری
 رکھا جاوے گا تو اس زخم کے پڑھ جائیگا اندیشہ ہے اور شاید وہ مقام
 مردار بھی پڑ جا سکتا ہے اگر مقام بلشر پر خراش زیادہ پیدا ہو اور سرخ
 نظر آوے اور اس میں سوزش یعنی انفلا میشن ہو جانے کا اندیشہ ہو تو مرہم
 کی ٹبی نہ لگا کر اسپر آٹا یا سفوف کیمیاٹی اس قدر چترک دین کہ وہ مقام
 خشک ہو جاوے تب سب علامات خراش کی خود بخود رفع ہو جاوے گی
 لیکن بر تقدیر جب یہ بات حاصل نہ ہو سکے اور سچ مح انفلا میشن پیدا
 ہو جاوے تو اسی مقام پر ایک نرم پولٹس لگا دین یا اسپر روئی کے
 پہا ہی ٹہلا دین کہ جن سے نہایت فائدہ ہوتا ہے بھونکوری کی ٹبی لگانے
 کا یہ قاعدہ ہے کہ رائی کی سفوف میں بھون آٹا یا روئی کا گوڈا ملا کر
 اسکو صرف پانی سے گھول لین اور ایک کپڑی پر بچھا کر لگا دین اگر جلد نہ
 ملائم ہو تو پہلے جلد پر ایک ٹکڑا باریک کپڑا بچھا کر اس ٹبی کو لگا دین
 بعد ۱۰ یا ۱۲ منٹ کے جلد سرخ ہو جاتی ہے تب اس ٹبی کو اتار لین
 ان باتوں کے محتاط رہیں کہ کئی کئی گنا کثرت سے لگا دین کہ اس ٹبی کے
 لگانے سے جو درد ہوتا ہے بچے کثرت نہیں کرتے ہیں پس اس ٹبی
 دیر تک رکھ دی جاتی ہے چنانچہ اس غفلتی سے بعض دفعہ اس مقام
 پر زخم پڑ جاتے ہیں اور وہ مقام مردار بھی پڑ جاتا ہے۔ اگر رائی کی
 ٹبی عقلمندی سے لگائی جاوے تو اون بیماریوں میں جو بسبب خراش
 کے پیدا ہوتی ہیں یا بسبب دب جانی دانہ چپک کے لاحق ہوتی ہیں
 بعض بلشر کو وہی کافی ہو سکتی ہے +

ہو کر تا ہے مثلاً سینہ کو سامنے کی جلد کا صکر نہایت ملائم اور نازک ہوتی
 ہے پس اس مقام پر اگر لمبٹر صرف دو ہی گھنٹہ تک رہے تب بھی آبلے نکل آؤ گی
 لیکن برخلاف اسکے اسکا پیولا ہڈی کے نیچے اگر چار گھنٹہ تک بھی بائٹر
 رہے تب بھی شاید آبلے پیدا نہ ہوں علاوہ اسکے سر کی جلد بہت ہی ہتھکی
 ہوتی ہے کہ جب آٹھ گھنٹہ تک بھی اگر لمبٹر رہے تو بھی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے
 علاوہ ان باتوں کے بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جنہیں جلد کی حالت بگڑ
 جاتی ہے کہ اسپر خراش پیدا کرنے والی دوا کا اثر فوراً ہو جاتا ہے مثلاً
 وہی بیماریاں جو مرض میزلس کے ساتھ یا بعد رفع ہو جانے اوس مرض کے
 ظاہر ہوتی ہیں اور خاص کر وہ بنو موئیا جو می-زلس کے ساتھ پیدا ہوتا
 ہے عرض ان حالتوں میں لمبٹر کا نہ ضم مردار بڑھ جاسکتا ہے اور علاوہ ان
 باتوں کے بچہ کو جب لمبٹر لگایا جاتا ہے تب نہایت درد اور مہجہ
 ہوتی ہے عرض ان بیماریوں کے باعث اور بہ سبب اسکے کہ بچہ چونکہ ہمیشہ
 حرکت کرتا رہتا ہے تو لمبٹر کی ٹہنی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی ہے اسلیو
 نہیں بچہ کو لمبٹر نہ لگانا بہتر ہے بلکہ اگر ضرورت ہو تو لمبٹر کا عرق لگا دین
 کہ جبکی مقدار کو ہم کم و بیش کر سکتے ہیں جب لمبٹر کی ٹہنی اٹھالی جاوے
 تو اس بات کی ضرورت احتیاط رکھیں کہ آبلے ٹوٹنے نہ پاویں اور جو آبلے ٹوٹے
 ہوں ان کو توڑنا منظور ہو تو انہیں چوٹی چوٹی سو رخ کر کے مواد کو نکال
 دیں۔ نہ ان بعد انت پر مہم لگا کر اوس مقام پر باندھ دیں مگر کپڑے کی
 ٹہنی اسپر نہ لگا دیں کیلئے کہ کپڑا اچھی طرح چسبان نہیں ہوتا ہے۔ اگر
 اوس مقام سے چند روز تک مواد جاری رکھنا منظور ہو تو اسپر کوئی
 خراش پیدا کرنے والا مہم مثلاً ساوین اینٹ اینٹ وغیرہ نہ لگا کر جب

اسہال اور پیٹھ اور تشنج اور بیہوشی میں ہوا کرتا ہے علاوہ ازیں بلشتر
 اوس صورت میں بھی مفید پڑتا ہے کہ جب کسی دیرینہ رطوبت کو بند ہو جا
 سہ انفلامیشن پیدا ہوتا ہے چنانچہ سچون کے کانسی اکثر مدت تک سہ جا رہی
 رہتی ہے غرض اس سہ کے دفعتاً بند ہو جانے سے اکثر کوئی نہ کوئی
 بیماری اونکو دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ پس اس صورت میں کان کے سہجو
 بلشتر لگا کر اگر چند روز تک مواد جاری رکھا جاوے تو بیماری دماغ کو فوراً
 تخفیف ہو سکتی ہے۔ واضح ہو کہ بعض دفعہ بلشتر کو لگانے سے اوس مقام
 کی چارون طرف ایک قسم کے دانی پیدا ہو جاتی ہیں اور وہی رفتہ رفتہ
 ساری جسم پر پھیل جاتی ہیں سچونکو جو اکثر کم بلشتر لگایا کرتے ہیں تو اسلئے
 کرتے ہیں کہ اوسکے لگانے سے بعض دفعہ اوس مقام پر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے
 اور یہ کہ کبھی کبھی زخم اس پر ہو کر وہ مقام مردار بھی پڑ جاتا ہے پس ان
 باتونکو یاد رکھیں اور بلشتر ایسی احتیاط سے لگاویں کہ جس میں بائین
 ہونی باوین چنانچہ وہی احتیاطیں یہ ہیں کہ بلشتر کو مرہم میں نصف جربی
 ملاویں یا بلشتر کی ہٹی پر ایک ٹکڑا باریک پارچہ چسبان کر کے لگاویں
 اور اس قاعدہ کو بھی یاد رکھیں کہ بلشتر کو ہرگز دویا چار گھنٹے سے زیادہ
 دیر تک نہ رکھیں یعنی جب جلد سرخ ہو جاوے تب اوسکو اتار لین بعد
 اسکے آبلے خود سچو دیکھ کر نکل پڑتے ہیں جب نہایت چھوٹی سچونکو بلشتر لگایا جا
 ہے تو جیسے اوس مقام پر جلن پیدا ہو یا نہوا ایک ہی گھنٹہ کے اندر آبلے
 پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور واضح ہو کہ اگرچہ یہ قاعدہ کہ سچون میں چار گھنٹہ
 سے زیادہ دیر تک بلشتر کو نہ رکھیں بہت خوب ہے تاہم اس بات کو
 بھی یاد رکھیں کہ بعض مقام پر نسبت دوسرے کی زیادہ تر نازک اور ملائم

اسکو اگر ساتھ دانائی کے لگایا جاوے تو نہایت مفید پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ بلسٹر
 کے لگانے سے خاص اوس مقام پر اور ساری جسم میں بڑی جینی پیدا ہوتی ہے تو
 اسکی نادانی سے استعمال کثیر نہایت نقصان متصور ہے۔ پس شدید انفلاتین
 کے ابتدا درجون میں بعض مضمکے بلسٹر نہ لگانا چاہئے۔ اور بعد مضمکے
 بھی اگر خاص اوس مرض اور سنجار کو اچھی طرح تخفیف نہ ہو جاوے تب بھی
 بلسٹر نہ لگانا چاہئے کیلئے کہ اوس حالت میں بلسٹر دو نون یا تو نگو مضر ہوگا۔
 اور بچہ کی کہانسی اور کروب کی بیماری میں پہلے ہی بلسٹر کا استعمال
 نہ کریں۔ اور خاصکر مرض کروب میں۔ اسباب کو یاد رکھیں کہ تا وقتیکہ
 علامات شدید رفع نہ ہو جاوین بلسٹر ہرگز نہ لگاویں اور اسوقت اگر بلسٹر
 لگاویں بھی تو خود گلی بہ نہ لگا کر سینہ کی ہڈی یا گردن پر لگانا چاہئے۔ مگر
 مرض برا نکائیس اور ینومونیا میں خاص مقام مرض پر بعد قدری تخفیف
 ہو جانی علامات شدید کے لگا سکتے ہیں اس ترکیب سے ہر صورت فائدہ
 مستور ہے اور امراض دماغ میں بلسٹر کے لگانے اور ہی ترکیب سے بچا
 عین ابتدا درجہ سوزش میں یعنی جب علامات شدید موجود نہ تو سر پر بلسٹر
 لگانے سے اول علامتوں کی اور ہی شدت ہوتی ہے لیکر ہی درجہ شدید میں
 بلسٹر اگر گردن پر لگایا جاوے تو علامتوں کو تخفیف ہوتی ہے اور اوس
 سوزش کی درجہ اخیر میں یعنی جب بیمار بہوش ہو جاوے اور اسکی دماغ
 میں آب خون تراوش پایا وے تب خود بلسٹر کے لگانے سے نہایت فائدہ
 ہوتا ہے اگر بچہ کمزور ہو تو بعض مضمکے بلسٹر کا لگانا بہتر ہے اور اسطور
 میں ہی یہ بات موافق پڑتی ہے کہ جب دماغ میں صرف خراش ہو اور اگر
 انفلاتین بھی ہو مگر اسکی تشخیص میں شک رہ جاوے جیسا بعض دفعہ

جو اکثر کمزور ہوتی ہیں اور کونکھون نکل جانے کی برداشت بہت کم ہوتی ہے بہت
 امیر و نگر سچون کے + جن سچو نکل خون بہت زیادہ بار بار نکل جاتا ہے اور نین
 بیہ علامتیں پائی جاتی ہیں چنانچہ بچہ دفعتاً کمزور اور ناتوان ہو جاتا ہے اور
 رنگت اس کے چہرے اور ساری جسم کی بالکل ہلکی پڑ جاتی ہے۔ دست و پا سرد
 ہو جاتی ہیں۔ نبض کمزور اور جلد چلنی لگتی ہے۔ تنفس جلد جلد اور ساتھ خراٹی
 کے لیا جاتا ہے۔ اور بوقت اپنی سانس کے بہت سیخ اخراج باقی ہے مزاج بچہ کا چڑچڑ
 ہو جاتا ہے اور بی چینی اور بیداری طاری رہتی ہے بعد ظاہر ہونی ان علامتوں کے
 یہی اگر خون نکلا جاوے یا علامات مذکورہ بالا کا علاج بذریعہ ادویات نہیں
 اور سڈ بیٹو کے نکلیا جاوے تو ساری جسم میں تشنج ہونی لگتا ہے اور بچہ بیہوش ہو جاتا
 ہے اور بعد چند لمحہ کے مرغ روح اس کا قفسِ عنصری سے پرواز کر جاتا ہے اور بعد
 مرگ کے اس کی لاش کو چیریشی بطون دماغ میں اجتماعِ سیرم کا پایا جاتا ہے
 غرض ان علامتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور بچہ دظاہر ہونی ان کے خون بند کر دینا
 چاہیے اور اس قاعدہ کو یاد رکھیں کہ جب رنگت چہرے کی ہلکی پڑ جاوے
 تو فوراً خون بند کر دین اور حالتِ غشی کا انتظار نہ کریں کیلئے کہ بچہ نکل غش جلد
 نہیں آتا اور جب آتا ہے تو اوس حالت سے نجات پانی دشوار ہے۔ قطع نظر
 ان علامتوں کو زیادہ خون نکالنے سے بچہ اکثر کمزور اور چڑچڑا مزاج ہو جاتی
 ہیں گا ہی بلیا اور گا ہی غافل رہتی ہیں اور کبھی تو اسہال میں مبتلا ہو جاتی
 ہیں اور گاہے بچہ کو استسقا کی بیماری ہو جاتی ہے +

بلشہ یعنی ادویاتِ ابلہ انگیز

واضح ہو کہ سچون کی امراض سوزشی میں بلشہ کا استعمال اکثر کیا جاتا ہے اور

داغ دین بہ نسبت جو نکونکی کینک گلاس کا لگانا بہتر ہے کسلنے کہ اس ترکیب
 سے ٹھیک مقدار خون کی معلوم ہو سکتی ہے اور گلاس کا خون بھی جلد بند
 ہو سکتا ہے۔ اکثر گردن کو پیچھے اور پشت پر مابین دو نوں اسکا بیولا ٹھہری
 کر گلاس لگا کر تے ہین۔ کتقدہ خون لینا چاہئے یہ بات شدت مرض پر
 موقوف ہے لیکن اس بات کو دریافت کرنے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ سچو ٹھیک
 گلاس لگا دین اور جب دیکھو کہ رنگت رخساری اور لب کی پہلی بڑھ گئی ہے
 تب موقوف کریں۔ نبض کا کچھ عتیا نہیں کسلنے کہ اوسمین اختلاف
 پایا جاتا ہے اور جب واسطے رفع کسی مرض داغ کو گلاس لگا یا جاوی تو تہاتہ
 کی نبض کا خیال نہ کہین بلکہ اس صورت میں شراہین داغ کو دیکھو کہ تڑپ
 اونکی کم ہوئی یا نہیں۔ لیکن عموماً بچوں کے خون نکلنے کا یہ قاعدہ ہے
 کہ ایک برس کے بچہ کا ایک آنوس سے تین آنوس تک خون نکال سکتی
 ہین یا اوس عمر میں دو یا تین جو نکلیں کافی ہین اور بعد گزر جانی اوس عمر
 کو ہر سال کے واسطے ایک آنوس بڑھا دین غرضیکہ عہد طفولیت یعنی آٹھ
 برس تک آٹھ آنوس سے زیادہ خون نہیں نکال سکتے ہین یا بارہ یا
 حد ۱۶ جو نکون سے زیادہ نہیں لگا سکتے ہین اس بات کا فکر اور پرہیز
 کہ بچوں کو بار بار کو خون نکالنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے اور اس نقصان
 رفع کرنے کی بہتر ترکیب ہے کہ مقام انفلامیشن پر فوہ اجونکین لگا دین
 تاکہ ساری جسم دوران خون کو خون نکل جائیکا صدمہ پہنچے اور مقام
 انفلامیشن کو بھی اوسکا اثر ہو جاوی۔ بر تقدیر اگر دوسری مرتبہ بھی خون
 نکالنے کی تجویز پڑے تو ہرگز کم از کم بارہ یا ۱۶ گنتی بعد نہ نکالین۔
 اس بات کو یاد رکھنا چاہی کہ غریب کو بچہ جنگواچی خوراک نہیں ملتی اور

سی سچو نکو تکلیف ہوتی ہے خاصکر اوس صورت میں کہ جب اُسکو تکلیف تنفس ہو
 خون نکالنے کو لئے جو نکو نکا بھی استعمال کہہ تو میں اور اکثر مطلب قصد کا
 صرف جو نکو نکو لگانے سے حاصل ہو سکتا ہے اگر چونک اچھی ہو اور آدم ہو گئی ہو
 تک کسی مقام پر لگی رہے تو اوس مدت میں قریب ایک آنوس کو خون پی
 لگی تاہم یا پاؤں میں چونک لگانے سبب دیگر مقامات جسم کو بہتر سے کسلے
 کر دست یا پامین واسطے بند کر نو خون کے گدھی یا بند سچ بخوبی لگا سکتے ہیں
 گلو یا سینہ میں چونکوں کو لگانے سے اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ خون اون مقامات کا
 بند نہیں ہوا ہے اور سچ مر گیا ہے اگر واسطے رفع مرض گلو یا سینہ کو چونک لگانے
 منظور ہو تو مشعلی کی ٹڈی پر لگا دین اور امراض دماغ میں کپٹی کی ٹڈی کے
 مسائڈ پر اس پر کان کو سچ لگانا چاہئے کسلے کہ اون مقامات کا خون
 سبب ہو ٹڈی کے جلد بند کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہو کہ چونکوں کے خون بند
 کر نہیں اکثر نہایت دقت ہوتی ہے اور سچ مر ہی جاتی ہیں پس حکیم کو چاہئے
 کہ جب تک جو نکو نکا خون بند نہ ہو تک بیمار سے علیحدہ نہو اور باعث کار
 ضروری کے اگر بیمار کو پاس رہنا امکان نہو تو بوقت رخصت کو والدین
 کو تدبیر خون بند کرنے کی بخوبی سکھلا دینی چاہئے اور اگر ممکن ہو تو ہرگز نہو
 چونکین نہ لگا دین۔ اگر چونکین ایسی مقام پر لگائی جاوے کہ جہاں نیچ
 نہیں بانڈا جا سکتا ہے تو انگلی سے اوس مقام کو با رکھیں یا آٹا
 یا سفوف صمغ عربی یا پٹکری اوس مقام پر چھڑک دین اور جو ان ٹیکہ بنو
 بھی خون بند نہو تو نائٹریٹ اف سلور کے خوب باریک قلم بنا کر چونک
 کو زخم کو دماغ دین اور جو یہ ترکیب بھی کافی نہو تو سوئین یا باریک لوہی
 کی تار کو آگ پر اس قدر گرم کرین کہ وہ سیخ ہو جاوے تب اسی زخم کو

اور اُس میں ایک قسم کا پردہ پیدا ہوتا ہے اس لئے قضا کا لینا نہایت ضرور
ہوتا ہے۔ لیکن اس صورت میں قبل از لینو قضا کے اس بات کو ضرور دریافت کرنا
چاہئے کہ آیا وہ مرض کروہ حقیقت میں باعث انفلا میشن کر رہی یا یہ وہ مرض
کروہ ہے جسکو انگریزی میں اسپاز موڈک کروہ بولتے ہیں اور جو صرف
پٹھوں سے تعلق رکھتا ہے۔ کس لئے کہ اسپاز موڈک کروہ میں قضا لینے کا اثر
نہیں ہے اور دماغ کی سوزش میں ہی جب سوزش مذکورہ شدت کسلی قوت ور
بچہ میں ظاہر ہو یا جب امراض تشنجی میں غلبہ خون کا دماغ میں پایا جادے
تب قضا لے سکتے ہیں مگر جب انفلا میشن کی شدت زیادہ ہو اور وہ ہو ہی
کسی کمزور بچہ میں تو اس صورت میں قضا نہیں لینے چاہئے کیونکہ اس انفلا میشن کا
اکثر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں باقی پیدا ہو جاتا ہے جسکو اصطلاح میں بند
کفلس بولتے ہیں انٹریون کی سوزش میں زیادہ خون نکالنا نہ چاہئے اور
قبل از نکلنے خون کو اس بات کو بخوبی دریافت کر لینا چاہئے کہ درحقیقت انٹریون
انفلا میشن ہے یا نہیں کیونکہ علامات دست و قدم سے گونشک میں دروہی موجود
ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیمار کو انٹریون یا انٹریون جن بچوں کا مزاج اس کے فوٹس
ہو اوٹکی قضا نہیں لینے چاہئے واضح ہو کہ لڑکوں اور نہایت چھوٹی بچوں کی
قضا اکثر کہونی کی رگوں سے نہیں لیتی ہیں کس لئے کہ وہاں تک رگ اکثر باریک
اور چھبی میں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے بچوں کی پشت پا یا پشت دست
کی رگوں سے بقدر حاجت خون نکال سکتے ہیں اور جو یہ رگین بھی ایک
ہوں تو جو گوگردین کو قضا لے سکتے ہیں۔ لیکن جو گوگردین کے قضا وقت
میں پڑتی ہے کہ جب مرض دماغ یا سینہ میں ہوا اور یا در کہنا چاہئے کہ بعد
قضا کے اس رگ کا خون بند کرنا مشکل ہوتا ہے اور کل میں بند ہونے کی بات نہ

اچھی ٹانگ اور البٹریٹو دوا ہی یہ روغن خاص کر اون بچوں کو زیادہ مفید پڑتا ہے
 کہ جنکا مزاج بلغمی ہے اور جو مرض اس کے افیو لا میں مبتلا ہوں اسکے کہانیسی طاعت
 زیادہ ہوتی ہے اور بچہ بہت جلد لچیم اور شحیم ہو جاتا ہے +

تنقیہ واسطے رفع انفلا میٹش یعنی سوزش کے اول خون نکالنا

واسطے رفع سوزش کے اور ادویات دافع سوزش سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے
 خون نکالنے کی احتیاج ہوتی ہے کسلے اکثر ادویات دافع سوزش کا اثر تہی
 جلد ظاہر ہوتا ہے کہ جب پہلے خون نکالا جاتا ہے۔ خاص کر بچوں میں ابتداً انفلا میٹش کے اندر
 کٹا کر ضرورت ہے جو خون نکالنا منظور ہو تب اس قاعدہ کے پابند رہیں کہ ایمر کو
 احتیاج اور برداشت اس ترکیب کی ہی یا نہیں اور یا در کہنا جائے کہ بچہ کو
 مکرر سہ کر اس ترکیب کی برداشت نہیں ہے اور یہ کہ جب کسی مرض
 سوزشی یا بخاری میں خون نکالنا منظور ہو تو قبل اسکے اس بات کو اچھے طور پر
 دریافت کر لینا چاہئے کہ اس ترکیب کی ضرورت ہی یا نہیں۔ واضح ہو کہ
 جب انفلا میٹش کسی عضو کی ساخت میں یا جب کسی سیرس ممبرین میں ہوتا ہے
 تب خون نکالنے کی زیادہ حاجت ہوتی ہے یہ نسبت اسکے کہ جب انفلا میٹش کسی
 میوکس ممبرین میں ہو اور یہ کہ جب انفلا میٹش ایکھی مرتبہ دو مقام میں ہو تو
 ایک پردہ میں اور دوسرے عضو کی ساخت میں جیسا کہ مرض برانکائیٹس۔ مونیا
 میں ہو اگر تاہی تو اس صورت میں ہی بغیر مضام کے جاریہ نہیں ہے اور
 علیٰ ہذا القیاس مکرر کی بیماری میں بھی گو انفلا میٹش میوکس ممبرین میں
 ہوتا ہے تاہم سبب کے کہ وہ انفلا میٹش ایک معتبر عضو یعنی خجرہ میں ہوتا ہے

درجہ اتم پر ہوا اور ساتھ اسکے کسی طرح کا جریان بھی ہو بعض دفعہ فولاد کے
 کہا نیسے دماغ میں فتور برپا ہوتا ہے غرض اس علامت کو رفع کرنے کے لئے
 کہتے ہیں کہ کا فور فایده مند ہے۔ لیکن کا فور میں یہ ایک بڑا عیب ہے کہ یہ
 دوا بچوں کو موافق نہیں آتی ہے اور اسکے کہا نیسے دم لینے میں تکلیف ہو
 ہے اور نروس سسٹم یعنی نظام عصبی متحرک ہو جاتا ہے کہ جس باغشش
 وغیرہ عصبی بیماری پیدا ہو سکتی ہیں بہت عمدہ وقت مرکبات فولاد یا آئینہ
 ڈین کر استعمال کرنا چاہیے کہ انکو غذا سے دو گھنٹے بعد کھلا دین کہ جب
 نو بہت بڑا اور نہ بہت خالی رہتا ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ بعد استعمال
 کر فوٹین ہفتے یا ایک مہینے کے با دو ہفتوں کے لئے انکو موقوف کرنا چاہیے۔ اس
 ترکیب سے فولاد کو برسوں تک کھلا سکتے ہیں چنانچہ اوس حالت میں کہ جب
 سچے کا فرج اسکا آئینہ لیں ہو۔ آئینہ ڈین کو بطور ٹینکچر یا عرق کے ۳ بوندے
 باخ بوندے تک کسی شیرین عرق کے ساتھ نہایت چوٹی سچو نکو بھی دی سکتے
 ہیں یا درہم کہ شکر اسی وقت ملا نا چاہئے کہ جب دوا کھائی جاوی نہیں تو
 اثر اسکا جاتا ہے گا اور یہ کہ جب عرق آئینہ ڈین کا تیار کرادین تب
 چکایا ہوا ابانی سے بناوین۔ واضح ہو کہ ٹینکچر آف آئینہ ڈین میں جب ابانی
 ملایا جاتا ہے تب وہ تہ نشین ہو جاتا ہے لیکن بعد کہ ہر جذبہ و نہ کہ یہ بات
 جاتی رہتی ہے باہر لگانیکے لئے یہ مرکب بہت اچھا ہے۔ آئینہ ڈین کو
 جب اندر استعمال کرنا منظور ہو تو ہمراہ۔ آئینہ ڈین آف پوٹاسیم
 کے نسخہ مرقومہ ذیل کے طور پر دی سکتے ہیں :-

نسخہ

دیرہ آئینہ

چکایا ہوا ابانی

کسی مرض سوزشی کے فولاد کا استعمال کیا جاوے تب فولاد کو ہمراہ انٹی سونی کر
 ملا کر کہلاوین مثلاً دو حصہ انٹی سونیل وائین اور ایک حصہ اسٹیل وائین ۳
 باس مرتبہ دیکو کہلاوین چوٹی بچون کے لئی خوراک فراہمی ایمونیو کلورائیڈم
 کی ایک گرین سے دو گرین تک ہی دینیں دو یا تین مرتبہ اور تین سال کے
 بچہ کو اس مقدار کا دو نادی سکتے ہیں اور خوراک ٹینگچہ فراہمی ایمونیو-
 کلورائیڈم کی ۵ بوند سے ۳ بوند تک ہی کار بونٹ - اف - ایرن - سی ہیٹ
 ہلکا اور فائدہ مند مرکب ہے اور فائدہ میں برادرہ فولاد کی مشابہ ہے مگر اس کا
 فائدہ کرم کش نہیں ہے جیسا برادرہ فولاد کا ہے لیکن ٹان اسپین یہ خوبی
 ہے کہ اسکے کہانیسے بدبودار ڈکار نہیں آتے اور خاصکر امراض تشنجی اور
 فوتبی میں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن یہ فواید اس وقت ظہور پا سکتی
 ہیں کہ جب یہ مرکب تازہ بنا ہوا کہلایا جاوے جیسے مسٹورافرائی کہا جاتا
 ہے طور پر - فراہمی - کار - بوناس - کم - سکر و بھی بہت اچھا مرکب ہے
 لیکن اسکو زیادہ مقدار میں کہلانا جائی مثلاً ۱۰ - گرین سے آدھی ڈرام
 تک - واضح ہو کہ جب کار - بونٹ - اف - ایرن - کا استعمال کرنا منظور
 ہو تو کئی گرین کسی باہمی - کار - بونٹ - دوائی کا اوسمین ملا دینا جائی
 تاکہ اثر اسکا قائم رہی - سائٹریٹ - اف - ایرن - بچون کے لئی نہایت لینڈ
 مرکب ہے خاصکر جب اسکو شربت لیمو کے ہمراہ بلایا جاوے سلفٹ - اف
 ایرن - سب مرکبات فولاد سے نہایت تیز مرکب ہے اور اسٹرنجٹ اور
 انتہلنگ فائدہ بھی اسکا سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اسکے کہانیسے معده
 بگڑ جا سکتا ہے یا بن سبب چوٹی بچون کو موافق نہیں آتا اور جو بڑے
 لڑکے کو نکو بھی دیا جاوے تو اسی حالت میں استعمال کرنا جائی کہ جب کھطاتی

فولاد کا جسکو فرائی - پوٹا سیوٹا رٹر اس - اور فرائی ٹار - ٹرک ٹم کہتے ہیں سچو نگر
 لئی نہایت عمدہ مرکب ہے کسکو کہ یہ بی ذائقہ اور ہلکا ہے اور دوسری خوبی
 اسمین یہ ہے کہ اس کے استعمال کر نیسی باخانہ قبض نہیں ہوتا جیسے دیگر مرکبات
 فولاد کی کہانی سے ہوتا ہے اور جب اسکا ملٹین فائدہ بڑھانا منظور ہو تب
 اسمین روشن سالٹ ملا دی سکتے ہیں اور ساتھ اس ملٹین فائدہ کے
 یا بعض اس کے اگر پشاپ زیادہ پیدا کرنا چاہیں تو اس میں بائی ٹار ٹریٹ
 اف - پوٹاش ملا دیں فرائی پوٹا سیوٹا رٹر اس کو بطور نسخہ مرقومہ فل کے
 استعمال کرنا چاہیے۔

نسخہ

فرائی پوٹا سیوٹا رٹر اس _____ ۲ - یا ۵ گرین

ایرو - شک - پاؤڈر _____ ۲ - گرین

شکر صاف _____ ۲ - گرین

سبکو ملا کر دھین بن مرتبہ کہلا دیں - وائی - نم - فرائی بی بہت ہلکا
 مرکب ہے اور بہت چوٹی سچو نگر بمقدار پانچ یا ۱۰ بوند کی دھین دوا تین
 مرتبہ دی سکتے ہیں اور اگر سچہ زیادہ عمر کا ہو تو ایک ڈرام تک بھی کہلا سکتی
 ہیں - لیکن جب سچہ بہت کمزور اور ڈھیللا ہو جاوی تو ٹینکچر - اف - اسٹیل
 بمقدار ۵ یا ۱۰ بوند کی کئی مرتبہ دن کو کہلانا چاہیے کس لئے کہ یہ مرکب بہت
 مرکبات مذکورہ بالا کے نہایت سریع تاثیر اور تیز ہے مگر اسکی ٹینکچر
 اف - اسٹیل کا فائدہ قابض بھی ہے واضح ہو کہ قبل از استعمال کر کسی
 مرکب فولاد کی ہلکے جلاب سے اصلاح شکم کرنا ضروری ہے جب یہ بات منظور
 ہو کہ فولاد سے دست قبض اور جسم گرم نہوا اور یہ کہ بجز درفع ہونی بخاریا

سکون ملا کر بمقدار ایک با دو ڈرام کے دشمن ۳- یا ۴- مرتبہ بلا دین۔ سکوناً کب
 اور مرکبات فولاد بہت عمدہ ٹانگ دو این میں سکوناً بارک اس وقت
 مفید پڑتا ہے کہ جب سچہ دفعتاً نہایت کمزور ہو جاتا ہے یا دن بیمار یون میں
 جو نوبت سی ہو اگر قی میں اور مرکبات فولاد کا اثر چونکہ آہستہ آہستہ نمایان
 ہوتا ہے تو ایسی بیماری میں اونکو دینا چاہیے جو بہت دنوں کی ہو اور جب در
 خون کی گہڑ جانیسی لاحق ہو اور جب کوئی تشنجی بیماری نوبت نوبت ظاہر ہو
 تب دو دن ادویات مذکورہ بالا کا ایک شامل استعمال کرنا بہتر ہے۔ مثلاً
 ایک گرین کوفین اور ایک گرین سلفٹ۔ اف۔ ایرن کو جوہر بوند ڈاٹلیوٹ
 سلفیورک اسٹیمین حل کر کے دو آنوس انفیوژن۔ اف۔ کلیمین ملا دین
 اور اس عرق کو بمقدار دو یا چار ڈرام کے دن میں دو یا تین مرتبہ بلا دین
 اور وہ مرکب جبکو فرامیٹ کوئی۔ نی۔ سائٹراس کہتے ہیں اور جسمین
 فولاد اور کوفین ملا ہوا ہے مطالب مذکورہ بالا کے حاصل کرنے کے لیے بہت
 مفید ہے۔ مرکبات فولاد اور آئیوڈین میں سبب رہی خاص فائدہ کے من
 اسکا فیولابین استعمال کرتے ہیں اور ان مرکبات کو اگر ساتھ احتیاط کے
 استعمال کیا جاویں تو اشتہا بہت جلد بڑھتی ہے اور فولاد تو علی الخصوص
 خون کو صاف کرتا ہے اور جسم کو طاقت بخشتا ہے باین سبب کسی ایسی بیماری سے
 شفا پانے کے بعد جسمین مریض کا خون کم ہو گیا ہو اور بجا نہایت کمزور ہو گیا
 ہو مرکبات فولاد کا استعمال کرتے ہیں مرکبات آئیوڈین کو کہاں سے لیتا
 نہیں پڑھتی بلکہ اکثر گھٹ جاتی ہے اور دوسری برائی اس میں یہ بھی ہے
 کہ آئیوڈین کے زیادہ دن تک استعمال کرینیسی انٹریون کے میوگن میں
 پر خراش پیدا ہو کر بجا کو درد قویج مروڑا اور اسہال ہو جاتا ہے۔ وہ کب

نقاب صمغ عربی ————— ادما آنوس

روغن تارپین ————— ۳۰ - بوند

عرق لیمو ————— ۴ - بوند

شیرہ ————— ۴ - ڈرام

سبکو ملا کر بمقدار ایک بادو ڈرام کے بعد تین تین گھنٹہ کر بلاوین +

ادویات مقوی

ان دوا کو انگریزی میں ٹانک بولتے ہیں کسی مرض سے شفا پانے کے بعد یا جب
بخار یا امراض سوزشی مکی بڑھ جاتی ہے اس وقت بچہ کو مقوی دوا کی اکثر
احتیاج ہوتی ہے واضح ہو کہ ان ادویات کی استعمال میں احتیاط درکار ہے
کسٹمی کہ انکی کہلانے سے بچہ کو زیادہ تحریک ہوتی ہے بہ نسبت جو انون کی بچہ کو
مقوی دوا کو دینے کا ایک خاص مطلب یہ ہے کہ انکی بہوک کہلے پس جب یہ
مطلب حاصل ہو جاوے تو غذای مقوی سے طاقت آسکتی ہے بغرض اس مطلب کی
لکھ کوئی ایسی دوا تجویز کرنی چاہے جو نہایت ہلکی ہو مثلاً چرتیا یا جفشن یا کونین
وغیرہ لیکن کونین سب سے بہتر ہے اور اس دوا کو تھوڑی مقدار میں نہایت
نہو سچہ کو بھی دے سکتے ہیں چنانچہ نسخہ ذیل کے طور پر :

نسخہ

پشکایا ہوا بابنی ————— دیرہ آنوس

کونین ————— ۲ - گرین

اروشک سفیورک اسٹ ————— ۲۰ - بوند

ٹینکچر - اف - آرنج ————— ۴ - بوند

سرب - اف - آرنج ————— ۴ ڈرام

ایسی اسٹی سیولنٹ دوا کا جیسے ارومانک اسپرٹ اف ایمونیا یا کاربوٹ
 اف ایمونیا میں استعمال کرنا چاہیے اور جب سبب کمال ضعیف کر دیا اکثر زیادہ
 تنقیہ سے ہوا کرتا ہے یا بیماری کے زیادہ دن تک رہنے سے لاحق ہوتا ہے
 بقیہ بیماری اور تشنج ہو جاوے تو اس حالت میں یہ ادویات نہایت مفید
 ہوتی ہیں۔ لیکن جب علامات مذکورہ بالا یعنی بقیہ بیماری اور تشنج بہ باعث انفلو
 یعنی سوزش کے لاحق ہوں اس حالت میں اسٹی سیولنٹ دوا کا استعمال
 بطور انٹس ہائز موڈک کر لینیے اور علامتوں کی شدت زیادہ ہوگی +
 نسخہ مرقومہ ذیل بطور اسٹی سیولنٹ کر سچو نکولے مفید ہو +

نسخہ

پی پرینٹ واٹر _____ ڈیڑھ آنوس
 اروٹک اسپرٹ - اف - ایمونیا _____ آدھا ڈرام
 نائٹریک - ایتھر _____ ۱۲ - بوند
 کبائونڈ - اسپرٹ - اف - لونڈر _____ ایک ڈرام
 شیرہ _____ آدھا آنوس

سبکو ملا کر مقدار ایک ڈرام کے دو دو گھنٹی بعد بلا دین ٹرین ٹامین یعنی روغن
 تارپین بطور اسٹی سیولنٹ اور انٹس ہائز موڈک کر سچو نکولے خاص کر ہوتا
 فائدہ مند ہے مثلاً اس روغن کا ایک یا دو بوند کھلا نیسے سچ اور تشنج فوراً رفع
 ہو جاتا ہے اور ہرانی اسپہال میں بھی یہ روغن مفید ہے اور شکم میں گرم رہنے
 سے بھی اسکو کھلا فرین روغن تارپین کو نسخہ مرقومہ ذیل کے طور پر کھلانا

نسخہ

عرق سولف _____ ایک آنوس

ادویات محرک القلب

ان ادویات کو انگریزی میں اسٹی۔ میولنٹ۔ بولتی میں سچونکو اسٹی۔ لیوٹ
دوا کی دینی میں نہایت احتیاط چاہئے کیسے کہ انراں دوا کا اہر نہایت جلد
نمایان ہوتا ہے اور اسی واسطے بعد مکمل جانے اوس اثر کے ضعف زیادہ
ہو جاتا ہے اس قسم کی دوا سچونکو اکثر دی جاتی ہے یا تو واسطے دفع رخ کر یا تو
کرفی در دیا تشنج کر اور واسطے نکالنے دانہ چھک کے یا جب بچہ یا عیث مرض
سوزشی کے خاصکر انٹریون کی سوزش یعنی پنجن میں کمزور ہو جاوے تو اوس
حالت میں نبض تیز کرنے کی لئی اسٹی میولنٹ دوا کا استعمال کرتی ہیں۔ لیکن اس
کمال احتیاط درکار ہے کیونکہ حالات مذکورہ بالا میں جب اسٹی میولنٹ دوا
کو بی احتیاطی سے کھلایا جاتا ہے تب شدت علامتوں کی بہت زیادہ ہوتی
ہی اور جب کسی اسٹی میولنٹ دوا کی احتیاج ہو چنانچہ اوس ضعف کی رفع
کرفی کے لئی جو اکثر دست و قری میں لاحق ہوتا ہے تب تمام اسٹی میولنٹ
دوا سے ایونیا کا استعمال بہتر ہے کیسے کہ یہ دوا نہایت سریع التأثير ہے
اور اثر اسکا تھوڑی ہی عرصہ تک رہتا ہے اور اس کے پنی سے بیمار کی ہوش
وحواس جاتی ہیں اور نہ اثر اسکا بدید رہتا ہے جیسے مرکبات نلرب
کو استعمال سے ہو کرتا ہے پس اس بات کو یاد رکھیں اور ادویات از قسم
ٹینکچر یا وائین کے سچونکو ہمیشہ نہ کھلایا کریں کیونکہ انہیں شراب موجود ہے
لیکن نان ارومانک وائر مثلاً سنی من وائر یا پی پرمنٹ وائر یا روغن
دار چینی یا روغن سولف وغیرہ کا بطور بدرقہ کے استعمال کر نہیں مضائقہ
نہیں جب سبب کم طاقتی یا تشنج کر یا یا عیث اجتماع بلغم کے جب اوس بلغم
کو سبب کمزوری کو بیمار نکال نہ سکے مرض کو دم لینی میں تکلیف ہو تب البتہ

۳۰ - بوند	اسند ایل یعنی سفوف کا تیل
۲۰ - بوند	ٹینکچر - اف - کسٹر
۲۰ - بوند	کباوند - ٹینکچر - اف - کارڈم
۱۵ - بوند	ٹینکچر - اف - اسافنی - ٹی - ڈا
۱۵ - بوند	اسپرٹس - پیو - لیجائی
۵ - بوند	لاڈنم

سبکو ملا لین +

دوسرے نسخہ کار - می - فی - ٹیو کا بیہ ححر
نسخہ -

ایک آنوس	کارا - وی - واٹر
آدھا آنوس	سیولج
آدھا ڈرام	کار بونٹ - اف - گینشا
۳۰ - بوند	کا جا - بوٹی - ایل
آدھا آنوس	سرب - اف - سافران
آدھا ڈرام	فٹڈ اسپرٹ - اف - ایبونیٹا
سبکو ملا لین + خوراک آدھی ڈرام سے ۲ ڈرام تک دینیں تین مرتبہ	
انہیں حالت میں مفید رہے کہ جب سعدہ میں نفخ اور ترشی ہو یا جب ہال	
ساتھ مروڑے کمر ہو اور اگر تلکین منظور ہو تو اس نسخہ میں ایک ڈرام	
ٹینکچر - اف - روبرب ملا دین اور اگر انوڈائین فائدہ جا میں تو جا	
بوند لاڈنم ملا دین +	

خوشبو آغز و کئی نظریے کسی خوشبو دار روغن کے بچون کی دوا میں اکثر ملا دیا کرتے
 ہیں اور یہ بات تو بعض حکیموں میں اس قدر مروج ہے کہ اونکا کوئی نسخہ ایسا
 نہیں ہوتا کہ جسمین پی۔ پر منٹ وائر یا فیل وائر نہیں پڑتا ہے لیکن جب
 ان عرقیات کی ضرورت نہوت البتہ اونکر ملانے سے نقصان متصور ہے کسکے
 کہ بعض بچونکو اون عرقیات کی بو سے نفرت ہے۔ عرقیات خوشبو دار مذکورہ بالا
 کا عام قایدہ قاطع ریج اور دافع تشنج ہے لیکن ان میں سے کسی کسی میں خاص
 فایدہ بھی ہیں چنانچہ منت وائر کا خاص فایدہ یہ ہے کہ یہ عرق معدہ کی
 خراش کو رفع کرتا ہے اور سینہ میں وائر یعنی عرق دار چنی انٹریوں کے
 خراش کو رفع کرتا ہے اور بلحاظ فایدہ ان عرقیات کے بچونکا کار می
 نی۔ پیو۔ کسکے یعنی عرق قاطع ریج واسطے رفع جھش و مرور اور ترشی معدہ و
 نفخ اور تشنج کر دیتا ہے۔ واضح ہو کہ جب علامات مذکورہ بالا کی رفع کر لو کر
 لئی کسی کار می۔ نی۔ پیو۔ کسکے کا استعمال کریں تو پہلی اسبات کی تخفیف
 کر لیں کہ آپا ساتھ اون علامتوں کے کسی عضو کا مثلاً معدہ یا انٹری
 وغیرہ کا انفلا میں یعنی سوزش بھی موجود ہے یا نہیں کسکے کہ اگر انفلا میں
 موجود ہے تو کار می۔ نی۔ پیو۔ کسکے سے بہر صورت نقصان متصور ہے بہت
 معروف و مشہور نسخہ کار می۔ نی۔ پیو۔ وہ ہے جبکو۔ ڈالینز کار می۔
 نی۔ پیو۔ بولنی ہیں اور جکا نسخہ یہ ہے :-

نسخہ - ۱ -

پی۔ پر منٹ وائر _____ ۲۔ انوس
 کاربونٹ۔ اف۔ گلیشیا _____ ۳۔ گرین
 پی۔ پر منٹ آئیل۔ یعنی روغن بودینہ _____ ۱۔ بوند

کسلے کہ جب کوئی کاربوتھ الکل دیوا کھلائی جاتی ہے تو کاربوتھ اس کے ہوا سے
 پیدا ہوتی ہے پس حالت نفخ میں اونکو استعمال کر شکم میں اور بھی زیادہ نفخ
 ہو جاوے گا ایسی صورت میں کئی قطری لائیکو ارا میونیا یا اروٹک اسٹاف
 ایونیا یا فٹڈ اسٹاف ایونیا کے استعمال سے نفخ اور ترشی فوراً دفع
 ہو جاتی ہے کسلے کہ ان تینوں دوا کا فائدہ اسٹی میولٹ اور انٹاسٹ ہے
 اور فرض کیجئے کہ اس حالت میں اگر اسٹی میولٹ دوا کا استعمال کرنا مناسب
 نہ ہو تو بالعموم اونکے گھٹنیا اسٹاکھلا دی واضح ہو کہ خاص فائدہ لائیکو ارا
 پوٹاسی کا یہ ہے کہ انٹراس دوا کا جلد اور گلیٹون پر نمایان ہوتا ہے
 اور اسکو کہانیے ان مقامات کی سوزش کم ہو جاتی ہے اور یہ باغض صر
 اوسوقت ہوتی ہے کہ جب سوزش مذکورہ انٹروپن کے بگڑ جانے لائق
 ہوتی ہے یہ بات باریا دیکھی گئی ہے کہ جب گلو اور شکم اور جڈون کی گلیٹان
 بڑھ جاتی ہیں اور جب سچہ کو مرکبات آئیوڈین کی پردانت نہیں ہوتی ہے
 تب لائیکو ارا پوٹاسی کے کھلانے سے گلیٹان حل ہو جاتی ہیں اور اس
 قسم کی امراض جلدی میں جو سبب خرابی شکم کو پیدا ہوں لائیکو ارا پوٹاسی
 نہایت فائدہ مند ہے یا درکہنا جائے کہ جب الکل دیوا کا استعمال کرنا
 ضرور ہو تو اونکو یک لخت بہت دنوں تک نہ کھلانا چاہئے کسلے کہ اونکے
 زیادہ دن تک استعمال سے معدہ کمزور اور نا صمہ بگڑ جاتا ہے

ادویات قاطع ریج

جن دوا سے بائی دفع ہوتی ہے اونکو انگریزی میں کارینیٹو بولتی ہیں چو نکو
 علاج میں اور خاص کر جب سیوکس ممبرین میں بیماری ہوتی ہے تو اکثر ایسی دوا
 تجویز کرتے ہیں کہ جس میں اسٹی میولٹ یا پیدیم ہو چنانچہ کوئی خوشبودار اسٹی میولٹ دوا مثلاً

بدبو افکی مر جاتی ہے اور ان ادویات کو ہونگ کاف یا کوئی کہانسی میں
 جس میں علامت تشنج کی موجود ہو استعمال کر نیسے بہت فائدہ ہوتا ہے اور مرض
 برانکائیٹس میں الکلی دوا کے کہلائیے بلغم تہلا ہو جاتا ہے اور کہانسی سے
 جلد نکل آتا ہے۔ ان دوا کے استعمال میں اس بات کا یاد رکھنا ضرور ہے کہ اوہل
 انفلا میں ان کو نہیں کہلانا چاہیے اور جب ان دوا کو استعمال کریں تو باقی
 یا میو سلج میں خوب حل کر کے بلاوین اور ہراہ افیون کے اگر دیوین تو نہایت
 فائدہ مند ہے اور عموماً ان کو استعمال کا یہ قاعدہ ہے کہ جو الکلی دوا کم تیز ہو
 اوسکو کہلاوین اسلئے کاربونٹ اف سوڈا بہتر ہے بہ نسبت کاربونٹ اف
 پوٹاش کے کیونکہ کاربونٹ اف پوٹاش تیز ہے اور کہلا رکھنے سے گل جاتا ہے
 پس بطور سفوف کے اسکو نہیں کہلا سکتے ہیں لیکن بائی کاربونٹ اف
 پوٹاش میں یہ برایان نہیں بائی جاتی ہیں تو یہ دوا تیز ہے اور نہ ہوا
 میں کہلا رکھنے سے بہت گل جاتی ہے پس اکثر حالتوں میں ایسی الکلی کا استعما
 کرنا مناسب ہے جب معدہ میں بہت خراش ہو تو لائیکوار پوٹاسی یا چوینکا
 بائی بہتر ہے اور جو ساتھ اوس خراش کے قبض بھی ہو تو مگنیشا کا استعمال
 کریں اور جب خراش مذکورہ انٹریون میں ہو تو کہریا مٹی بطور پلوس کر مٹی
 کمپازیشن کم ادویہ کا استعمال بہتر ہے یا نہیں تو بعض اوس مرکب کو صرف
 جاک مکسچر بلاوین۔ لیکن ساتھ خراش انٹریون کے اگر معدہ میں بھی خراش
 بائی جاوے تو معدہ کہریا مٹی کو قبول نہیں کریگا لہذا اس صورت میں یا تو
 کاربونٹ اف سٹوا۔ یا بائی کاربونٹ اف سوڈا۔ یا بائی کاربونٹ اف
 پوٹاش کا استعمال کرنا چاہئے لیکن شکم میں اگر زیادہ نفخ ہو اور تریشی بھی
 بائی جاوے تو اس صورت میں کسی کاربونٹ الکلی کا استعمال نہ کرنا چاہئے

علاوہ ان احتیاطوں کے جنکا ذکر اوپر کیا گیا ہے ایفون کو بعض حالات میں استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تر احتیاط درکار ہے مثلاً جب سبب انگلی کسی مرض یا علاج کے کمزور ہو گیا ہو اور دماغ کی مرصون میں اور بچہ کو جب شدت سے اسہال ہو جاتا ہے تب سبب ضعف دماغ کو وہ اکثر بیہوش ہو جاتا ہے غرض اس حال میں ایفون کو نہایت احتیاط سے کہلانا چاہئے

ادویات القلی یعنی کھار

انگریزی میں ان دوا کو الکلی بولتے ہیں اور وہ یہ ہیں جیسے امیونیا۔ گلیشیا۔ سوڈا وغیرہ اس قسم کی دوا خاص کر میو کس ممبرین کی پرانی انفلا میشن میں نہایت فائدہ مند ہیں۔ مثلاً پرانی پیچش یا برانکائٹس میں انکو کہلانیس انفلا میشن رک جاتا ہے اور رطوبت ممبرین مذکور کی یعنی آؤن یا بلغم ہی کم ہو جاتی ہے۔ اس واسطے مرض ڈسٹنری میں۔ کاربونٹ اف سوڈا۔ اور گرم بانی کی بچکاری کیا کرتے ہیں اور مرض برانکائٹس یعنی کھانسی کی دوا میں بھی کاربونٹ اف سوڈا۔ یا لائیگو اور پوٹاسی ملایا کرتے ہیں۔ علاوہ ان چونکہ اس قسم کی ادویات کا خاص فائدہ یہ ہے کہ اسے کھانسی ترشی دفع ہوتی ہے اسلئے بچوں کی بیماری میں یہ علی الخصوص مفید پڑتی ہیں۔ انٹریو سوزش میں یعنی پیچش کی بیماری میں تو ہم نے بار بار ان ادویات سے بہت فائدہ اٹھایا ہے معہ کی خدائش اللہ دفع ہوتی ہے اور اکثر علامات تکلیف دہندہ جو مرض پیچش اور اسہال میں پائی جاتی ہیں اس قسم کی دوا سے بھی رفع ہو جاتی ہیں درد اور تشنج انٹریو کا موقوف ہو جاتا ہے اور حرکت انٹریو کی حالت اصلی پر آ جاتی ہے کھار ادویات کو استعمال سے مرور بہت جلد دفع ہو جاتا ہے اور نہایت دستون کی بدل جاتی ہے اور

اور یہ کہ افیون کے استعمال کر نیے سوزش دماغ کی بڑھ جاسکتی ہے سچو نکو
 کہا لسنی کی بیماری میں جب کہا لسنی یا دم لینی میں تکلیف یا تشنج ہوتا ہے
 تب افیون کے کھلا نیے وی علامات اکثر ملتی ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ
 بالکل رفع بھی ہو جاتی ہیں۔ اس یو سطر ہمراہ کہا لسنی کی دوا کے قدرے
 لاڈنم یا ڈورس پاؤڈر کی ملا دینی سے فائدہ ہوتا ہے اور حقیقت میں اس
 ترکیب کے کرنے سے معده کہا لسنی کی دواؤں کو قبول بھی کر لیتا ہے۔
 جو جو بیماریاں معده اور انٹیرلون کی سوزش سے تعلق رکھتی ہیں خواہ وہ
 سوزش بباعث ہمدردی عضو دوسرے کے ہو یا نہ ہو اور بیماریوں کی لئے افیون
 ایک بڑی معتبر دوا ہے اور امراض مذکورہ کے قسم شدید میں جب افیون کا
 استعمال کرنا منظور ہو تو اس مقدار میں دینا چاہئے کہ جسم میں اثر اس قدر
 کما حقہ نمایاں ہو جاوے اور یہ بات عیان ہے کہ سچو نکا اسہال جب
 کسی دوا سے رفع نہیں ہوتا ہے تب ایک یا دو یا تین قطرہ لاڈنم کا
 تین یا چھ یا بارہ منٹے کر سچہ کو بھکاری کر نیے اس بیماری کو فوراً شفا
 ہو جاتی ہے جس وقت افیون کا استعمال کرین اس وقت اس بات کا
 خیال ضرور رکھیں کہ سچو نکو افیون کی برداشت بہت کم ہوتی ہے مان با۔
 استعمال افیون کے ہم اور بات یہ بتلانا چاہئے ہیں کہ سچو نکو جب افیون کی
 منظور ہو تب کوئی ایسے مرکب کا استعمال کرین جس میں مقدار افیون کے
 ٹھیک اور درست ہو مثلاً کہا وند ٹینکچر اف کفر یعنی بار اگر کرک اور ٹینکچر
 اف اوپیم یا ڈورس پاؤڈر سے لیکن بہ نسبت لاڈنم کے کہا وند ٹینکچر اف
 کفر کا استعمال بہتر کیونکہ یہ مرکب بہ نسبت اکثر کے تیزی میں کم اور آہستہ
 کی قدر غلطی سے زیادہ بھی دیا جاوے تو چنداں ضرر متصور نہیں ہے

تو نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے کرنا چاہئے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سونا بچوں کے
 لکڑیسا پردہ ضرور ہے کہ جیسا کہانا۔ پس حالت بیماری میں بچہ کو اگر مینہ
 آجادی تو اس وقت اسکو ایک نوع کا آرام آجاتا ہے اور یہ بات سوا
 افیون کے اور کسی دواسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے شدت اقسام طرح کی
 علامات خوفناک کے مثلاً چیخا یا تشنج کا ہونا افیون کے کہلانسی کم جاتی ہی
 اور جو سبب اون علامتوں کا کسی مقام کی خراش یا سوزش ہو تو اسی دواسے
 وہ بھی رفع ہو سکتی ہے جب اس مطلب کے لئے ناکار کا ٹک دوا کا استعمال
 کیا جاوے تو پہلے اس خراش کے سبب کو دریافت کر کے اوسکے دور
 کرینگی کوشش کرنی چاہئے۔ مثلاً اگر مسوڑوں کے پھول جانیسی سچہ چیخا
 ہو یا اوسکو تشنج ہو تو مسوڑے کو چیر دینا چاہئے اور امراض سوزشی میں
 یہ قاعدہ سستہ ہے کہ قبل از استعمال کرنے ادویات مسکن کے تنفیہ ضرور
 کرنا چاہئے مثلاً بعض دفعہ جب انفلا میٹن سیرس ممبرین میں ہوتا ہے۔
 یعنی مرض بلوریسی یا پی ریٹونائٹس میں تو بعد فصد کے افیون کا استعمال
 کرینی انفلا میٹن اکثر رک جاتا ہے اور علی ہذا القیاس دماغ کی خراش یا اسکے
 پردہ کی سوزش یعنی مرض می۔ نجا میٹس میں بھی بعد تنفیہ کے افیون کا
 استعمال کرنے سے بیا رکو آرام و چین آجاتا ہے لیکن اس حالت میں فوینکھی
 استعمال کرنے میں نہایت احتیاط اور ہوشیاری درکار ہو سکتی ہے کہ بچہ کو
 دماغ میں جب خراش ہوتی ہے تو دفعتاً اوس مقام میں سوزش پیدا ہوتی
 ہے اور سوزش کے ہونے سے دماغ میں بافی پیدا ہوتا ہے مگر مرض حالت
 خراش میں افیون کے کہلانسیے با تو علامات مرض مذکور بڑھ جاتی ہیں
 باوے ایسی قشایہ ہو جاتی ہیں کہ انہیں امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے

کرنا چاہیے اور میسرے مہینی میں فی خوراک میں آدھا قطرہ لاڈ غم کا کھلا سکتے ہیں
 اور چھ مہینی کی عمر میں ہر خوراک میں ایک قطرہ لاڈ غم دے سکتے ہیں اور
 بعد گزر جانے ایک سال کے دو قطرہ کھلا سکتے ہیں۔ ٹینکچر کفوری کہا جاتا ہے۔
 جسکو بارہ گورگ الگزر بھی کہتے ہیں بہ نسبت لاڈ غم کے زیادہ سٹینڈ اور
 کم نار کاٹک ہے اور ہلکا بھی ہے بس خوراک اسکی بہ نسبت لاڈ غم کو ٹنگنی
 اور حقیقت میں جب کہا منی موجود ہو تو لاڈ غم کا استعمال نکر کے اسی
 مرکب کو برتنا چاہئے۔ ٹینکچر۔ اوپیاٹی۔ اموننی۔ ٹا جاسکو اسکاچ باراکورک
 بھی بولتے ہیں۔ اچھا مرکب ہے۔ مثلاً جب شکم میں نفخ رہے اور اس با
 درد اور شنج ہو تب اس مرکب کو ہمراہ کسی کارملی نیو۔ کسچر کے ملا کر استعمال
 کر سکتے ہیں۔ خوراک اسکے بہ نسبت لاڈ غم کے ڈگنی ہے بچوں کو لے ڈورس
 باؤڈر بھی ایک ہلکا مرکب ہے اور بہ نسبت دیگر مرکبات اموننی بچوں کو اس
 مرکب کی زیادہ برداشت ہے۔ ابتدا سے تین مہینے کی عمر تک فی خوراک میں
 چوتھائی یا نصف گرین ڈورس۔ باؤڈر کا دنیا چاہئے اور بعد گزر جانے
 ایک سال کے ایک یا دو گرین تک دے سکتے ہیں۔ اس بات کو ضرور یاد رکھنا
 چاہیے کہ کہاؤنڈ باؤڈر۔ اف۔ چاک۔ ویٹہ۔ اوپیم۔ بچوں کو لے بڑی
 تیز دوا ہے اسلئے اسکو نہایت ہوشیاری سے استعمال کرنا چاہئے خوراک
 اسکی یہ ہے کہ چھ مہینے کے بچہ کو آدھی گرین سے ایک گرین تک دینا
 چاہیے اور بعد اوس مدت کے دو گرین تین مرتبہ دینا اور بعد گزر جانے
 دو سال کے چار گرین تک دے سکتے ہیں۔ نار کاٹک دوا کو جلد بہت ہی لشر
 کرنے سے فائدہ ہوتا ہے برا اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ بچوں کی جلد
 نہایت ملائم ہوتی ہے غرض جب کوئی دوا نار کاٹک اسپرلش کی جاوے

ایون کا انرجیم پر حقدر جلد نمایان ہوتا ہے اس قدر سیرپ - اف - وناٹ - باپیر
 پاؤرس - پاؤڈر کو کھلا مشی نہیں ہوتا اگرچہ خوراک انکی ایکھی ہے جب
 کوئی مرکب ایون کا کھلانا منظور ہوتا ہے تو سیرپ اف باپیر کو اکثر برتنا
 کرتے ہیں۔ لیکن اس مرکب میں کئی برائیاں ہیں ایک تو یہ کہ اس میں مقدار
 ایون کی ٹھیک نہیں ہے۔ دوم یہ کہ یہ مرکب جلد بگڑ جاتا ہے۔ سوم یہ
 کہ اس میں اکثر ملاوٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ مرکب نہایت خالص اور اچھا ہو تو
 اس کے فی آونس میں ایک گرین ایون کی ہوتی ہے۔ پس اس کے باقطر
 میں ایک گرین کا سولوان حصہ ایون ہے کہ جو قریب ایک بونڈ لاڈ نم
 کی ہے اور اسی مقدار کو ایک خوراک میں پانچ یا چھ ہینے کی سچہ کو دینا چاہی
 ایک یا دو مہینوں کے سچہ کو لاڈ نم کی ایک بونڈ کا آٹھواں یا چوتھا حصہ سے
 زیادہ نہ دینا چاہیے۔ بعض دفعہ تو اس قدر کم مقدار کو کھلا مشی بھی سچہ کو نشہ آجاتا
 ہے بہت اچھی اور بلا خطر ترکیب سچہ کو ایون کھلانے کی یہ ہے کہ لاڈ نم
 کو ساتھ شیرہ کے ملا کر بلاوین نسخہ مرقومہ ذیل کے طور پر اس نسخہ سے خوراک
 میں صحیح مقدار ایون کی بخوبی معلوم ہو سکتی ہے +

نسخہ

شکریا ہوا بانی ————— ایک آونس

میوسج ————— آدھا آونس

شیرہ ————— آدھا آونس

لاڈ نم ————— ایک قطرہ

سب کو ملا کر مقدار ایک مچھ جاسے کے جبک چین نہ پڑے آدہ آدہ گھٹا کر بعد
 بلاوین جب سچہ دو مہینوں کا ہو جاوے تو مقدار مذکورہ بالا کا دونا استعمال

پاک ہو جاتی ہے اور قبض رہتا ہے یا جانہ سفید آتا ہے جلم غر ہو جاتا ہے۔
 چہرہ ہیکا پڑ جاتا یا دب جاتا ہے اور انگلیوں کے پٹوٹے سرخ اور پھول جاتے
 ہیں جب ایسے سچو نکاح علاج کرنا پڑے تب حکیم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے
 کہ گو عادت مذکورہ بالا مضر ہے پر یہم ایک ایسی عادت ہے کہ بلا تحلیف اور ضرر
 کے اس عادت کو ایک بیک چڑا نہیں سکتے کسکھ کر اس بات سے بچ کر نظام عصی
 میں فتور برپا ہو کر سارے جسم میں تشنج ہو جاسکتا ہے۔ اور سچہ مرہی جاسکتا
 ہے۔ تمام مسکن ادویات سے افیون بہت سیلج النایفرا اور تیز دوا ہے خاصکر
 جب یہم دوا ان سچو نکاح دی جاتی ہے جبکی عمر صرف کئی مہینے کی ہو۔ پس
 اس صورت میں نہایت احتیاط سے اس دوا کو کھلانا چاہئے لیکن جب اس دوا کے
 شروع کرنے کی ٹھیک مقدار معلوم ہو جاوے اور یہم بھی دریافت ہو جاوے
 کہ کقدر جلد اس مقدار کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور کتنی دیر تک دوا اثر جسم
 پر رہتا ہے۔ تب البتہ استعمال افیون کا بی خوف و خطر کر سکتے ہیں۔ بعد کھلانے
 پہلی ہی خوراک افیون کی یہم بات کہہ دینی چاہئے کہ جب تک دوا علامات نہ
 لوٹیں جب تک رفع کر نیچے لے کر افیون کھلائی گئی تھی تب تک دوسری خوراک
 افیون کی نہ کھلانی چاہئے۔ اکثر یہم بات ہوتی ہے کہ بعد کھلانی پہلی ہی خوراک
 کے سچہ فوراً سو جاتا ہے اور چار یا پانچ گھنٹے تک جب تک اثر اس دوا کا
 رہتا ہے سچہ سوتا رہتا ہے پس جس دوا میں افیون ہوا اسکی خوراک کم از
 تین یا چار گھنٹے کے بعد نہ دینی چاہئے اور عموماً تو ایسی دوا کا صرف دینا یا
 ۳ مرتبہ دینا کافی ہے لیکن بعض اوقات مثلاً بیضہ کی بیماری میں افیون کو بعد
 ایک ایک یا آدہ آدہ گھنٹے کے کھلانا پڑتا ہے۔ اس صورت میں اسکے اثر کا
 خیال رکھنا چاہئے۔ واضح ہو کہ لاؤنم۔ یا بلوس کرٹیا کپا زیتا۔ کم۔ او جو ک کھلائی

مرضِ کروہ میں سیلاب کا استعمال کرنا اسلئے نہایت ضرور ہے کہ پیدا ہونا لگتا ہو کہ
موقوف ہو جاوے اور انٹریوٹکو سوزش میں بھی سیلاب بہت فائدہ مند ہے
پرائی پیچش اور اسہال میں جب علامات سوزش کے بالکل رفع ہو جاوے
تو اس حالت میں بارہ کا استعمال مضر ہے اور حقیقت میں امراض دماغ میں بھی خمیر
سیرم یعنی آب خون تراوش ہوتا ہے قبل از استعمال کرنے سیلاب کو اسباب کی
تفحص کر لینی چاہئے کہ آیا امراض مذکور خاص سوزش کے سبب میں یا باعث
انکا اسکر فیولا ہو کس لئے کہ اکثر اسکر فیولا کی بیماری میں استعمال سیلاب
نہایت ضرر مقرر ہے۔ اول تو استعمال ہی نہ کرنا چاہئے اور جو استعمال کیا بھی
جاوے تو نہایت احتیاط درکار ہے اگر جسم میں آثار مرض اسکر وی کی باقی
جاوے تو بھی بارہ نہ کھلانا چاہئے۔ اسکر فیولا کی بیماری میں کہ جس میں
انگو کی گلیان پھول جاتی ہیں اور انہیں زخم پڑ جاتے ہیں تو بہت ہی کم مقدار
کروسیو سلینٹ کا ہمراہ سار سا پیرلا یعنی گھنٹہ کے کھلاشنے گلیان چوٹی
ہو جاتی ہیں اور زخم بھی خشک ہو جاتے ہیں جب تک انٹیل کا استعمال ہوتا
ہے۔ تب تک پٹیاب زیادہ زیادہ آتا ہے اور بچانہ اکثر سبز رنگ کا نکلتا ہے +

ادویات مسکن

اس قسم کی دو انگریزی میں سڈیٹو بولتے ہیں واضح ہو کہ حالت بیمار
میں سچو نکا مزاج چڑچڑا اور انکا زوس سٹم یعنی نظامِ عصبی ادنی سی
بات میں درہم برہم ہو جاتا ہے ایسا طور ادویات مسکن کے استعمال سے
انکو نہایت فائدہ ہوتا ہے۔ سچو کونار کا ٹمک یعنی نشہ آور ادویات کا
عادی بنادینے سے اقسام طرح کی برائیاں ظہور میں آسکتی ہیں چنانچہ
افیون کھانکی عادت پڑ گئی ہے انکی اشتہا یا تو بالکل جاتی رہتی ہے

کیا لوکل کو ہمراہ ادویات اکسپیکٹورنٹ یعنی دافع بلغم کے یا مرکبات انہی مونی کے
 ساتھ دیا کرتے ہیں۔ اور جب سوزش انٹریون میں ہوتی ہے یا جب یہ خوف
 ہوتا ہے کہ بارہ بذریعہ دستوں کی نکل جاویگا تب کیا لوکل کو ہمراہ کسی مرکب
 ایفون کے چنانچہ اکثر ڈورس باوڈر کے ساتھ دیا کرتے ہیں یا بعض کیا لوکل
 اُن صورتوں میں مرکبوری و تہہ چاک کا استعمال کرتے ہیں اور جب سوزش
 بہت شدید ہوتی ہے یا کسی ایسے مقام میں ہوتی ہے جسے دماغ یا گلو میں
 یا جب سوزش مذکورہ بہت دون کی ہوتی ہے جیسے کہ انک مائیڈروکلس
 یعنی استفا الراس تب ماسوا کہلانے بارہ کی سیاب کی مالش بھی کرتے ہیں
 تاکہ جسم پر بارہ کا اثر جلد نمایاں ہو جاوے اور شدید بیماریوں میں تو اس
 ترکیب کو خاطر خواہ آزمانا چاہیے اگرچہ نہایت چوٹا بھی ہوتا ہے مگر مضائقہ
 نہیں اگرچہ بچہ کا منہ نہیں آتا ہے پر دہن او سکا گرم ہو جاتا ہے کہ جتنی
 یہی معلوم کرنا چاہیے کہ اثر بارہ کا جسم پر بخوبی ہو گیا ہے اور یہ کہ موقوف
 کرنا یا جاری رکھنا استعمال بارہ کا بھی اسی علامت پر منحصر ہے۔ واضح ہو
 کہ اسٹرانگ مرکبوریٹل اینٹینٹ کا ایک سکرول سے آدھی ڈرام تک اون
 بچوں میں بخوبی مالش کر سکتے ہیں جنکی عمر ایک سال کی ہو چکی ہو مگر کئی
 و تہہ چاک کا استعمال خاص کر اوسحالیہ میں کرتے ہیں کہ جب بچہ اسہال میں
 مبتلا ہو۔ اس صورت میں خوراک اوسکی حد تک گریں سے زیادہ ہونی
 چاہیے یا ہمراہ ایفون کے ساتھ دوا کو کہلانا چاہیے ایسی سوزش میں کہ جان
 اجتماع لف یا سیرم کا اندیشہ ہے بعد تنقیہ کے سیاب کا استعمال کرنے سے نہایت
 فائدہ ہوتا ہے اور جو سوزش ہو اکی نلیوں میں ہو جا یا کرتی ہے مثلاً
 مرنس برانکائٹس سو اسٹین اکثر سیاب کو کہلانے کی احتیاج نہیں ہوتی لیکن

کا وٹنٹر۔ اری۔ میٹیشن۔ کیا تو مل کھلا کر انٹریون میں سوزش پیدا کرتے ہیں و جب دست متعین اور بد رنگ آتے ہیں تب بھی گاہے بارہ کا استعمال کر کے اون علامتوں کو رفع کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ کل مرکبات سیاب سی سچون کی بیماری میں کیا تو مل کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں اور خاص کر امراض سوزشی میں کیا تو مل اکثر کھلایا کرتے ہیں۔ بلوئل اگرچہ فائدہ مند ہی ہے سچو نکو اکثر کم دیا کرتے ہیں اور جب دیتی بھی ہیں تو کسی عرق میں گھول کر دلاتے ہیں۔ مائیدار جیرم۔ کم۔ کرٹیا۔ بارہ کا ایک بہت ہلکا مرکب ہے اسیدو اسطر اور چونکہ اس میں گھریا مٹی ایک دوا۔ انٹاسد موجود ہے اس لئے اسکو دس من وقت دیا کرتے ہیں کہ جب دستوں میں تیشی پائی جاتی ہے۔ لیکن واضح ہو کہ مصنف نے اس بات کو بارہا آزمایا ہے کہ مائیدار جبرائی۔ کم۔ کرٹیا کے کھانیسی سچو نکو ہمیشہ فی ہوا کرتی ہے اس لئے اوسنہ اب اس دوا کو بالکل ترک کر دیا ہے جب دست لانا منظور ہو تو کیا تو مل کو مقدار چوتھائی یا ایک یا حد دو گرین تک کھلا کر اکثر دیا تین گھنٹہ بعد روغن بید انجیر یا اور کوئی جلاب دیتی ہیں اور کیا تو مل کو جو اکثر دیتے دوا کے ہمراہ دیا کرتے ہیں تو اسی واسطے دیتی ہیں کہ اول کا عمل جلد ہو جاوے اور جب کیا تو مل کو ہمراہ اسکوئل یا ابی کے گیوانا یا جیمس پاؤڈر کی دیتی ہیں تب واسطے دفع بلغم یا پسینہ لانی کے لئے دیتی ہیں ان مطالب کے حاصل کر سکیں لیکن کیا تو مل کو مقدار چوتھائی یا نصف یا ایک یا حد دو گرین تک دو دو یا تین گھنٹے بعد دیا کرتے ہیں۔ اسیطورہ ہر اور انہیں دوا کے ہمراہ ملا کر امراض سوزشی میں بھی مطابق مقام اور حسب اشتداد سوزش کے کیا تو مل کو بڑا کرتے ہیں جب انچ جب دماغ میں سوزش ہو تو کیا تو مل کو ہمراہ مسہلات کو دیتے ہیں اور جب سوزش پہنچ رہی ہو اکی نیون میں ہوتی ہے تب یا بخار سوزشی میں

اس دوا کو کہلائیے جو نیکہ سچو نیکہ منہ نہیں آتا اسلئے شدید سوزش کی بنا پر
 بارہ کا استعمال بلا اندیشہ ہم نہیں کر سکتے کس واسطے کہ بارہ کی استعمال سے
 جب منہ آتا ہے تو اس علامت سے ہم یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ انر سیاہ
 کا سارح جسم میں اب کما حقہ ہو گیا لہذا اب اس دوا کو موقوف کر دیتے ہیں
 پس جو انون کے انفلایشن کی بیماریوں میں انکے روکنے کے لئے بارہ کا استعمال
 جس طور سے ہم نے خطر کر سکتے ہیں اس طور سے سچو نیکہ منہ کہلا سکتے کیونکہ
 جو انون میں ایک بات مقرر یہ ہے کہ جب انکو منہ آجاتا ہے تب ہم اس دوا کو
 موقوف کر دیتے ہیں لیکن سچو نیکہ ہماری رہ نمائی کی لئے یہ علامت نہیں پیدا
 ہوتی ہے۔ گو یہ بات درست ہے کہ بارہ کے کہلائیے سچو نیکہ منہ نہیں آتا
 پر یہ بھی ضرور یاد رکھنا ہے کہ مرکبات سیاب کی استعمال سے سچو نیکہ رنگت اور
 مقدار اور بہت بدل جاتی ہے اور علی ہذا القیاس پسینہ اور تھوک بھی
 اس دوا کا اثر نمایاں ہو جاتا ہے اسی واسطے مرکبات سیاب کو پسینہ لگ
 والی اور بلغم دفع کرنے والی اور دواؤں کے ہمراہ استعمال کرتے ہیں۔ واضح
 ہو کہ سچو نیکہ سب سے زیادہ فائدہ سیاب کا یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تھانا دینا
 بدل جاتا ہے اور صفر از زیادہ اخراج پاتا ہے۔ بعض حکیم سہلے لئے
 سچو نیکہ ہمیشہ کیا تو مل ہی کہلا یا کرتے ہیں لیکن یہ انکی غلطی ہے کسلئے
 کہ اگرچہ کبھی کبھی کیا تو مل کے استعمال کے فائدہ ہوتا ہے تاہم اس دوا سے
 ہمیشہ انٹریون میں سوزش پیدا ہو جاتی کا خطرہ رہتا ہے اور جو برابر
 اسی دوا کو کہلا یا جاوے تب تو انٹریون میں ضرور سوزش پیدا ہو کر سچو کو مروڑ
 کر ساتھ سبز رنگ کو دست آویں گے اور وہ کمزور اور مزاج اور نکا چڑچڑا
 ہو جاوے گا۔ لیکن ان بعض فائدہ دماغ کی بیماریوں میں بطور امالہ سوزش یعنی

اور پ لازمی یعنی یہی ٹنٹ فیور کو بھی فائدہ ہوتا ہے +

سیما

امراض صبیان میں مرکبات سیما بہایت سیرج التا شیرین اور اگر ساتھ احتیاط
کو استعمال کئے جاویں تو نہایت مفید ہی ہیں لیکن بی احتیاطی سے اولکھا
کہلانا مضر ہے نہایت چھوٹی بچہ کو بھی بلا ضرر بار اکھلا سکتے ہیں اور حقیقت
میں اس دوا کی برداشت جس قدر بچہ نکو ہوتی ہے اور قدر بچہ انون کو
نہیں ہوتی لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے
کہ بچہ نکو حقدہ جائیں بارہ کہلا دیویں کسلے کہ اگر بے اندازہ بارہ کہلایا
جاوے گا تو کبھی نہ کبھی اثر بد او سکا ضرور ظاہر ہوگا ایک عجیب بات اس دوا
میں یہہ بائی جاتی ہے اور یہہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ انکے استعمال
سے بچہ نکا منہ نہیں آتا۔ فی الحقیقت نہ ہمنو کبھی ایسا دیکھا اور نہ کسی باب
میں اس امر کا ذکر ہے۔ اور تجربات ڈاکٹر کلارک صاحب سی ہی یہہ
بات ثابت ہے کہ تین سال سے کم عمر کے بچہ نکا اس دوا سے ہرگز منہ نہیں
آتا اور تین یا چار سال کے بچہ نکا منہ لانا بھی کچھ آسان نہیں ہے۔
وضیح یہہ ہے کہ چھ یا سات سال یا اس سے زیادہ عمر کے لڑکوں کو اگر بی اندازہ
بارہ کہلایا جاوے تو دفعتاً منہ شدت سے آجاتا ہے اور خاصکر یہہ بات
تبہی زیادہ بائی جاتی ہے کہ جب بچہ یا چھک کے سبب بچہ نہایت دبلا ہو
جاتا ہے۔ شدت سے منہ کا آنا ایک مہلک بیماری ہے جسکو اصطلاح انگلشیہ
میں کنگریم اور سیس مرکبوریٹی بولتے ہیں۔ مرکبات سیما کے بار بار استعمال
کرنیے یہہ ہی ایک بُرائی ظہور میں آتی ہے کہ ایام شباب ہی میں وہ
شخص لاغر اور دبلا ہو جاتا ہے اور یہہ کہ اوائل عمر میں اس کے دانت گرے ہوتے ہیں۔

دوسری ہلکی غذا تجویز کر کے بچہ کو بار بار بلا دین۔ حالت کمزوری میں یا جب بچہ کسی مرض شدید سے آرام پانے لگے تو بعبوض ادویات مقوی کے غذا مقوی کافی ہو سکتی ہے بچہ نکی بیماری کو تبدیل ہوا سے اس قدر فائدہ ہوتا ہے کہ مدتوں کی بیماری بھی چند روز میں رفع ہو جاتی ہے اور تبدیل ہو کسی دوسرے شہر کی ہو سکے تو بچہ کو صرف ہوا خوری کروانی سی یا مکان کے کسی اونچی اور ہودار کوٹھری میں نقل کروانے سی بھی اکثر فائدہ ہوتا ہے درباب ہوا کی ہم یہ التجا کرنے ہیں کہ بچہ کو ایسے مکان میں رکھیں کہ جہاں ہوا کی آمد و رفت ہو اور وہ مکان بھی معتدل ہو یعنی نہ تو زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بچہ کسی مرض دماغ میں مبتلا ہو یا جب کسی دماغ کی بیماری سے رو بصحت لاتا ہو تو ایسی جگہ کو فضا روشنی اور ہوا میں نکالنے سی نقصان منقول ہے۔ علاوہ ازیں اسکا لیتور ہوا خوری کروانیسی بچہ تک جاسکتا ہے۔ پس ہماری یہ راہی ہر کہ جس مکان میں بچہ ہو اوسمیں ہوا اس طور سے داخل کریں کہ وہ مکان روشن ہو جاوے اور یہ کہ وہ مکان شور و غل سے بھی محفوظ ہو۔ اور بعد پانے صحت کی بھی بچہ کے صرف چند قدم کی ہوا خوری پر اکتفا کریں۔ اور نہ اوس حالت میں سفر دور و دراز کا واسطے تبدیل آب ہوا کی اختیار کریں۔ کیلئے کہ اگرچہ بچہ کو صحت ہو گئی ہے پر ہنوز وہ کم طاقت ہی ہیں اسکا لیتور نقل و حرکت سی بچہ دوبارہ اوسی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے بعض امراض سینہ میں خاک صکر اگر دیر بیت نوٹھی ہوں مثلاً اگر انگ بکائیتر یعنی برانی کہا نسی یا ہونگ کاف تو اکثر اوقات تبدیل ہوا سے نہایت فائدہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ہوا کی بدل دینی سے اسہال اور پیش

اوس سفوف کی ۱۰ گرین سے ہرگز زیادہ ہونی چاہئے اور یہ کہ جب کبھی
 سفوف وزنی اور دیر سے حل ہو نیوالا ہو تو اسکو ایسے بدرقہ کو ساتھ
 دینا چاہئے کہ جو اس قدر گاڑھا ہو کہ سفوف مذکور اوس میں تیرتا رہے
 اور نہ نشین ہو جو دسے تاکہ پنی کے وقت سبکا سب سہنے میں داخل ہو جاوے
 یا درکھنا چاہیے کہ خوراک عرقات کی ایک ڈرام سے دو ڈرام تک ہونے
 چاہیے۔ اطفال کو اس سے زیادہ خوراک مذنی چاہئے بچہ کو ہر بیماری میں
 دوا کی احتیاج نہیں ہوتی۔ تبدیل غذا یا تبدیل ترکیب انتظام اُن ارض
 کے رفع کرنے کے لئے کافی ہے اور اکثر بیماری کو تو نہایت ہلکی دوا سے
 فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اگرچہ اکثر مرتبہ راست آتا ہے
 پر شدید بیماریوں میں ہرگز اس قاعدہ کے پابند نہ ہونا چاہئے بلکہ مجرب
 اور سریع التاثر دوا کا استعمال کر کے اُن مریض کو رفع کر دینا چاہئے
 جب کسی شدید بیماری کا علاج ساتھ تیزی کے کرنا منظور ہو تو یہ بات
 ہر ضرور ہے کہ اوس علاج میں ذرا بھی دیر نہ کرے اور اوس دوا کے
 موقوف کرنے کے عین اول وقت کو ڈھونڈ پتہ میں تاکہ کسی ہلکی دوا
 کا استعمال کر سکیں یا بیمار کو اپنی طاقت طبعی پر چوڑ سکیں یا م بیماری
 میں کچھ پذیرش موافق غذا سے کرنی چاہیے اور بہت دیر تک بغیر غذا کے نہ رکھنا چاہئے
 کسلی کہ سچ زیادہ دیر تک ہو کا نہیں رہ سکتا ہم التجا کرتے ہیں کہ ناظرین
 اس بات کو یاد رکھیں کیونکہ ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ سچے سبب نہ بانی غذا
 کو مر گئے ہیں۔ بخار اور امراض سوزشی میں بہت ہلکی غذا مثلاً آتش جوید
 چاہیے اور بعض دفعہ اوس حالت میں والدہ کا شیر بھی بعض بچہ کو مضم
 نہیں ہوتا اس صورت میں یا تو دودھ میں بانی ملا کر بلا دین یا کوکے

اگرچہ یہ نقشہ عموماً کارآمد ہو سکتا ہے پر صحیح خوراک سچونکی دوا کی تہی بخوبی معلوم ہو سکتی ہے کہ جب مختلف ادویات سچونکا اثر احتیاط سے ملاحظہ کیا جاوے چنانچہ جب ایک خوراک کسی دوا کے کہلائی سے مقصد حاصل ہو جاوے تو فوراً اُسکو موقوف کر دین نہیں تو دوبارہ اوسکو کہلا دین تاکہ مطلب جلد حاصل ہو جاوے اور خاصکر سچونکو جو وقتاً فوقتاً دوا دیتی ہیں تو اُسے یہی فائدہ ہے کہ ہر ایک خوراک کا اثر دریافت ہو سکے مثلاً سچونکو جب فیون کہلائی جاوے تو لازم ہے کہ ہر خوراک کچھ اثر کو با احتیاط تمام ملاحظہ کر کے دوسری خوراک دیوین اور انکو جب جلاب دیا جاتا ہے تو اکثر دست نہیں آتے ہیں۔ پس اس صورت میں تھوڑی سی دیر کے بعد دوبارہ اسی مسہل یا کسی دوسرے کو دینا چاہئے تاکہ جس مطلب کے حاصل کیے گئے جلاب دیا تھا۔ اوسمیں دیر نہو۔ واضح ہو کہ سچونکی علاج میں جو دوا برتی جاتی ہیں وہے تعداد میں تھوڑی سی دیر سوا اُسکے ترکیبیں اون دوا کے کہلائی کی مختلف ہیں چنانچہ سچونکو جو دوا دی جاوے اوسکو یا تو بطور عرق یا سفوف کے طور پر دینا چاہئے اور یہ بات بھی اہم ہے کہ سچون کی دوا خوش ذائقہ ہو کسلے کہ بد ذائقہ دوا کے کہلانے سے سچے کو تکلیف اور نقصان ہو سکتا ہے۔ پس اُنکے نسخہ نہیں ایسی دوا تیار کرنی چاہئے کہ جو بد بو اور بد ذائقہ نہو۔ سوا اُسکے دوا کے ذائقہ کو بدل دینے کے لئے اوسمیں شیرینی بھی ملانی چاہئے کہ سچونکو شیرینی سے نہایت رغبت ہوتی ہے اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ جو دوا سچونکو دی جاوے اوسکی مقدار بہت کم ہونی چاہی اور اس قاعدہ کے پابند رہیں کہ جب کسی دوا کو بطور سفوف کے استعمال کریں تو مقدار

ہوتا ہے پس اس امر کا جاننا کہ کس دوا کا اثر بچہ پر کس مقدار میں اور کس طور سے
 ظاہر ہوتا ہے بہ ضرور ہے کسلی کہ بعض دوا تو ایسی ہیں کہ جبکا اثر بچہ پر
 نہایت تیزی سے ظاہر ہوتا ہے اور بعض کی تاثیر ہی نہالی ہوتی ہے -
 لیکن یہ قاعدہ سب دوا کے لئے یاد رکھنا ضرور ہے کہ بچوں کو ہمیشہ دوا
 کم مقدار میں دینی چاہئے اگر حکیم اس بات کا خیال نہ کرے گا تو امراض بزرگ
 کے علاج میں ضرور دھوکا کھاوے گا درباب مقدار خوراک ادویات مختلفہ
 کے ڈاکٹر کے ہیں صاحب نے نقشہ مندرجہ ذیل تیار کئے ہیں - گو یہ نقشہ
 فائدہ مند ہو رہا ہے ہم اسکے پابند نہیں رہ سکتے حقیقت اس نقشہ
 کی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی دوا کی خوراک واسطے ایک مرد جو ان کے
 ایک ہی تو چودہ سال کے مریض کو نصف اوس مقدار کا دینا چاہئے - اور
 اگر بیمار کی عمر چار برس کی ہو تو نصف اوس کا یعنی آ - کی چوتھائی جاہی
 اور دو برس کی عمر کے بیمار کو چوتھائی کا نصف یعنی آ کا آٹھواں حصہ
 کھلانا چاہئے +

نقشہ خوراک ادویہ

خوراک واسطے ایک مرد جو ان کے	۱ - فرض کر دوا ایک ڈرام
تو سات برس کی بچہ کے لئے	۱ - ایک ڈرام کی ایک تہائی یعنی آ گرین ہو
چار برس کے ایضاً	چوتھائی یعنی بندرہ گرین
تین برس کے ایضاً	چھ حصہ یعنی ۱۰ - گرین
دو سال کے ایضاً	آٹھواں حصہ یعنی آٹھ گرین
ایک سال یا اس سے کم کے ایضاً	بارہویں حصہ یعنی بندرہ چوبیس حصہ تک یعنی
	۱۰ گرین سے چار گرین تک +

حصہ دوم

قرابادین صیان

اس مضمون کے لکھنے سے یہ مطلب ہے کہ اس میں فائدہ اور استعمال اور خوراک
 اور ادویات کا بیان ہو جو اکثر بچوں کی بیماری میں برتے جاتی ہیں
 اور وہ اس معتبر مضمون کے بیان کرنی محض فضول ہے کس لئے کہ سب
 حکیم اس بات کو مانتے ہیں کہ بیمار بچے کے لئے نسخہ لکھنا ایک امر نہایت مشکل ہے
 اور ایسے بہت ہی تھوڑے حکیم ہوں گے جنکو بیمار بچے کے واسطے نسخہ لکھنے
 کی مہارت حاصل ہے اکثر نا تجربہ کار حکیم جب بچے کا علاج کرتے ہیں تب
 بوقت لکھنے نسخہ کے مقدار دوا کی یا تو اس قدر تھوڑی لکھتے ہیں کہ جس سے
 فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ یا اس قدر زیادہ کہ جس سے بچے کی جان جاتی
 ہے۔ پس مولف نے ان باتوں کو سوچ کر اس مضمون کو کتب معتبرہ انگلیشیہ
 مثلاً امراض صبیان ڈاکٹر وینٹ صاحب و ڈاکٹر ایوان سن و ڈاکٹر نائل
 صاحبان اور ڈاکٹر جرجل صاحب اور ڈاکٹر کوئی صاحب اور ڈاکٹر منری
 اور ڈاکٹر پو صاحب سے استنباط کر کے اور جو کچھ اس سے خود مجرب پایا ہو اس کو شامل
 کر لکھنا متاں یہ بات ظاہر ہے کہ بچوں کی مزاج میں اس قدر اختلاف
 اور کسی صورت سے نہیں پایا جاتا ہے جس قدر دوا کے اثر سے نمایان

کسی کہ یہ مرض بڑا خوفناک اور بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس
 مرض کے پہلو ہی درجہ میں حکیم کا علاج کیا جادے تو کچھ بچ سکتا ہے نہیں تو
 یہ موقع بیش قیمتی مانتہ سے جاتا رہے گا تب ہزار ہوں ہندو اور عیسائی
 سب علاج کیجئے شاید ہی فائدہ ہو۔ امراض صبیان کو دریافت کرنے کے لئے موسم
 کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے یعنی والدین اگر اسباب کو جانیں کہ کونسی بیماری
 کس موسم میں زیادہ پہیلیتی ہے تو بچہ و شروع ہونی اس بیماری کو اپنے
 بچہ کا علاج کروا سکتے ہیں۔ چنانچہ ابتداء سر میں بچہ کو اکثر زکام اور
 کھانسی اور سخار زیادہ ہوا کرتا ہے اور سنت میں چھک پن گولے اور
 سرخ باد آور گرما اور برسات میں امراض شکم مثلاً اسہال پیش بخیر
 کی ترقی ہوتی ہے۔ ماوراء اسباب کی مزاج موروئی بچہ کا بھی لحاظ رکھنا
 چنانچہ بعض خاندان میں یہ بات ہوا کرتی ہے کہ جو بیماری اپنے بچہ کو
 ہوتی ہے اور بچے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں والدین کو اسباب کی
 جاننے سے صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ ان امور کا خیال رکھنے پر
 ظاہر ہونے کو وے صلاح حکیم کی لیون پر اس سے یہ بھی فائدہ ہے
 کہ اپنے بچہ کو ان امراض سے محفوظ رکھنے کے لئے حتی الوسع کوتاہی
 نہ کریں۔ جن جن اسباب عارضی سے مرض موروئی پیدا ہو سکتا ہے
 ان میں اپنے بچہ کو مبتلا ہونے ندین اور مزاج موروئی جو ایل بظرف اس
 مرض کے ہے اس کے دور کرنے میں کوشش کریں۔

حصہ پہلا اختتام ہوا

دسوان کھانسی بچہ کی واضح ہو کہ جب بچہ کو زکام ہو اور وہ کھانسی
 لگے اور آواز اس کی قدرے قلیل بیہ بھی جاوے تب ان علامتوں کا خیال رکھیں
 اور فوراً حکیم کی صلاح لین کسٹم کہ صرف زکام کو ہونے سے آواز بیہ نہیں
 جاتی ہے بلکہ یہ علامت ایک بڑی مہلک بیماری کی ہو سکتی ہے جسکو
 انگریزی میں کروپ بولتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی کھانسی ہوتی ہے جس میں
 بچہ کے حنجرہ کے اندر سوزش ہو کر ایک گاڑی رطوبت کا پردہ بن جاتا ہے
 کہ جسکے ہونیسی بچہ کو سانس لینے میں کمال تکلیف ہوتی ہے اور بعد تھوڑے
 عرصہ کے دم بند ہو کر مر جاتا ہے اکثر یہ مرض شام کے وقت خالص اور سردی
 ظاہر ہوتا ہے کہ جب بچہ کو سردی لگتی ہے اور کئی دن قبل از لاحق ہونی اس
 مرض کے بچہ زکام میں مبتلا رہتا ہے اور جب یہ بیماری لاحق ہونیوالی
 ہوتی ہے بچہ کی طبیعت ہنسے کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ بہ نسبت روکے
 چہرہ اس کا قدرے سرخ ہوتا ہے اور گاہے گاہے کھانسا رہتا ہے۔
 بعض دفعہ یہ بیماری اس طور سے بھی شروع ہوتی ہے کہ سوتی سوتے
 بچہ دفعتاً کھانسی اٹھتا ہے اور آواز کھانسی کی ایسی تیز ہوتی ہے کہ کسی
 کسی دماغ کی نمی میں کھانسنے سے نکلتی ہے اور سارا گہر گونج اٹھتا ہے
 والدہ بچہ کی اگر تجربہ کار ہو تو خواب سے چونک پڑتی ہے اور بچہ کو جب
 خواب میں پاتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ شاید میری سماعت میں فرق پڑ گیا
 ہے۔ لیکن جب تھوڑے عرصہ دماغ توقف کرتی ہے تو بچہ اوسے آواز سے
 پہر کھانسا کھانسا بیدار ہو جاتا ہے تب اور ایک علامت نئی یہ ظاہر ہو
 گی یعنی بچہ کی آواز ایسی بدل جاتی ہے کہ جیسے مرغی کا بچہ چخ رہا ہے
 والدین کو علامات مذکورہ بالا سے واقفیت کا حقہ پیدا کرنی چاہئے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ بچہ کے ہاتھوں کو سرد بانی میں ڈبوین اس ترکیب سے وہ ایک لمبی سانس لے گا اور بعد ازاں بدستور دم لیتا جاوے گا۔ روتی وقت آنسوؤں کے بہنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بچہ اپنے دل کا حال مثلاً رنج یا غم یا بد مزاجی ظاہر کر رہا ہے کسٹھ کہ جب کسی مرض کی تکلیف سے بچہ روتا ہو تو آنسوؤں نہیں نکلتی ہیں۔ اس گریہ کی احتیاط رکھیں اور دوسرے قسم کے روٹیکو خاطر میں نہ لانا چاہئے +

بلکنا۔ یہی ایک قسم کا روناس ہے جس سے بیماری ثابت ہوتی ہے بیان اسکا کچھ ضرور نہیں کئے کہ مہربان والدین اس قسم کے روٹیکو خوب پہچانتے ہیں۔ پس والدین کو چاہئے کہ بچہ کی ہر قسم کے روٹیکو ساتھ غور کر لیا جھ کرین اور دودھ بچہ کو تبھی پلاوین کہ جب اوسکو بہو کہ معلوم ہو اگر کسی اور فی تکلیف مثلاً سیکلی وغیرہ سے بچہ روتی تو اسکو رفع کرین اور جو بٹ روٹیکا بیماری ہے تو فوراً حکیم کی صلاح لین +

نوا دم لینا بچوں کا۔ بچے بڑی آسانی سے بلا تکلف دم لیتے ہیں اور بوقت تنفس کی طرح کی آواز نہیں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب پہپڑا یا ہوا کی نلیوں میں سوزش ہو جاتی ہے تب سانس بہت جلد جلد آواز ساتھ آواز کے لی جاتی ہے یا در کہنا جائیو کہ سینہ کی جتنی بیماریاں ہیں وہ اکثر بہت خوفناک ہوتی ہیں اسلئے جب حالت صحت سے دم لینے میں ذرا بھی فرق پڑ جاوے تو فوراً حکیم صلاح لیوین کیونکہ کیسی ہی سخت سینہ کی بیماری ہو اگر عین ابتدا میں اوسکا علاج کیا جاوے تو بالکل رفع ہو جاسکتی ہے۔ پس یہ بات اہم ہے کہ والدین بچہ کے صحیح دم لینے کو بخوبی پہچان لین +

سینے اوسکے رونے کے متنی اوس بچہ کو دودھ بلوایا ہے +

تکلیف کا رونا۔ یہ رونا دنیوی سبب سے پیدا ہو سکتا ہے مثلاً بچہ اگر ایک ہی کھڑے ہو کر بیٹھا لیٹا تک جاوے تو رو گیا یا اوسکا کپڑا کسی مقام جسم کو اگر دباوے تو اس باعث سے بھی رو سکتا ہے ایسے ایسی اور بھی دنیوی باعث سے بچہ رو سکتا ہے والدین اسکا خیال رکھیں اور تکلیف بچہ کی رفع کر دیں +

رونا بسبب درد کی۔ کئی طور سے دریافت ہو سکتا ہے مثلاً کوئی بچہ جو ہمیشہ کا خوش مزاج ہو اگر بد مزاج ہو کر رونے لگے اور اپنی انگلیوں کو ہمیشہ منہ کے اندر داخل کرتا رہے تو اس سے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ کوی دانت نکلنے والا ہے اور اسکا مسوڑا درد کرتا ہے اگر کوئی بچہ جبکہ ہمیشہ رونے کی عادت نہ ہو برابر روتا رہے تو اس سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ضرور کسی مقام میں اوسکے درد ہوگا تب فوراً حکیم کو بلوا کر تشخیص اور علاج اوس درد کا کر واویں۔ اگر بچہ برابر روتا رہے تو اوسکی کسی نہ کسی جگہ درد شدید ہوگا۔ اگر بچہ بار بار اپنے باؤنگو سمیٹ کر روتا رہے تو درد اوسکے شکم میں ہوگا اور جو یہ درد خفیف ہو اور بسبب زیادہ دودھ بلانے کے پیدا ہوا ہو تو مانتھوں کو الگ پر گرم کر کے اسکے شکم کو آہستہ آہستہ مالش کر دینی رفع ہو سکتا ہے اور بستان میں بچہ کا منہ لگا دینی سے نہیں رفع ہوگا۔ لیکن دند کوڑھ والا اگر شدید ہو تو اوسکے رفع کرنے کے لئے سوائے بلانے حکیم کے اور کچھ چارہ نہیں۔ اگر بسبب بد مزاجی کی بچہ چچن مار مار کر روتی تو بعض دفعہ دم اوس کا رک جا سکتا ہے اور چہرہ نیلگون ہو جاوے گا۔

کسی طرح کا اندیشہ نہیں ہے +

اٹھوان روٹا بچہ لگا۔ بچوں کے رونے سے اونکی ضروریات اور
دل کا حال معلوم ہوتا ہے والدین کو ان دونوں قسم کے رونے کی شناخت
کامل حاصل کرنی چاہئے چنانچہ جب بچہ کو بہو کہہ لگتی ہے تب کس طرح کا
روٹا روتا ہے اور جب اوسکو درد یا تکلیف ہوتی ہے تب کس طرح کا
روٹا ہے جس عورت کو اپنی بچہ کو رونے کی شناخت نہیں ہے اوسکا
یہ حال ہوتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے تب وہ یہ خیال کرتی ہے کہ اسیکو
ضرور بہو کہہ لگی ہوگی اور اس خیال سے بچہ کو خواہ مخواہ زبردستی ہے
دودہ پلا دیتی ہے نتیجہ اس نادانی کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے +
بہو کہہ کا روٹا۔ تھوڑی سی تجربہ سے پہچانا جاسکتا ہے چنانچہ بعد
بیداری کے بچہ کو بہو کہہ لگو تو قبل از رونے کے کئی مرتبہ وہ اپنی زبان
کو باہر نکالے گا اور پستانوں کی تلاش میں سر اٹھا دے گا اور ہلکے سے گادے گا
اوس وقت اوسکی نظر والدہ پر پڑے گی تو اوسکو دیکھتے ہی اٹھ بیٹھے گا اور
خوشی خوشی اوسکا دودہ پینی لگے گا۔ اور بر تقدیر اگر والدہ اوس وقت
نہ اٹھو اور ان علامتوں کو کسی نے نہ پہچانا تو بچہ کیسان بت تک تاج
کہ جب تک اوسکو دودہ نہ دیا جاوے جب بچہ کسی اور باعث سے روتا ہے
تو علامات مذکورہ بالا نہیں پائی جاتی مین اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ
جب تم اوسکو پستان دوگو تو وہ لے لے گا اور روٹا بھی اوسکا سو فوف
ہو جاوے گا مگر یہ آرام تبھی تک رہے گا کہ جب تک منہ اوس کا پستان
سے لگا رہے گا۔ جہاں منہ پستان سے اوسکو علیحدہ کر دیا تو فوراً وہ
جینچن مار مار کر رونے لگے گا کیلئے کہ بغیر مانگی اور بغیر دریافت کے

اور کیونکر نکلتا ہے۔ مثلاً اگر دستونین سده یا مسجد دودہ کے ٹکڑے کا دین یا دہست
بتلا ہو یا بالکل سبز یا سیاہ اور منعفن ہو تو ان سب نشانوں سے یہ معلوم
کرنا چاہئے کہ بچہ بیمار ہے یا درکھنا چاہیے کہ نذرست بچوں میں بچانہ کی وقت
بہت پرچ اخراج پڑتی ہے اور نہ اونکا باخانہ ساتھ تکلیف کے آتا ہے مگر
بیماری میں بچانہ کے وقت بچہ کو بہت کو نہتہنا پڑتا ہے کہ جس سے یہ نہتہ
ہوتا ہے کہ اس کے شکم میں خرابی ہے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ
دن اور رات کے اندر بچہ کو کتنے دفعہ باخانہ آتا ہے جب بچانہ مقدار میں
کم آوے یا بچہ کو قبض ہو جاوے تو سوا روغن بیدانجیر کے اور کوئی
جلاب ندین اگر ایسی چیز میں جیسے گھٹے میں پڑا کرتے ہیں یا جلاب سنا
یا المٹاس یا شیر خشت ہے بچہ کو بلا یا جاوے گا تو اور شربت ہی نقصان
منصور ہے اسکی کئی وجہیں میں مثلاً جنگ ان دو کو زیادہ مقدار
میں ندیا جاتا ہے تب تک دستک آکر جب بچہ کو دوا زیادہ مقدار میں دے
جاتی ہے تب اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس دوا کی بنیے میں بچہ
بہت ہٹ کرتا ہے اور جو جیرا پی بھی جاوے تو اسکو قوی ہو جاتی ہے
علاوہ ازیں عمل ان دوا کا بہت دیر سے ہوتا ہے اور یہ بات مشہور ہے
کہ سنا کے پنی سے شکم میں مڑوڑیکا درد ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس المٹاس
کا بھی یہی حال ہے اور شیر خشت نفاخ ہے اس کے پنی سے شکم بھول جاتا ہے
پر روغن بیدانجیر یعنی کسٹرائیل ان برائیوں سے بری ہے۔ خوراک اسکی
بہ نسبت سنا وغیرہ کے بہت ہی قلیل ہے اور یہ دوا بہت ہی سریع التاثر
ہے اسکی پنی سے مڑوڑا یا نفع ہرگز نہیں ہوتا۔ اور بر نقدیر بباعث
اختلاف مزاج کے بچہ کو کسٹرائیل کے پنی سے دست نہ بھی آوین تاہم

میں چولنا جاتے ہیں اگر اوس حالت میں نیند ہی آجادی تو بہت ہی تھوڑی
 آتی ہے۔ اگر بچہ کے کسی مقام میں درد ہو تو سوتے وقت اوسکے چہرہ پر
 نمایاں ہوگا مثلاً جو کوئی بیماری اوسکے دماغ میں ہو تو بچہ چین بچدین ہوگا
 اور دانت پیسے گا اور شکم میں خارش شہر سے لبس سکڑ جائیگی اور
 اونکو درمیان سے دانت یا سوڑے نظر آویں گے ان دونوں صورتوں میں
 بچہ بہت بفرار ہوگا اور بار بار خواب میں چونک پڑے گا۔

ساتواں پاخانہ بہت ہی تھوڑا پاخانہ اکثر سیاہ رنگ ہوتا ہے
 جو دودھ والدہ کا پہلے پیدا ہوتا ہے اوسمیں نائیر جلاب کی ہوتی ہے
 کہ جسکے بننے سے وہ سیاہ رنگ کا بنجانہ جو پیش کھٹے بعد تولد ہونے سے
 کے نکل جاتا ہے اور جو اوس دودھ سے نہ نکلے تو جلاب روغن بد بخر
 سے وہ بات حاصل ہو سکتی ہے اوس وقت سے تا زمانہ طفولیت یعنی آٹھ
 برس کی عمر تک بنجانہ بچہ کا قدرے زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ بوا سبب بہت
 کم ہوتی ہے سبب یا سبب دودھ اسمیں نہیں ہوتا اور بوقت نکلنے اس
 بنجانہ کے تکلیف یا زیادہ ریح اخراج نہیں باقی اور جب تک بچہ بندست
 رہتا ہے تب تک اوسکو دو یا تین یا چار اجابت اسی طرح کے آجاتے
 ہیں اور چون چون بچہ کی زیادہ ہوتی جاتی ہے پاخانہ کم اور سخت ہوتا ہے
 اور رنگت اوسکی میلی ہوتی جاتی ہے۔ پس جو جو باقیں درباب بنجانہ کے
 اوپر مرقوم ہوئے ہیں ان میں کسی میں اگر فرق پڑ جائے گا۔ تو
 اوسکو ضرور بیمار کہیں گے چونکہ بچہ کے بیمار ہونے سے بیشتر اوسکے بنجانہ
 میں خلل واقع ہوتا ہے اسلئے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچہ کا پاخانہ
 ہر روز ملاحظہ کیا کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس رنگ کا آتا ہے

اور کبھی پیٹکا پڑ جاوے اور سچہ دفعتاً ہوشیار ہو کر پھر غافل ہو جاوے اور دم لیتے لیتے رُک جاوے اور پھر لمبی سانسین پھرنے لگے تو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ مرض تشنج تھوڑے عرصہ میں ہونے والا ہو۔ واضح ہو کہ مرض تشنج جبکہ انگریزی میں کنوژشن کہتے ہیں ایک ایسا مرض جہلک ہے کہ جبہین سچے کے ساری جسم میں تشنج ہو جاتا ہے۔ یہ مرض باؤ گھٹنے یا آؤ گھٹنے یا گھٹنے بعد نوبت سے ہو کرتا ہے۔ جب اس مرض کی نوبت ہوتی ہے تو سچہ کنیکٹر سیدنا مانند سنج کے ہو جاتا ہے تاہم باؤن یا گھٹنے اور بالکل بیہوش ہو جاتا ہے۔ انگہین پھرانی لگتی ہیں یا اس طور سے الٹ جاتی ہیں کہ صرف انگلی سفیدی نظر آتی ہے۔ یہ مرض اکثر دہشت نکلنے وقت ہو جاتا ہے اس مرض جہلک کا مفصل حال بعد اس کے علاج کامل کے حصہ سوم میں بخوبی بیان کیا جاوے گا۔ والدین کو لازم ہے کہ اس مرض کی علامات سے واقفیت کما یغنی پیدا کریں اور بچہ دظاہر ہونی اول علامات کی کہ جنکا بیان اوپر ہو چکا ہے۔

حکیم کی صلاح لین کسلے کہ اگر اس مرض کے علاج میں ذرہ بھی دیر ہوگی تو سچہ تاہم سے فوراً جاتا رہے گا اور والدین دست افسوس متورہ جاوے کہ چٹا خواب صبح بچے جب سوتی ہیں تو کسی طرح کی تکلیف انکے بشرہ پر نمایاں نہیں ہوتی۔ بہت ہی ننہ بچے فریب تمام دن سوتی ہی رہتے ہیں اور جون جون عمر انکی زیادہ ہوتی جاتی ہے میند ہی کم ہونے لگتی ہے اور جب سونے کا وقت آتا ہے تو میجر دلیا ویسے گراؤنگو گہری میند آجاتی ہے پر نیم باتیں بیماری میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ بیمار بچہ ہانگ پر لیٹاتے وقت اکثر مٹ کیا کرتے ہیں اور اپنی والدہ کی غرض

تشخیص ہو سکتی ہے چنانچہ فرض کر دو کہ کسی بچہ کو اس قدر طاقت حاصل ہے کہ
 سید ہی گردن کئی بیٹھ سکتا ہے تو جب وہ بچہ بیمار پڑے گا تو ہرگز سر
 اپنا سید مانکر کے گا اور یہ بات تو اکثر ہوا کرتی ہے کہ دانت نکلنے
 کے ایام میں بچے بہت اپنی والدہ کی آغوش میں پڑے رہتی ہیں۔
 اگر بچہ اپنی باؤں کو ٹکٹٹ کر رہتا ہو تو اس علامت سے بہت معلوم
 کرنا چاہئے کہ اس کے پیٹ میں درد یا کچھ بی چینی ہے۔ شکم کو دبا کر تو در
 زیادہ ہو گا اور جب بچہ نہ کو ملاحظہ کیجئے تو اس کی رنگت وغیرہ کے
 بدل جانے سے بیماری شکم میں مطلق شک نہ ہے گا۔ تندرست بچے اپنے
 ماتھوں کو اکثر منہ کے اوپر نہیں لی جاتی ہیں لیکن جب اونگو سر میں کسی
 طرح کی بیماری باد رہتا ہے تو ہمیشہ اپنے ماتھوں کو سر اور چہرہ پر پھیرا
 کرتے ہیں۔ دفعتاً چونک پڑنا سونے یا جاگنے میں یہ بھی ایک علامت سر
 کی بیماری کی ہے چنانچہ یہ علامت قبل از شروع ہونے مرض تشخیص کر پائی
 جاتی ہے اور ہمراہ اس علامت کے اگر بچہ اپنے انگوٹھ کو ہتھیلی پر رکھے کہ
 دوسرے انگلیوں سے اس قدر دبا دے کہ ہتھی اور اس کی شکل کھل سکے اور یہ
 بات اگر انھشت پائین بھی پائی جاوے اور پشت پاؤں دست پر قدری
 قبل اس میں بھی ہو اور باؤں اور ماتھوں کے پہنچنے کی طرف مڑی
 ہوں تو تشخیص اس مرض کی کامل ہو جاوے گی۔ مابعد علامات مذکورہ
 بالا کے مرض تشخیص میں یہ باتیں بھی پائی جاتی ہیں کہ سر سختی سے
 پیچھ کو کھج جاتا ہے اور کسی جانب کا بازو بڑی حرکت ہو جاتا ہے اور اگر
 علامات منفصلہ ذیل ظاہر ہونے لگیں مثلاً بچہ کو میند بخوبی نہ آوے اور
 بلا وجہ چنچن مارا کر روی اور مزاج چڑچڑا ہو جاوے چہرہ کبھی تو سرخ

یعنی سوزش ہو جاتی ہے اس حالت میں چہرہ کی رنگت بدل جاتی ہے۔
 آنکھیں پھرانے لگتی ہیں بچہ سانس جلد جلد اور ساتھ تکلیف کے لہو لگتا
 اور بوقت تنفس بچہ کے سینہ کو ملاحظہ کر بیٹے سینہ کی حرکت نظر آوے گی
 اور شکم ہر دم کشی کے وقت زیادہ ہولنا معلوم ہوگا۔ یاد رکھنا جائز
 کہ قبل از ظاہر ہونے مرض تشنج یعنی کنوژن کے بھی چہرہ بدل جاتا ہے
 مثلاً اوپر کی لب کینچ جاتی اور ہنگون ہو جاتی ہے آنکھیں چشم خانہ میں
 گھومتی رہتی ہیں یا بچہ ترچھا دیکھتا ہے چہرہ کبھی تو سرخ اور کبھی پیکا
 پڑ جاتا ہے بعض دفعہ مرض مذکور کے ظاہر ہو بیٹے کئی گھنٹے یا کئی روز
 بیشتر یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پس میجر دظاہر ہونے کے اگر ان
 علامتوں کا علاج کیا جاوے تو وہ مرض بالکل ہونے پاوے گا۔
 چہارم آنکھوں کا ملاحظہ ہمیشہ کرنا چاہئے حالت صحت میں تو وہ
 صاف اور مجلا معلوم ہوتی ہیں پر بیماری میں شست ہو جاتی ہیں۔
 صبح بچہ کو جب روشنی میں نکالا جاتا ہے تو اونکی نگاہ اکثر مختلف چیزوں پر
 بہرتی رہتی ہے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ نگاہ کو کسی خاص چیز پر لگانا عادت
 سے تعلق ہے۔ پس جن بچوں کی عمر اس قدر ہو کہ اونکو وہ عادت کسی خاص
 چیز پر نگاہ پھرائی ہو گئی ہو۔ اگر وہ بچہ اس عادت کو فراموش
 کر جاوے اور اپنی نگاہ کو کسی خاص شے پر قائم نہ کر سکیں تو اس علامت
 سے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ اس بچہ کو کوئی بیماری دماغ کی ہوئی
 والی ہے +

پنجم حرکات بدنی۔ صحت میں تو بچے بخوبی حرکت کر سکتے ہیں
 لیکن بیماری میں ایسا اختلاف پڑ جاتا ہے کہ جس سے خاص اوتار رہی کو

اگر مرض مذکور پیدا ہو جاوے تو آنکھیں تپانے لگیں سر گرم ہو جاوے گا
اور بچہ اپنے سر کو یا تو والدہ کی آغوش پر رکھ دے گا یا بالمش پر اور ہر دہر
مارتا رہے گا خواب میں دانت پٹتا اور خوف کہا کر اڑتے بیٹھا اور
جینین مارنے لگتا ہے چہرہ اور خاص کر رخاڑے سُرخ نظر آتی ہیں اور ماتھے اُنکے
گرم اور پاؤں سرد محسوس ہوتے ہیں۔ باخانہ یا تو قبض یا تھوڑے
تھوڑے بدرنگ اور متعفن دست جاری رہتے ہیں +

دوم اگر بچہ کی لبت کھلی ہوں کہ دانت اور مسوڑے نظر آویں تو اس علامت
سے درد شکم معلوم کرنا چاہئے مگر یہ علامت اوس وقت پیدا ہوگی کہ
جب بچہ کو اوس درد سے بہت تکلیف ہوگی۔ پس اگر اس بات میں کچھ
بھی شک ہو کہ درد ہے یا نہیں تو شکم کو دباویں اور دقت دبانے کے
چہرہ کو ملاحظہ کریں۔ جب درد شکم باعث تداخل یا بد مضمی کے ہو
تو نوبت سے ہو اگر تاہے اور چہرہ کی علامات مذکورہ بالا کا پایا جانا اور
ہونے یا نہ ہونے ایسی درد شکم کے منحصر ہے۔ ایسے درد کو تھوڑے ہی
علاج سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ درد باعث انفلاشن
یعنی سوزش کے ہوتا ہے تب شدت اور کیساں رہتا ہے چہرہ بچہ کا ہیکا
اور بیٹھ جاتا ہے اور پاؤں کو سمیٹ کر بچہ جپ لیتا رہتا ہے۔ زبان
سبلی ہوتی ہے اور بچہ صرف سینہ کے حرکت ہی دم لیتا ہے شکم کو بالکل
حرکت نہیں ہوتی +

سیوم اگر دم لیتے وقت ناک کے انتہی جلد جلد حرکت کریں اور پیل
جاویں تو اوس علامت سے درد سینہ ثابت ہوتا ہے اور یہ علامت
اکثر تہی پائی جاتی ہے کہ جب پہلے ہی یا بعد اکی نلیون میں انفلاشن

بچہ کے جسم کو ملاحظہ کرنے سے یہ بات پائی جاوے گی کہ کل اعضا جسم کے بہری ہوئے
 گول گول گویا سانچو میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ دست و پلکے دبا نیسے یہ معلوم
 ہوگا کہ دے مضبوط ہیں۔ حالت صحت میں بچہ نکلی زبان ہنسنے سفید رہتی ہے
 اور انہیں زخم یا دانی بالکل نہیں ہوتے جلد سرد۔ اور آنکھیں مجملہ۔ سخت
 صاف اور سر سرد معلوم ہوگا۔ شکم نکلا ہوا نہیں ہوتا۔ اور سانس لینے
 میں بالکل تکلیف بھی نہیں معلوم ہوتی۔ جب بچہ سو کر اڑھتا ہے۔ تو
 چست و چالاک اور خوش مزاج ایسا کہ گویا اب ہنس پڑے گا معلوم
 ہوتا ہے اور فوراً طرف کہیل کے مائل ہو جاتا ہے سونے میں ایسا نظر آتا ہے
 کہ اوسکو بالکل آرام و چین ہے اور چہرہ پر خوشی کا نور برس رہا ہے۔

فقہہ ۲۔ آثار مرض *

اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ جو جو علامتیں صحت کی بیان کی گئی ہیں انہیں
 سے کسی میں اگر ذرہ بھی اختلاف پایا جاوے تو اوسکو مرض کہیں گے
 پر واسطے فہمائش کے ہر ایک نشان بیماری کا ہم علیحدہ علیحدہ بیان کر رہے ہیں
بشرہ۔ صحت میں تو سوا اسن چین اور خوشی کے چہرہ سے دوسرے
 بات نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن جب بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تب اوسکو بشرہ
 سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بچہ کے فلانہ عضو میں بیماری ہے مثلاً اگر
 درد سر میں بچہ مبتلا ہو تو چین بچیں ہوگا۔ اگر والدین اس علامت کو
 بردقت پہچان لیں اور اوس کا علاج بھی بروقت کر وادیں تو بچہ جس
 مہلک بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے جسکو انگریزی میں ٹائیفوئڈ کہتے ہیں
 اور عربی میں استقاراس کہتے ہیں۔ لیکن اس علامت کی احتیاط نگرانی

مرض سچون کا بچانا جاسکتا ہے والدین بچہ کو نکو نا تہ سے کہو دیتے ہیں اور یہ کہ جب بیماری احاطہ شفا سے گذر جاتی ہے تب اس کا علاج کر داتے ہیں اسلئے بندہ فی لکھنا اس مضمون کا نہایت مناسب سمجھا جو جو باتیں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر والدین اس کے محتاط ہونے اس رنج و غم میں جو ان کی لخت جگر کو مر جائیے ہوتا ہے مبتلا نہوں گے۔ بچوں کی بیماری کا کچھ ٹھکانا نہیں کبھی تہہ نہایت مار ڈالتی ہیں اور کبھی مدت تک پوشیدہ رکھ کر سچے کو ہلاک کرتے ہیں۔ ان مرضوں کو کسی حالت میں بھیج نہ سمجھنا چاہئے۔ بچہ کی بیماری کیسی ہی کیونچہ خفیف ہو اس کا علاج فوراً کرنا چاہئے اور ایسا نہ کرنا چاہئے کہ جب بیماری بڑھ کر ہلاک ہو جاوے تب اس کا علاج کر دین اسلئے کہ اس وقت علاج سے فائدہ نہوگا۔ جو جو نشان قبل از ظاہر ہونے مرض کے سچون میں بائی جاتے ہیں والدین کو چاہئے کہ اسنو واقفیت کا حقہ پیدا کریں اور جب ان میں سے کوئی بھی ظاہر ہو تب فوراً حکیم کی صلاح لین اور اپنی عقل کو دخل نہ دیں۔ واضح ہو کہ جب تک حالت صحت معلوم نہوگی تب تک بیماری نہیں بچانی جاسکتی ہے اسلئے کہ بیماری کی تشخیص کامل تہی ہو سکتی ہے کہ جب اس کا مقابلہ حالت صحت سے کیا جاوے اسلئے ہم پہلے تندرست بچہ کا حال لکھتے ہیں +

آخر صحت بیاں

فقرہ - ۱ -

صحت میں کل اعضا جسم کے اپنا اپنا کام باقاعیدہ کرتے ہیں۔ اشتہا حسبستور نہ زیادہ نہ کم ہوا کرتی ہے اور بول و براز کا بھی صحیح قاعدہ ہے

اسلئے جب بچہ بیمار ہو تو اسکو کسی ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں شور و غل نہ ہو اور دوسرا فائدہ اس بات کی کہ زمین پہ نہ بھی ہے کہ اگر بچہ کسی مرض متعلقہ میں مبتلا ہو تو اس کے علیحدہ مکان میں رہنے سے دوسری بچوں میں وہ مرض نہیں پھیل سکتا ہے۔ امراض صیان میں صفائی ہوا کی بھی بہت ضرورت ہے۔ کیونکہ متعفن ہوا کی سونگھنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اسلئے یہ بات ضرور چاہئے کہ جس مکان میں بچہ ہو اس مکان میں ہمیشہ تازگی ہوا کی آمد و رفت ہوتی رہے اور یہ کہ پوٹریا یا پنجانہ اس مکان سے کسی دوسری جگہ واسطے امتحان حکیم کے رکھ دینا چاہئے خوش واقارب کی کثرت اس مکان میں نہ ہونی چاہئے کسلئے کہ ہمیشہ اس مکان میں اونکے رہنے سے ہوا خراب ہو جاتی ہے اور یہ کہ انکو گفتگو سے بچہ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے قسم کی اور بھی بہت سی باتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن سے صاف ثابت کر سکتے ہیں کہ بیمار بچہ کے لئے والدین کی بڑی احتیاط ضرور ہے مگر انشا اللہ تعالیٰ اونکو ہم ادون بیماریوں کے ساتھ بیان کریں گے کہ جنہیں اونکا لحاظ کرنا ضرور چاہئے

مقالہ دوم

آثار امراض صیان

چونکہ اپنے اور دیگر حکماء و ن کے تجربہ سے مولف کو یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سبب نادانہ واقفیت ان نشانوں کے کہ جنکے وسیلہ سے عین ابتدائے

اوسکو محبت اور شفقت سے رفع کرین نہ کہ بیمار بچہ کو سخت دست سنا کر
 اوسکی مزاج کو درہنم و برہنم کر دیا کہ پین حکیم کے حکم کی صرف تعمیل ہی ضرور
 نہیں ہے بلکہ یہ بات بھی ضرور ہے کہ جب وہ تشریف لاوین تو بغیر شربا
 گہنائے مفصل حال مرض کا راست راست اونکو کہہ دینا چاہئے کیلئے کہ
 اگر اس بات میں ذرا بھی فرق ہوگا تو حکیم کچھ کا کچھ سمجھ کر مرض کی تخفیف
 اور علاج میں غلطی کہا جائے گا۔ حکیم کو اس قدر فرصت نہیں ہوتی ہے کہ
 پہر و ن بیمار کے پاس بیٹھ کر مرض کی مختلف علامتوں کو دیکھ سکے۔ پیشات
 اہم ہے کہ والدین جو آٹھون پہر بچہ کی خبر داری میں مصروف رہتے ہیں
 بیماری کی علامتوں کو دیکھیں اور جب حکیم تشریف لاوین تو ہو ہو کہہ
 سناوین۔ حالت بیماری میں سبب براعتدالی غذا کے بچہ کو بڑا نقصان
 ہو سکتا ہے اور احتیاط غذا کی ضرورت صرف اسی واسطے نہیں ہے کہ بیمار
 رفع ہو جاوے بلکہ بعد رفع ہو جانے بیماری کے واسطے تندرستے کامل کئے
 بھی غذا کی بڑی احتیاط چاہئے مثلاً فرض کیجئے کہ کسی بچہ نے ابھی کسی
 مرض سے صحت پائی ہے مگر مہنوز وہ ضعیف ہے اس حالت میں اگر غذا
 کی بے اعتدالی ہو تو وہی بیماری پہر لوٹ سکتی ہے یا کوئی دوسری
 بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ فی الحقیقت سوا بے اعتدالی غذا کے مریض کے
 حق میں شفا ہکلی کئے اور کوئی بات رخصۃ اندازہ ایسی نہیں ہے۔ ایسا
 سمجھنا ایک بڑی غلطی ہے کہ مرض کے رفع کرنے کے لئے صرف دوا ہی کافی
 ہے۔ اگرچہ بعض دفعہ صرف دوا ہی سے بچہ کی جان بچ جا سکتی ہے مگر
 امراض بچوں میں تداویر کی بھی بڑی ضرورت ہے مثلاً
 جس مکان میں بیمار بچہ ہو اوسکو شور و غل سے محفوظ رکھنا چاہئے اسلئے

بچہ کے دشمن ہوئے۔ فریب سے بچہ ہرگز قابو نہیں آسکتا اور فریب
 کے کر نیسے یہ بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بچہ کو دل میں حکیم کی طرف سے ہقد
 وحشت سما جاتی ہے کہ جب وہ حکیم کو دیکھتا ہے تب ہی اسے قد چنچن پاتا ہے
 کہ مرض کی خاص علامت یا تو بڑھ جاتی ہیں یا بچہ اونکو چہا لیتا ہے کہ
 جس سے حکیم اپنی تشخیص میں غلطی کہا جاتا ہے والدین کو فریب سے
 دوا بلانی نہ چاہئے بلکہ اپنی حکومت سے دوا بلایا کریں۔ مخفی نہ ہے کہ
 ایسی مرضونکو جو بہت شدید اور مہلک ہوتی ہیں دوسری بھی فائدہ ہوا ہے
 کہ جب اوس دوا کا اثر ہمیشہ جسم پر موجود رہے کیونکہ اگر تھوڑی سی عرصہ
 کے لئے اوسکا اثر ملتوی رکھا جائیگا تو بیماری ہلاک کر ڈالے گی حکیم کے علاج
 سے بچہ کو اوسی وقت فائدہ ہوتا ہے کہ جب والدین حکیم کے حکم کی تعمیل
 ساتھ احتیاط اور دردمندی اور عقلمندی کے کریں کس لئے کہ اگر تعمیل
 حکم حکیم میں غفلت ہو یا اوس حکم کا صرف تھوڑا ہی تعمیل ہو تو کیونکر
 اوس کے فائدہ ہو سکتا ہے اور جو اوسکے حکم میں کسی بیوقوف اور متصب
 دوست نے دخل دیدیا ہے تو ہرگز فائدہ نہیں ہو سکا جو جو باتیں اور کہیں
 گئی ہیں وہ باتیں خاکہ اراض بچوں ہی کے لئے راست آتی ہیں کس لئے
 کہ ان بیماریوں کا یہ قاعدہ ہے کہ یہ دفعاً ظاہر ہو پڑتی ہیں اور انہ
 فنا بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا اگر انکا علاج بھی فوراً نہ ہو اور جو دوا حکیم بتلا
 جاوین اُسکو باقاعدہ نہ کھلایا جاوے تو تھوڑی سی عرصہ میں بیمار مہتہ
 سے جاتا رہے گا۔ والدین کی احتیاط سے بچہ کی بہت تکلیف رفع ہو سکتی
 ہے اس بات کی ہمیشہ پیش بینی چاہئے کہ فلاں وقت بچہ کو فلاں بات کو
 احتیاج ہوگی اور بچہ میں جو سبب بیماری کے مٹ پیدا ہو جاتی ہے

نصیب نہیں ہوتا۔ نہوڑی نکایت کے رفع کرنے کے لئے ایک دن کی غذا کم کر دینی
 اور دیگر تدابیر خانگی کی احتیاط رکھنی کافی ہے۔ لیکن جب ان تدبیروں پر
 کچھ نہ ہو سکے اور بیماری بعض منزل کے روز بروز بڑھتی جاوے
 تو والدین کو لازم ہے کہ فوراً حکیم کصلاح لیوین تاکہ بیماری بڑھ کر کچھ سے
 کچھ نہو جاوے۔ پھر دہ بیمار ہونے سے بچنے کے خواہ او اس بیمار کا سبب ثابت
 ہو یا نہ ہو گھر کی تدبیروں پر اکتفا نہ کرنا چاہئے اور جب حکیم صاحب شریف
 لاوین تو جو صلاح وہ دیوین اُس سے سر مو فرق نہ کرنا چاہئے کیونکہ جب
 متحرک او نکو بلایا تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسپر متھارا اعتقاد نہ اسلئے
 متحرک او نکو قصد یعہ دی۔ پس عقل ہی تقاضا کرتی ہے کہ جو وہ فرماوین
 او سکول یقین جانکر او نکلی رائے کے بموجب کرنا چاہئے۔ یہ بڑی افسوس کی
 بات ہے کہ بعض اوقات کسی دوست کا ذہن کے درغلانی میں اگر حکیم جو
 کہتا ہے او سپر عمل نہیں کرتے ہیں اور اپنی دوست کی بات کو مان لیتے
 ہیں۔ کبھی دوست صادق بھی والدین کے دل سے حکیم کی اعتقاد کو ٹکارتے
 ہیں کہ تو نا ہی نہیں کرتے ہیں۔ حکیم پر یہ بڑی بے انصافی اور بیمار کے
 لئے گویا سامان موت کا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو صلاح
 حکیم دی جاتے ہیں او سپر عمل نہ کرنے کو باعث ایک اور بیماری بڑھ کر مہلک
 ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو نسخہ حکیم دی جاتے
 ہیں او سکول یا تو بہ باعث غفلت والدین کے یا سبب اسکے کہ سمجھ کو
 ہلانے میں دقت ہوتی ہے نہیں برتتے ہیں اور یہ ادنکی بڑی بے انصافی
 ہے کہ اگر بچہ کے ہٹ کو اسباب کا خوف دلا کر رفع کریں کہ اگر تو دوا
 نہ پھر گا تو حکیم صاحب نجو ایسا یا دلیا کریں گے گویا حکیم صاحب دست ہر

باب دوم

انتظام بچوں کی حالت بیماری میں

مقالہ اول

احتیاط والدین امراض صباں میں

تذابیر مفصلہ ذیل کے اگر والدین محتاط ہوں تو اونکے بچوں کو حلیہ ترصحت حاصل
ہوا کرے۔ بعض والدین اپنے بچوں کو ہمیشہ دوا پلاتے رہتے ہیں گویا انکو
سعدہ کو عطار کی دوکان بنا دیتے ہیں۔ ہمیشہ وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ بچہ
کو کی طرح کی نسکائیت ضرور ہے اور گو وہ شکایت کیسی ہی ہو سہل
سہل دیکر جاتے ہیں یہاں تک کہ اوکو حقیقت میں بیمار ڈال دیتے ہیں
تب اس مرض کے علاج کے لئے جو اونکے قصور سے پیدا ہوا ہے حکیم
بلائی جاتے ہیں۔ پس یاد رکھنا چاہئے کہ بدون صلاح حکیم کے بچہ کو
کوئی بھی دوا دینی حقیقت میں بیمار بنی کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا سمجھ
والدین کے بچہ کا امواج آفات عہد طفولیت سے بڑا بار ہونا نہایت
ہی مشکل ہے اور بدبختی ایسے بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ نثرہ شباب کا اونکو

عہد طفولیت سے قایم نہ کی جاوے گی وہ ساری عمر تک ان باتوں کا عادی نہیں ہو سکتا ہے اور جب ایک دفعہ بچہ بن میں ایسا قیام ہو چکا ہو جو بانی میں وہ شخص ہر گناہ کرے ان عادتوں کا ہرگز زوال نہیں ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے وقت اوسکے دل میں خدا کی قدرت کا خیال ڈالنا چاہئے مثلاً جس وقت باغون کی سیر کر او میں اوس وقت اشجار اور گلوں کی اونکو خوبصورتی جلاوین اور خدا کی تعریف کریں کہ جس نے اپنی حکمت کاملہ سے اونکو پیدا کیا ہے اسی طور پر اونکو اور اور مثالیں دیں۔ مان اس عمر میں مذہبی تعلیم کی بھی بنیاد رکھیں قایم کرنی چاہئے خدا کا خوف اوسکے دل میں ڈالنا چاہئے رسول کی متابعت اوسکو کرانی چاہئے یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر میں جیسی عادت ڈالے گا جو بن میں بھی وہی عادت قایم رہے گی +

باب پچھلا ختم ہوا

اور جون جون او سکی تعلیم بڑھتی جاتی ہے اور دنیا کا علم او سکو ہوتا جاتا ہے
 یہ باتیں او سکے اخلاق کے لئے آلات زبردست ہوتے جاتے ہیں جون
 آدمی میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ جس وقت حرص یا رشک دا سنگیر ہوتا ہے
 او س وقت اس کہاوت سے اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور
 اس طور سے ان عادات کو روکتا ہے پر بچو نگو اتنی سمجھہ کہاں کہ وہ اپنے
 دل کو اس طور سے سمجھا دین پہلے پہل انہیں رشک نہیں پایا جاتا ہے
 بلکہ انہیں عزت ہوتی ہے کہ جس سے بنیاد رشک کی قائم ہوتی ہے۔
 پس رحم اور شفقت کو درمیان لا کر اونکی عزت کو طول بکھڑنے نہ دینا چاہیے
 علاوہ اسکے بچو انہیں حرص نہیں ہوتا بلکہ انہیں پاس عزت کا خیال
 بہت ہوتا ہے کہ جو بنیاد حرص کی ہے غرض اس عادت کو بھی بچو کہ دل میں
 شفقت اور رحم پیدا کر کے روکنا چاہئے مثلاً بچہ کو یہ بات جلا دیوین
 کہ اگرچہ کھیلنے یا پڑھنے لکھنے میں رشک کرنا منع نہیں ہے تاہم رحم اور شفقت
 اپنے بہائیوں اور کھلواڑیوں کی طرف ہر حالت میں اس بات کے مانع
 ہیں کہ او س رشک کو ہتھ پڑے نہ دنیا چاہئے کہ جس سے اونکا جسم یا
 دل خسر ہو جاوے۔ اس ترکیب سے بچہ کی عادات جلیبی کو درست
 کر سکتے ہیں جتنی عادات ہیں سب سو اس عادت نیک سکھانا
 پر ضرور ہے کہ جس سے بچہ کی سمجھہ میں دوسرے کو حقوق آجاوین۔
 اور اعلان فیضان سے وہ جزدار ہو جاوے فیضان وہ شے ہے کہ جب
 انسان کوئی بات نیک کرتا ہے تب وہ او سکے دل کو بنناش کر دیتا ہے
 اور جب او س شخص سے کوئی کار بد سرزد ہوتا ہے تب فیضان انکو
 نہایت شرمندہ اور غمگین کر دیتا ہے بچہ میں بنیاد ان عادات کی جب تک

چاہئے کیونکہ جنکو عادت بچہ نسو واقفیت ہے وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ
 پیدائش کے روز سے اونکی مزاج میں غصہ اور محبت باہمی جاتی ہے سب سے
 پہلے غصہ پیدا ہوتا ہے زان بعد نرم و رشک اور بت رحم اور محبت برادرانہ
 ظاہر ہوتی ہے یاد رکھنا چاہئے کہ یہ جتنی باتیں اخلاق کے مابین ابتدائیں
 انکا اصل منشا پہلائی کا ہے مثلاً غصہ ایک آگ پہلائی کا اس طور سے ہوتا ہے
 کہ اس سے کسی کی زیادتی اور بے انصافی پیش نہیں چل سکتی۔ پس غصہ
 کو ہمیشہ برائے قیاس کرنا چاہئے کیونکہ ہماری مزاج میں اگر غصہ نہوتا تو
 بے انصافی اور گناہ کی طرف سے ہم کو نفرت ہوتی کہ جو بات واسطے
 بہبودی صحبت باہم دگر کے نہایت ضرور ہے غصہ سے برائی بھی ظہور پاتی
 ہے کہ جب اسکو برائی باتوں کی طرف مائل کیا جاتا ہے اسی طور پر ہمت
 نے دیگر ہوا و ہوس بھی ہماری خلقت میں واسطے پہلائی کے پیدائش میں
 پس بچہ کی تہذیب اخلاق سے ہمارا مطلب یہ ہونا چاہئے کہ اوسکی ہوا و
 حرص کو زایل کرنے کی تدبیر نکرین بلکہ ایک دوسرے کے باہم پہلائی
 کی کوشش کریں۔ یہ بات کیونکر حاصل کرنی چاہئے کہ جتنے اخلاق اچھے
 ہیں اونکو ترقی دین اور اونکے وسیلہ سے اور دن کی شدت کو جبکہ زیادہ
 بڑھ جانے سے برائی مستقر ہے روکین مثلاً جس وقت بچہ غصہ میں آوی
 اوس وقت والد کو غصہ ہونا نہ چاہئے بلکہ شفقت بردار نہ ظاہر کرے بچہ
 کی مزاج کو ٹھنڈا کر دینا چاہئے اور جن اسباب سے غصہ پیدا ہوتا ہے
 اونکو بچہ کے نزدیک نہ آنے دینا چاہئے ورنہ اس طور سے غصہ کی عادت
 پڑے گا وے گی اور جو اخلاق نیک ہیں اونکی بنیاد قائم نہ ہونے پائیکسی
 چون چون بچہ کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے نئے نئے اخلاق کا ظہور ہوتا جاتا

پہچان رفتہ رفتہ آگئی اور رضا و پر کے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تو ہر روز
 علم کے حاصل کرنے کی طرف طبیعت اس کی زیادہ تر مایل ہوتی جاوے گی
 حتیٰ کہ اگر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سبق بھی مقرر کر دوں گے تو اس کو وہ
 شوق سے یاد کر لے گا۔ **بسم اللہ** خوانی کے لئے ٹھیک عمر مقرر کرنا دشوار
 ہے کیونکہ یہ بات بچہ کی طاقت پر موقوف ہے لیکن چھ برس کے ادھر
 مکتب کرانا چاہئے کتنے وقت تک بچہ کو ہر روز پڑھنا چاہئے یہ بھی
 بات ایکایک ہے چنانچہ بچہ کو اس قدر نہ پڑھنا چاہئے جس میں وہ تھک
 جاوے اور بچہ بن یعنی آٹھ برس کی عمر تک ہر روز دو گھنٹہ سے زیادہ
 نہ پڑھنا چاہئے اور ابتدا میں ایسی باتوں کو نہ سکھانا چاہئے کہ جو بچہ کی
 سمجھ میں نہ آوین مثلاً یہ طریقہ تعلیم کا نہایت برا ہے کہ بچہ کو کرسما
 حفظ کرانا یا اور کوئی کتاب شعرا شاعری کسلے کہ اس سے ان کی حافظہ
 کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ اس کو اشیاء مختلف کی خاصیتیں سکھانی چاہئیں
 اور انہیں آپس کے اندر کیا مشابہت ہے اس کو بتلانا چاہئے اس ترکیب
 اس کے ذہن میں مطالب معینہ جمع ہونگے جو آئندہ اس کے کام میں
 آئیں گے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ آٹھ برس کی عمر تک بچہ کی
 نوشت و خواندین ہرگز زیادہ روز نہ لگانا چاہئے بلکہ رفتہ رفتہ بطور
 کہیل کے ان باتوں کی بنیاد اس کے دل میں جانی چاہئے۔ اب ہم غرض
 تہذیب اخلاق کے باب میں لکھتے ہیں۔ درحقیقت تہذیب اخلاق بچہ
 میں نہایت ننہ بن سے شروع ہوتا ہے اور دراصل اخلاق بد یا
 نیک کی بنیاد عہد طفولیت یعنی آٹھ برس سے پیشتر ہی بچہ کے دل میں
 مستحکم ہو جاتی ہے پس تربیت اخلاق کے بچہ کو عین ابتدا سے دینی

بردیکھتا ہے غرض یہ علم اوسکو دوجو اس کے مقابلہ سے آتا ہے ایک تو بنیادی
 اور دوسرا مس اور یہ بات بھی اوسکو پہچان حاصل ہوتی ہے کہ جس سے وہ
 اپنی منہبہ اور ماتہ کو والدہ کو بسنا نوٹنے کے پاس فوراً لے جاسکتا ہے بعد
 ہنوز ہی عرصہ کے باہر کی چیزوں کا اور اکل اوسکو اس قدر حاصل ہو جاتا ہے
 اور حافظہ اوس کا مطالب سے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اوسکو مختلف چیزیں
 پہچان آجاتی ہے اور اپنی والدہ اور دای میں فرق کر سکتا ہے اب یہ
 ایک بڑا ہی سوال درپیش ہے جسکا حل کرنا ایک امر نہایت نازک ہے
 وہ یہ ہے کہ کس عمر میں بچہ کو تعلیم اخلاق میں پہلانا چاہئے کیونکہ بہت
 کم عمر میں بہت جلد شروع کر دین تو اوسکی صحت میں خلل ہوتا ہے اور جو
 دیر کر دین تو اوسکی عادات جسمی کو جو ہمیشہ طرف کھیل کود کی مائل رہتی
 میں روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بچہ کے سامنے کتابیں اور تصاویر
 جب ہوتی ہیں تو اوسکو دسے نہایت خواہش سے دیکھنے لگتی ہیں غرض
 اوسکا خیال انہیں لگا دینا اور خط و حکم تصویروں کی طرف رجوع کرنا اور
 کھیل کود کے واسطے ایسا کرنا ہے جیسا جسم کے واسطے بچہ کو کسی باغ یا میدان میں
 کھیل کود کے چھوڑ دینا ہے کہ جب وہ کتابوں اور تصویروں کے
 دیکھنے سے تھک جائے گا۔ تب خود بخود چھوڑ دے گا اس امر میں تو یہ بات
 ہوتی ہے کہ بچہ از خود پھرنے اور دوڑنے سے تھک جاتا ہے اور جو کتابوں کے
 ماتہ اور باؤ میں طاقت ہوتی جاتی ہے تو نون زیادہ تر ریاضت
 میں مشغول ہونا چاہتا ہے مثلاً چولنا گھوڑے پر چڑھنا تیرنا وغیرہ اور
 اوس امر کا یہ فائدہ ہے کہ بچہ کو خود بخود حروف شناسی اور جملوں
 اور دیگر اشیاء کی شکل کی پہچان آجاتی ہے۔ پس جب اسکو حروف کی

بچہ میں ریاضت بدنی کی عادت نہیں ڈالی جاتے ہر تیک او کی تہذیب بھی
 نہیں ہو سکتی چنانچہ اسی واسطے ریاضت بدنی کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ پس اللہ
 کو اس بات سے مطلع ہونا چاہئے کہ بدن کی ریاضت اور اخلاق کی تہذیب
 اپنے بچہ کو عین ابتدا میں ہی سے سکھانا چاہئے۔ واضح ہو کہ بچہ کو بدلیش
 کے بعد نہایت کم اور اک ہوتا ہے اور بعض حواس اوس کے اوس وقت غیر متکثر
 ہوتے ہیں اور سارے حواس کا یہ حال ہوتا ہے کہ بسبب بافی تربیت کے انکا
 اثر بچہ کے دل پر درست نہیں ہوتا اور اوسکا حافظہ خالی از مطلب ہوتا ہے اور
 حقیقت میں سارے اعضا اوسکے مانند پورہ مائے کل کے کام پر مستعد ہوتے
 ہیں ہر اوس کل کے حرکت دینے کے لئے بچہ میں ہنوز طاقت نہیں ہے مگر رفتہ رفتہ
 ادراک شروع ہونے لگتا ہے چنانچہ حواس خمسہ پر چیزوں کا اثر پیدا ہونی
 لگتا ہے مثلاً آنکھوں کو روشنی کی پہچان آجاتی ہے بعد ازاں جو چیز آنکھوں کو
 سامنے پڑتی ہے بچہ اوسکو دیکھنے لگتا ہے علیٰ ہذا القیاس کانکھوں اور ذرا کی پہچان
 اور جسم کو چیزوں کا حس ہونے لگتا ہے بعد ازاں بچہ کو یہ بات حاصل
 ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا اثر اوسکے حواس خمسہ پر ہوتا ہے انکو مختلف
 افراد کو ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے اوس کا نتیجہ حاصل کر لیا ہے
 مثلاً بچہ پہلے ہی اپنی والدہ کی بیٹیوں کو پہچان لیتا ہے اور حقیقت میں بسبب
 سی پہلا علم اوسکو یہی ہوتا ہے کہ انہیں بیٹیوں میں میری غذا ہے
 اور اگر عین ابتدا میں ہم بچہ کی حرکتوں کو ملاحظہ کریں تو یہ کو یہ بتا
 جائے گی کہ اگرچہ بیٹیوں کو وہ پہلے ہی دیکھ لیتا ہے اور انکو فائدہ
 پہنچا دیتا ہے مگر وہ مہر ہو جاتا ہے تاہم اوسکو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جسم
 کے کون سے حصہ میں بیٹیاں ہوتی ہیں یعنی جب انکو وہ اپنے جسم کو مقابلہ

لہذا یہ ضرور ہوا کہ بکے دانت تعداد میں زیادہ اور دودھ کے دانت سہی
 بڑے پیدا ہوں علاوہ ہرین جب ہم بچہ اور جوان کی غذا کا خیال کرتے ہیں
 تبھی ہمو ان بکے دانتوں کے ضرورت معلوم ہوتی ہے +
 واضح ہو کہ بکے دانت اکثر ساتویں برس میں ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اوست
 دودھ کے دانت گرنے لگتے ہیں اور اکیس برس کی عمر تک پورے بتیں دانت
 نکل آتے ہیں۔ عوام الناس اس بات کو نہیں جانتے کہ ان دانتوں کی بھرپوری
 نکلنے سے چہرہ کس قدر بد صورت ہو جاتا ہے اور حکم اور تلفظ میں کتنا فرق
 پڑ جاتا ہے اور یہ کہ اوس صورت میں غذا بھی اچھے طور پر چبا ئی نہیں جا
 سکتی جس باعث بد ہضمی اور دردِ دل و دلچ و عینہ امراض شکم میں بچہ مبتلا ہو جاتا ہے
 پس جب دیکھیں کہ ان بکے دانتوں میں سے کوئی بھی ٹہرا نکلنے والا حرکت
 اوسکے درست کرنے کے لئے حکیم کی صلاح فوراً لین اور جب یہ دانت نکلنے لگیں
 تب بچہ کے منہ کو ہر روز اچھے طور پر ملاحظہ کریں اور تاکہ وہ مضبوط
 رہیں اوسکے منہ کو ہر روز کسی اچھے منجن سے صاف کرایا کریں اور ہر
 غذا کے بعد منہ کو اچھے طور پر دھلایا کریں +

مقالہ ششم

تعلیم و تہذیب صبیان

واضح ہو کہ ریاضت بدنی اور تہذیب اخلاق میں اس قدر لگن و وس ہے کہ جب تک

یاد دلول نکلنے سے بچہ کا چہرہ کیسا بد صورت ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے الفاظ
 پورے نہیں ادا ہوتے ہیں ہم چند نکتے اس امر میں بتلاتے ہیں جن سے بچے
 دانت اچھو طور پر نکلیں اور مضبوط رہیں۔ واضح ہو کہ بچہ دانت اکثر ساتویں
 برس کی عمر میں نکلنے شروع ہوتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانچویں
 سال میں نکلنے لگتے ہیں اور کبھی اس قدر دیر سے نکلے ہیں کہ بچہ کی عمر ساڑھے
 آٹھ برس کی ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم اس بات کو نکتہ چکے ہیں کہ بچہ جب پیدا
 ہوتا ہے تو اس کے جڑوں میں دو نوں قسم کے دانت کی جڑیں موجود ہوتی
 ہیں۔ ساتویں برس کی عمر تک نو دوہ کے دانت بچہ کے کارآمد بخوبی ہوتے
 ہیں۔ لیکن بعد اس مدت کے دیکھنا کارہی ہو جاتی ہیں کسلے کہ اس عرصہ کے
 خدکے لکھنو دے تعداد میں کتنی ہوتے ہیں نہ انکی ساخت مضبوط اور دیر پا
 ہوتی ہے اور نہ خدمت چھانگی اور نہ انجام پاسکتی ہے۔ اگر سات برس کی
 بچہ کے منہ میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دو دہ کے دانت بسبب بڑھنے اور پھیل
 جانے چہرہ کے بہتر گئے ہیں۔ پس یہ بات ضرور ہوئی کہ مسوڑوں کے خالی مقام
 بہر جاوین لیکن والدین سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ چون چون اور مقامات
 جسم کے بڑھتے جاتے ہیں اس طور پر دانت کیوں نہیں بڑھتے اور چون نہیں
 بڑھتے تو اسکی وجہ کیا ہے +

جواب۔ وے اس سبب سے نہیں بڑھتے کہ خدا تعالیٰ نے دانتوں کو ایسی
 خدمت سپرد کی ہے کہ جسکے انجام کو لے یہ بات ضرور ہے کہ انکی ساخت خوب
 ٹھوس اور ایسی ہو کہ جو آئندہ بڑھنے کو قابل نہوں چنانچہ اسبواسطی قبل اظہار
 ہونے کی پوری مقدار کے دانت مسوڑوں میں موجود ہوتے ہیں۔ پس جبکہ
 یہ بات ہوئی تو بچہ کے دو دہ کے دانت جو انکے منہ کے برابر کیونکر ہو سکتے ہیں

ظاہر ہے کہ اگر والدہ کا انتظام اچھا ہو نو دانت نکلنے کی تکلیف بلذریعہ ہو سکتی ہے اور بچہ والیوں کو ہم اس بات سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ حتی الوسع اپنی بچہ کو کسی اور کا دودھ نہ بلاوین اور غذا مصنوعی سے بھی اوسکی پرورش نکرین کیونکہ جو بچے صرف اپنی ماہی کے دودھ پرورش پاتے ہیں اوندکو دانت باتسانی نکلنے میں البتہ دودھ پلانے میں بہتری تکلیفین ہوا کرتی ہیں لیکن والدہ کو اس کا انعام بھی بڑا ملتا ہے کیونکہ اوسکا بچہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے اور دانت نکالنے میں اوسکو تکلیف بھی نہیں ہوتی +

اور یہ کہ جو لڑکا کسیدر یا بالکل سوا شیر مادر کے کسی اور غذا سے پرورش پاتا ہے ہمیشہ اوسکو دانت نکلنے وقت تکلیف ہو ا کرتی ہے۔ واضح ہو کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ دانت نکلنے وقت کانوں سرچہ اور دیگر اعضا جسم پر دانے نکل آتے ہیں اگر وہ خفیف ہوں تو علاج کی کچھ ضرورت نہیں ورنہ حسب مناسب علاج سے اوندکو رفع کرین اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ گلے کی گٹھیاں دانت نکلنے کے ایام میں پھول جا یا کرتے ہیں۔ اب چند اشارات دینا چکے دانتوں کے بتلا کر اس مقالہ کو ختم کرتے ہیں +

فقرہ ۲ - پکے دانت +

جب دودھ کے دانت گر جاتے ہیں تب والدین کو پکے دانتوں کا بالکل خیال ہی نہیں ہوتا چاہے وہی جسطرحہ تکلیفیں اس بات کی اوندکو دزدہ بھی پر دہ نہیں ہو اور جب دودھ کے دانت گر گئے تب بچہ کے منہ کے اندر کبھی ہولے سو رہی ہوگی نگاہ نہیں پڑتی ہے +

ماہی انفرس ہے کہ وہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتا کہ ان پکے دانت کو بقاعدہ

دست شدت سے لگ جاوین علاج مناسب سی اور سکور و کین علامتوں کے
شدت کے وقت بچہ کو باشوا کرادین جسم کو اسکے ہاچہ گرم سے ملفوف کہیں
لیکن سر کو ہمیشہ سرد رکھنا چاہئے +

چھارم بچہ کے سر کا خیال رکھیں کیونکہ دانت نکلنے وقت چونکہ خون کا
غلبہ سر کی طرف لہو جاتا ہے اسلئے سر بچہ کا ہمیشہ کھوجاتا ہے اور بعض دفعہ سبب
ایام دانت نکلنے میں سارے جسم میں شخ بھی چاتا ہے جس بچہ کے سر کو صبح اور شام لٹایا سفنج
آب سرد میں تر کر کے بوجھ دیا کریں اور اسکو ہر روز آب سرد یا گرم سے
سلطانی اور سکی مزاج یا موسم کو غسل دیا کریں اور اس بام میں سوا بار یک
ملل کے ٹوپی کے سر پر اور کچھ نہ دھریں اور بچہ کو ہوا خوری کرادین اور
ایسے مکان کے اندر اور سکور کہیں کہ جس میں ہوا کی خوب آمد رفت ہو +

پنجم شخ اگر بچہ کو تشخ ہو جاوے کہ جو اکثر دانت نکلنے کی تکلیف سی
ہو جائے یا کرتا ہے تو فوراً اسکو کمر تک آب گرم میں بیٹھا دیں اور سرد
بانی میں کپڑا تر کر کے سر پر رکھیں اور جب وہ گرم بانی میں بیٹھا ہو وقت
اسکے چہرہ پر سرد بانی کے چھپتے دیوین اور اسکے سوڑون کو بخوبی کہیں
اگر انہیں سے کوئی بھی پھولا یا تنا ہوا معلوم ہو تو اسکو فوراً چیر دیں جبکی
ترکیب یہ ہے کہ بچہ کو کھلائی کی گود میں رکھ کر اس کھلائی کو ایک تریسی
پر بیٹھا دیں اور دوسری پر آب ٹھین تب بچہ کے سر کو اپنی گھٹنوں سے
کپڑ کر بائیں ماتہ کی انگلیوں سے اسکا منہ چیریں اور دہنے ماتہ میں شتر
لیکڑ سے کچھ چیریں یہ عمل ایسا آسان ہے کہ والدہ خود اسکو کر سکتے ہیں اور اسکے
فائدہ مند ہونے کے باب میں ہم یہ کہتی ہیں کہ ہنہ بار یا ایسا دیکھا ہے کہ
بچہ دچیرنے سوڑون کے تشخ رفع ہو گیا ہے بس اوپر کے بیان سے صاف

کرنا ہرگز نہ چاہئے حکیم کو لازم ہے کہ بچہ والی کو اس عمل کے مطلب سے بخوبی
آگاہ کر دے تاکہ ایسا نہ کہ شاید دوسے علامات پر جلد لوٹ پڑیں اور دانت
بھی نہ نکلے تو اوس وقت اس عمل کی ناحق بدنامی ہوگی بچہ کے دانت نکلنے وقت
والدہ کو اپنی طرف سے کیا کیا کرنا چاہئے جس سے اوسکے دانت نکلنے کی تکلیف
کم یا بالکل رفع ہو جاوے اب ہم اون باتوں کا بیان کرتے ہیں جنہاں بچہ
اول اوسکو بچہ کے دہن کا خیال رکھنا چاہئے یعنی گاہے گاہے بچہ کو منہ کو
اچھو طور پر دیکھ لیا کرے کہ وہ کس حالت پر ہے اور اگر کوئی مسوڑا بھولا ہو
نظر آوی تو فوراً اوسکا علاج کرادے اور علامتوں کے پیدا ہونے کا انتظار
نکرے پراسبات کی پہچان کے لئے کہ جب مسوڑا بھولتا ہے تو اسوقت کیا
کیا باتیں بائی جاتی ہیں اوسنو واقفیت پیدا کرنی چاہئے کہ جو کچھ مشکل ہوتا ہے
ہے کیونکہ جب مسوڑے بچہ کو بھولتے ہیں تو اوس وقت منہ سے رال
زیادہ بہتی ہے اور منہ گرم ہو جاتا ہے علاوہ ازین بچہ کے دانت نکالنے
کی عمر کا اور اسبات کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ اگر چند دانت نکلے ہیں تو
اور بھی نکلنے والے ہیں +

دوم دانت نکلنے وقت بچہ کی غذا + جس بچہ کو دانت نکلنے وقت تکلیف
ہو اوسکی غذا کم کر دینی چاہئے مثلاً اوس وقت اگر بچہ سوا، دودھ کے
اور بھی کچھ کھاتا ہو تو اوسکو نہ کھلاوین اور اگر وہ صرف کھانا ہی کھاتا ہو
اور ماکا دودھ نہ پیتا ہو تو دودھ میں پانی ملا کر پلاوین سوا، اوسکے کچھ نہیں
سیوم بچہ کا شکم - اسبات کا خیال اچھو طور پر رکھیں کہ بچہ کو ہرگز
قبض نہونی باوے اور جب کبھی قبض ہو بھی جاوے تو کسی تلخی مہل سے
اوسکو رفع کریں اگر تھوڑا اسہال جاری رہے تو اوسکو نہ روکیں لیکن جب

اور منہ سے کثرت سے رال بہتی ہے شدت سے بخار اور تشنگی ہوتی ہے بچہ کبھی
 توبہ چین اور چڑچڑاہو جاتا ہے اور بعض دفعہ کندہ کندہ ٹوٹ ٹوٹ جاتی
 ہے اور وہ بار بار چونک پڑتا ہے پس خاص علامات تکلیف سے دانت
 نکلنے کی یہ ہیں کہ کبھی تو شدت انکی اتنے بھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی ہے
 علاج اسکا یہی ہے کہ مسوڑوں کو لچھے طور پر چروین کیونکہ یہ علامتیں
 سبب زیادہ تن جانے مسوڑوں کو پیدا ہوتے ہیں تو انکو چرونی سے
 جب وہ تناور و رفع ہو جاتا ہے تب درد بھی رفع ہو جاتا ہے بعض اوقات
 کو مسوڑوں کو چروانے میں انکار ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے
 کرنے میں بچہ کو بہت درد پڑے گا اور یہ کہ اگر دانت بہت نزدیک نہ ہو تو
 مسوڑوں کے چرنے سے وہ زیادہ تر تکلیف سے نکلتا ہے پہلی بات کا تو جواب
 یہ ہے کہ مسوڑوں کو نشتر سے اس قدر جلد چیرتے ہیں کہ اس میں درد ہونا ممکن
 نہیں کیونکہ اگر اس عمل سے بچہ کو درد معلوم ہوتا ہے تو بچہ چیرنے
 مسوڑوں کے اکثر وہ کیوں ہنس پڑتا ہے حالانکہ قبل اسکے وہ درد سے
 جلاتا ہے ہو اور دوسرے عذر کا جواب یہ ہے کہ جب کسی مقام کا زخم
 خشک ہوتا ہے اور ومان یا چڑا بطور داغ کے پیدا ہوتا ہے تو وہ بہ نسبت
 اصلی چڑے کے بہت باریک ہوتا ہے پس مسوڑوں کے زخم کا بھی یہی
 قاعدہ ہے پھر انکو چیرنے سے دانت کو نکلنے میں کیونکہ زیادہ تکلیف ہوتی
 ہے اور ثبوت اس بات کا کہ یہ عمل بہت فائدہ مند اور بے خطر ہے روز
 ہمارے تجربہ میں پایا جاتا ہے کہ جب ہم مسوڑے چیرتے ہیں تو اس سے
 سوا فائدہ کے کسی طرح کا بھی نقصان نہیں ہوتا اور بعض دفعہ تو مسوڑے
 صرف بچنا لگانا ہی کافی ہوتا ہے پس والدہ کو اس عمل میں عذر اور ایشہ

سے اصلاح شکم کریں اور اس ایام میں اگر کسی قدر اسہال بھی جاری رہے
تو بہتر ہے آب سرد میں کپڑا یا اسفنج بٹگو کر بدن کو ہر روز پونچھ دیا کریں
اور بارہ چپ پیمینہ سے اس کے ساری جسم کو آہستہ آہستہ گڑ دیا کریں دودھ
بار بار لگے تھوڑے تھوڑے عرصہ تک بلا دین کہ جس سے نشگی رفع ہو مسوڑے
تراور ملائم رہیں اور ان کے درد کو افاقہ اور معده بھی پُر نہونے پاوے +
والدہ کو بھی اس ایام میں اپنی صحت اور غذا کی احتیاط رکھنی چاہیے جنانچہ
کوئی شے گرم کا استعمال نہ کرے دانت نکلتے وقت چونکہ مسوڑے ونکو دبا
سے درد کو افاقہ ہوتا ہے اسلئے بچہ کو جو بسکے لکڑی یا تھی دانت یا مونگے یا
ملٹی کی لکڑی کی چٹنے دی دین یا اپنی انگلیوں سے اس کے مسوڑوں کو
آہستہ آہستہ سہلا دین +

دوم - انتظام اون بچوں کا جنکے دانت تکلیف سے نکلتے ہوں +
پوشیدہ نرم کہ جو بچے یا نوکسی قدر یا بالکل غذا مصنوعی سے پرورش
پاتے ہیں یا وہ جو ضعیف الجسم یا لمبے والدین سے کسی مرض کا ورثہ حاصل
کرتے ہیں مثلاً آتشک یا سل وغیرہ اونکو دانت نکلتے وقت اکثر تکلیف
ہوا کرتی ہے۔ اس صورت میں جو علامات پیدا ہوتی ہیں وہ یہ نسبت
حالت اول کے زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ والدہ کو ان سے بھی واقفیت پیدا
کرنی پر ضرور ہو تاکہ عین شروع ہی میں وہ انکو بچا نکر حکیم کی صلاح کیوں
وہ علامات یہ ہیں کہ مسوڑے پہ لکڑی سرخ اور گرم ہو جائے ہیں اور
شدت سے درد کرنے لگتے ہیں اور اونکو ذرہ بڑھتی برداشت نہیں ہوتی اور
سبب اسکے کہ سر کی طرف خون زیادہ رجوع ہوتا ہے رخا رہی ہو لکڑی
سرخ اور گرم ہو جاتے ہیں انکھیں سرخ اور اونسو آشوب جاری رہتا

جوڑی نکلا کرتے ہیں اور بہ نسبت اوپر کے نیچے جڑی کے دانت بیشتر نکلتے ہیں
 پہلا دودھ کا دانت اکثر چھٹی یا ساتویں مہینے میں نکلا کرتا ہے اور سب کو اخیر
 کا بیسویں سے تیسویں مہینہ کے عرصہ میں نکلتا ہے پس دودھ کے دانت پیرہ
 برس سے دو برس کی عمر تک نکلتے رہتے ہیں اور چونکہ دانت جب پہلے نکلیں لگتی
 ہیں تو بچہ کو اکثر تکلیف ہوا کرتی ہے اسلئے بچہ والی کو اس بات کا جاننا کہ وہ
 تکلیف کیونکر کم یا رفع ہو سکتی ہے بہ ضرورت ہے پہلو ہم اون بچوں کا انتظام
 بتلائیں گے جنکے دانت بلا تکلیف نکلتے ہیں اور بعد ازان اون کا جبکو دانت
 نکلتے وقت تکلیف ہوا کرتے ہے چنانچہ

اول انتظام اون بچوں کا جنکے دانت بلا تکلیف نکلتے ہیں +

واضح ہو کہ جو بچہ تندرست ہوتا ہے اور صرف اپنی ماہی کے دودھ پر رہتا ہو
 اوسکے دانت آسانی سے نکلتے ہیں اور اوسکا انتظام بھی سیدھا اور آسان
 ہے۔ اس صورت میں تھوک زیادہ پیدا ہوتا ہے مسوڑے بہو لکر گرم
 ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات رخسار بھی سرخ ہو جاتے ہیں بچہ اپنے
 انگلیاں یا کسی اور چیز کو جو اوسکے ماتھے لگے بار بار منہ میں ڈالتا ہے
 تشنگی زیادہ ہوتی ہے دودھ بار بار پیتا ہے لیکن مسوڑوں کے درد کے
 سبب تھوڑے ہی دیر کے بعد چوڑ چوڑ دیتا ہے بچہ بقرار اور مزاج اوسکا
 بکڑا رہتا ہے دغلاً چنچ پڑتا اور خواب میں گاہے گاہے چونک پڑتا ہے
 طبیعت اوسکی تے کی طرف مایل رہتی ہے اور بعض دفعہ اوسکو دست بھی
 لگ جاتی ہیں۔ ان علامتوں سے ہی علامت اکثر کئی نفعے بیشتر نکلتے دانت کو
 شروع ہو جا کرتے ہیں۔ علاج ایسے بچہ کا سفید آسان ہے کہ حکیم ضرورت
 بھی نہیں پڑتی چنانچہ بچہ کو کھلی ہوا مین ہوا خوری کرادین روغن بنجد

اجازت دین کیونکہ حقد روہ عادی اس بات کا ہو جائیگا اور سقد روہ کو
مختلف آب و ہوا کی برداشت ہو جاوے گی۔ ریاضت کو باب میں بچوں کو
اونکی طبیعت پر چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ وہی اسی قسم کے ریاضت پسند کرتے
ہیں جس میں اونکو طاقت ہوتی ہے اور اونکا نشوونما ہوتا ہے +
بچہ اگر اس قدر کمزور ہو کہ پیادہ چلنے پر فوری ریاضت کرنے میں اونکو
تکلیف ہوتی ہو تو اونکے لئے گھوڑے کی سواری بہتر ہے اس سے بچہ کی
طبیعت بھی خوش ہوتی ہے اور جسم کے ہر عضلے کو اس قدر ریاضت ہوتی
ہی کہ جسم میں وہ تھک نہ جاتا۔ تیرنا چھو لٹا اور کشتی بھی عمدہ ریاضت ہے
بشرطیکہ ساتھ احتیاط کے کی جاوے +

مقالہ پنجم

انتظام بچوں کا دانت نکلنے کا وقت

فقرہ - ۱۔ دودھ کے دانت +

اگر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب اونکے منہ میں کوئی بھی نشان دانت کے
نہیں ہوتے یعنی وہ بالکل بوجلا ہوتا ہے تاہم جڑوں کے اندر دودھ کے
دانت کی جڑیں ہوا کرتی ہیں یعنی ایک تو دودھ کے دانت جو پہلے نکلتے
ہیں اور دوسرے وہ جو بعد گرجانے دندان شیر کے نمایان ہوتے ہیں
پہلے یعنی دودھ کے دانت بعد ازاں میں ہوا کرتے ہیں اور دوسرے اکثر

کہہ او سکوسا عد پر جت لگا کر اسی ماتہ سے اوسکے چوڑے اور رانوں کو بکڑ لین
 اور اسکے سر اور جسم کو اپنی چھاتی اور بازو کے سہارے پر رکھیں بچہ کو اسی طو
 کے ریاضت تین مہینے تک کرنی چاہی کہ جب تک وہ خود بیٹھنے کے قابل ہو جاوے
 اور جب دو یا تین مہینے کا ہو جاوے اور دو کو کم سونے لگے تب او سکوزم
 فرش پر چوڑے دین تاکہ اپنی مرضی سے ماتہ پاؤں مارا کرے اس ریاضت
 سے بچہ کو عضوین طاقت ہوتی ہے اور وہ جلد چلنے پھرنے سیکھ جاتا ہے۔ بچہ
 کو چلنا پھرنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ وہ خود آپ ہی سیکھ
 لیتا ہے چنانچہ پہلے تو وہ ریگنے لگتا ہے کہ جس ریاضت سے ہر عضلہ جسم طاقت
 ہوتی جاتی ہے اور بچہ اس سے تھکتا بھی نہیں۔ بعد چند روز کے کرسی یا کوئی
 اور شے کو بکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے اور باوجودیکہ وہ گر کر بھی پڑتا
 تاہم اپنی ہمت نہیں ہارتا۔ اور بار بار کھڑا ہونے چاہتا ہے اس ترکیب سے
 پہلے تو وہ اپنے تئیں زمین سے اٹھاتا ہے اور بعد ازاں کسی چیز کو بکڑ کر
 کھڑا ہو جاتا ہے اور جب اسکی کثرت وہ خوبطر چر کر لیتا ہے تب بدون
 سہارے کے کھڑکھڑاتا ہو کھڑا ہو کر مشیخت کو ساتھ اور ہنسن ہنسنے کو گونگو
 بہہ دیکھلاتا ہے کہ اب میں بھی خود بخود کھڑا ہو سکتا ہوں لیکن قدم
 بڑھانے میں چونکہ خوف کرتا ہے اسلئے کسی چیز کو بکڑ کر سنبھل سنبھل کر
 دو جا رہے قدم بڑھاتا ہے اور جب روز بروز اس بات کی کثرت کرتا ہے اور
 اپنے تئیں سنبھلنے کا مل پاتا ہے تب تنہا دوڑنے لگتا ہے پس دیکھا جائے
 کہ یو ساری باتیں بتدیج ہی ہو کرتی ہیں نہ کہ جبراً اور خلاف اوسکی مرضی
 بچہ کے ماتہ بکڑ کر پھراشیے حاصل ہوتی ہیں جب بچہ کو اس سے زیادہ تر
 ریاضت کی طاقت ہو جاوے تب او سکوکھلی ہوا میں ورزش کرنے کی

اور جسم لاغر ہوا کرتا ہے اور بر خلاف اسکے گشت کار لوگ جو ہمیشہ تازی ہوا
کہاتے ہیں کیسی قوی الجسم اور اونکے چہرہ پر کیسی رونق اور سرخی ہوتی ہے
لہذا چونکہ تازی ہوا کا مقوی اثر بچوں پر بھی ایسا ہی ہوا کرتا ہے اسکے
اونکو ہمیشہ صبح اور شام تازی ہوا میں ہوا خوری کر دین پر اس میں بچہ کی
طاقت اور موسم کا خیال ضرور رکھیں یعنی کمزور بچہ نکو جاٹے کے موسم میں
سردی کے وقت باہر نہ لیجانا چاہئے اور چاہی بچہ کمزور ہو یا نہ ہو بارش کے
دنوں میں کہ جب ہوا نہایت مرطوب ہوتی ہے بچہ کو ہرگز باہر نہ نکالنا چاہئے
اس میں کہانسی اور زکام اور سل کی بیماری کا اندیشہ ہے اور کہلائی حسن
بچہ کو باہر لیجاوے اس وقت اسکو اس بات کی تاکید کر دین کہ بچہ کو
لیکرا دہراؤ دہر بہودہ گشت نکلیا کرے کیونکہ اس میں دو نقصان ہیں ایک تو
یہ کہ شاید اس عورت کا دل کسی سے لگ جاوے اور دوسرا یہ کہ
اس میں ہوا زندگی کے سبب بچہ کی صحت میں خلل پڑ سکتا ہے۔

ریاضت بدنی۔ مثل ہوا خوری کے ریاضت بدنی ہے بچہ کو قیام
صحت کے لئے ضرور ہے چونکہ نہایت تیز بچہ نکی پہلی ریاضت کہلائی کے
تا نہو نہر ہو کرتی ہے اسلئے ترکیب بچہ کے لینے کی یہ کو نکلانے عین مناسب ہے
یاد رکھنا چاہئے کہ تیسرے مہینے سے پیشتر بچہ کی کمر نہایت اور گشت میں اس قدر طاقت
نہیں آتی ہے کہ جس میں وہ بلا ضرر کے سیدنا بیٹھ سکے پس جب تک اس قدر
طاقت اس میں نہ آوے تب تک بچہ کو بلا سہارے کے ہرگز بیٹھ نہ دیں۔ بلکہ یہ
کام کریں کہ جب وہ کئی دنوں کا ہو جاوے تب ستر سے آہستہ اسکو اٹھا کر تیز
دو یا تین دفعہ نرم فرش پر چٹ لٹا دیں اور زچہ خانہ کے اندر بہر دین
اور بعد میں سے یا جو تیس ہفتہ کر اپنی کلائی پر اس ترکیب سے لیکر بہر دین

ہمیں کچھ طاقت کو موافق اور سکو گرم کپڑا پہنا دین چنانچہ جب بچہ طاقت ور ہوتا
 بت تو زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی پر کمزور اور ضعیف الجسم بچوں کو
 سر سے پاؤں تک ہارچہ گرم مین ملنوف رکھنا چاہئے اس موسم میں پشمینہ
 یا اوننی کپڑے کا استعمال کریں لیکن غیبہ دار کپڑوں کی اجازت ہم اس لئے دے
 نہیں دیتے کہ ایک دھونو مین دقت ہوتی ہے۔ نہایت ننھے بچوں کو پشمینہ کا
 کن ٹوپ اور کمرہ پہنا دین اور نیچے کمر ڈھک کو پشمینہ کی چادر یا روئی
 کے بالا پوش سے ڈھکار کہیں جب بچہ کی عمر تین یا چار سال کی ہو جاوے
 بت اور سکو اپنے اپنے دیس کی رسم کو موافق پشمینہ یا اوننی کپڑے کی پوش
 پہنا دین بچوں کی پوشاک ڈھیلی ڈھالی ہونی چاہئے تاکہ کوئی خاص حصہ جسم
 پر اور سکا دباؤ نہ پہنچے کہ جواوسکی کھیل کود کا مانع ہو اور جس سے خون
 رک رک کر چلے اور بچوں کو ایسے کپڑے پہناوین جو جلد پہنا سکیں اور
 اتار بھی سکیں تاکہ پہنانے اور اتارتے وقت انکو تکلیف نہ ہو +

فقہہ - ۵ - ہوا خوری اور ریاضت بدنی +

بچہ کے مکان کے اندر نازی ہوا کی آمد و رفت کا ہونا جیسا کہ پر ضرور ہے
 اس بات کو ہم اسی مقالہ کے ابتدا میں بیان کر چکے ہیں اب ہم فائدہ نازی ہوا
 ہوا خوری کرنے کا بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم کسی بڑے شہر کے لوگوں کو
 جو بند مکان اور بگلیوں میں بند رہا کرتے ہیں اور اون باشندگان وہ
 کو جو ہمیشہ اور ہر ساعت کھلے میدانوں اور باغوں میں واسطے کشت و
 کے بہرہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بت ہم کو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ
 نازی ہوا کھد صحت بخش ہے پس اس واسطے شہر کے لوگوں کا رنگ گن گن

نہین ہوتی اسلئے اسکا کہنا اپنا عیش و خوشی سب چھوٹ جاتی ہے +
 بچوں کے پوتے - چونکہ بچوں کا بول و براز بار بار نکلتا رہتا ہے تو انکو پوتوں کو
 بھی بار بار بدلنا چاہئے اور کھلائی کو لازم ہے کہ وہ بچہ کو نہایت ضرور سکھائے
 کہ جب سکون باخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو تو اسوقت وہ اشارہ سے بتلادیا
 کرے اور اسکی یہی عادت ڈالنی چاہئے کہ اسکو بول و براز کی حاجت کسی وقت
 معمولی پر ہو کرے - جب ایسی عادت بچہ پن میں پڑ جاتی ہے تو وہ ساری
 عمر تک رہتی ہے جس سے وہ شخص تندرست رہتا ہے - چون چون بچہ کی عمر
 دراز ہو جاوے صفائی کے باب میں انہیں قواعد کے پابند رہنا چاہئے -
 چنانچہ ہر روز اسکے بالوغین کنگھی پہیرا کرین اور منہ ناک کان اور انگلیوں
 دلا دیکرین اس سے بچوں کو جلد کی بیماری نہین ہونی چاہتی ہے جو کہ اکثر ان
 بچوں کو ہو جایا کرتی ہے جو میلی کچلی رہتی ہین +

فقہ - ۴ - پوشاک +

چونکہ ننہی بچوں کو سردی کی برداشت بہت ہی کم ہوتی ہے تو انکو جسم کو
 ہمیشہ کپڑوں سے ڈھکا رکھنا ضرور ہے جسم کی حرارت اصلی کو قائم رکھنے
 کے لئے کس قدر اور کس قسم کا کپڑا پہنانا چاہئے یہ بات موسم اور بچہ
 کی طافت پر منحصر ہے چنانچہ نہایت ننہی بچوں کو گرمائے اندر صرف ملل یا
 مین سوکھہ کا کرتہ اور سرد کو لئے ہلکی ایک ملل کی ٹوپی کافی ہے پر اس
 پوشاک کو کہ سے کم دن میں دو دفعہ ضرور بدلنا چاہئے اور جب بچہ
 کی عمر چار یا پنج سال کی ہو جاوے تب اسکو ملل یا مین سوکھہ کا انگلیہ
 یا کرتا اور لٹھریا جینٹ کا باجانبہ اور ہلکی ٹوپی پہناوین اور سردی کے

صفائی کے باب میں جتنا کچھ دتا ہی ہوڑا ہے کیونکہ صفائی قیام صحت کے لئے نہایت ضرور ہے۔ چند ہفتہ کی عزت تک بچہ کو ہر روز ایک دفعہ آب گرم سے نہلاوین اور جب وہ کئی مہینہ کا ہو جاوے اور موسم بھی گرمی کا ہو تب رفتہ رفتہ اسکو آب سرد سے نہانکی عادت ڈالیں۔ پر غسل کے وقت زیادہ تکلف نہ کریں۔ لیکن بچہ اگر کمزور اور لاغر ہو تو اسکو آب سرد سے ہرگز غسل نہکراوین۔ بعد غسل کے بچہ کے جسم کو اچھو طور پر پونچھ کر خشک کر ڈالیں ترکیب جسکی یہ ہے کہ فلا لیں کے کپڑے سے بچہ کو جلد جلد اور کس قدر زور زور سے رگڑ کر پونچھیں اس ترکیب سے جسم میں طاقت آتی ہے اور اس بات کا خیال رکھیں کہ بچہ کے بغل چڑے اور جوڑے بخوبی پونچھے جاوین کیونکہ ان مقاموں میں بانی کے جمع رہنے سے زخم پڑ جانے کا اندیشہ ہے اور جس وقت بچہ کو غسل دلاوین یا کپڑے پہناوین اس وقت اسکو ساتھ نہایت محبت سے پیش آوین اور اسکی طبیعت کو کھیل کود اور تماشہ سے بہلاتے رہیں تاکہ غسل کرنا اور کپڑا پہننا اسکو بارنگذرے کیونکہ بچہ ان باتوں کو تکلیف سمجھ کر اکثر رونے اور ضد کرنے لگتے ہیں۔ فائدہ اس وقت محبت کے کرنے اور بچہ کی طبیعت کو بہلانے سے یہ ہے کہ اسکو تکلیف کی برداشت کر نیکی عادت پڑ جاوے اور یہ عادت اگر بچہ پن میں پڑ جاوے گی تو اسکا فائدہ جوانی میں یہ نظر آوے گا کہ جب اس شخص پر کسی طرح کی آفت پڑے گی یا کسی بات سے تکلیف یا رنج ہوگا اس وقت ان باتوں کا اثر اس پر چند ان نہیں ہونے پاوے گا اور سبکو وہ جھیل لیکا آدمی میں اس صفت کا ہونا غنیمت شمار کرنا چاہیے کس لئے کہ اکثر لوگوں کا یہی قاعدہ ہے کہ جب انہر کسی طرح ملی آفت آتی ہے تو چونکہ انکو ان باتوں کی برداشت کی طاقت

نیند نہ پڑے اور وہ بچہ جن ہو تو فوراً اوسکو کسی دوسرے بستر پر کسی اور عورت کی
ساتھ سلاوین اور ہر خوب صبح کے وقت اوسکی والدہ کے پاس دودھ پلائیے
لے لائیں کیونکہ والدہ کی نیند میں اگر خلل پڑے گا تو دودھ اوسکا بکڑ جائے گا
جس سے بچہ کا نقصان مقصود ہے۔ جب بچہ کی عمر ایک مہینہ یا چھ مہینے کی ہو جاوے
تو اوسکو الگ بستر پر سلا سکتے ہیں لیکن اس بات کی احتیاط رکھیں کہ اوسکے
پاس کپڑے کافی ہوں اور جس مکان میں وہ ہو وہ مکان بھی گرم ہو نہ میں تو
سردی لگ کر بچہ بیمار پڑ جائے گا۔ دو برس کی عمر تک بچہ پڑیا روئی کے بستر
پر سلاوین لیکن بعد چھ مہینے کی عمر کے نیکہ اوسکا کپڑے یا بیٹری کے بالون کا
ہونا چاہئے کیونکہ وہ عمر دانت اینٹکی ہے جس میں بچہ کے سر کو سرد رکھنا چاہئے
بچہ کے کپڑے اور بستر کو صاف ستھرا رکھیں اور بار بار اوسکو دھو پ اور ہونیکھلا
سونا دو برس سے آٹھ برس کی عمر تک + جب بچہ اس عمر کو پہنچے تو دن کو وقت
اوسکو دو یا تین گھنٹہ سلا رکھیں اور شام کے وقت پہر سات آٹھ بجے سلاوین
تاکہ رات بہر وہ سوتا رہے اور پہر علی الصبح آٹھ بیٹھو اور جب صبح کے وقت
وہ اٹھو تو پہر سونے ذہین اس ترکیب سے سویرے اٹھنے کی اوسکو عادت
پڑ جاوے گی۔ بچہ کو آٹھ یا ن چک نہ اٹھانا چاہئے کیونکہ اس سے دماغ کو صدمہ
پہنچا ہے اور قلب زیادہ دھڑکنے لگتا ہے اور اگر یہ بات بار بار کیجاوے گی
تو اس میں دماغ کی بیماری کا خطرہ ہے۔ بچہ کو کبھی زیادہ بڑھون یا بیمار آدینگو
ساتھ نہ سونے دیں۔ بلکہ اگر ممکن ہو تو اوسکو علیحدہ سلاوین اور اگر توفیق
ہو تو کئی بچہ لکھو ایک ہی کمرے کے اندر نہ سلاوین +

غسل اور صفائی +

فقہہ - ۳ -

بچہ کی صحت اور تندرستی میں بڑا خلل پڑ جاتا ہے۔ بچہ کا بدن کپڑا اور بسترہ چونکہ ہمیشہ صاف ستھرا ہونا چاہئے تو اس بات کو یقین جانیں کہ جب تک بچہ کی مزاج میں صفائی نہ ہوگی تب تک یہ باتیں اسے ہرگز نہیں ہونے کی۔ کہلائی کا صرف صبح کے وقت آٹھ گھنٹہ تا ہفتہ دھونا کافی نہ سمجھیں بلکہ روزانہ دوسرے روز اسکو غسل کرادیں اور اسکو علی الصباح اٹھنا چاہئے تاکہ بچہ کے اٹھنے سے پیشتر ہی کھانا ستھرا اور ہوا دار کر دیوے لیکن ناکہ کہلائی اس قدر کے پابند رہے اسکو سو پرے ہونکی اجازت دینی چاہئے اور یہ بات کہلائی کے ذہن نشین کر دیں کہ جب بچہ کی طبیعت کسی طرح بگڑ جاوے یا اسکو چوٹ لگ جاوے تو والدین کو اسکی اطلاع فوراً دیوے کیونکہ اس کا بانداری سے صدمہ بچہ کی جان بچ جاتی ہے +

فقرہ ۲- سونا پیدائش سے ۲ برس کی عمر تک + بعد پیدائش کے تین یا چار ہفتہ تک بچہ شب و روز سوتا رہتا ہے صرف اسے وقت اٹھتا ہے کہ جب اسکو ہوک لگتی ہے اور بعد اس عمر کے سونا اسکا کم ہونے لگتا ہے۔ پہلے چند ہفتہ تک تو بچہ کی نیند کو خراب نہ کرنا چاہئے۔ مگر بعد اس ایام کے اسکو سونیکے وقتوں کا کچھ انتظام کرنا چاہئے نہیں تو دن کو زیادہ سو کر رات کے وقت لوگوں کو ستائیکا۔ غذا کے بعد ہی فوراً اسکو نہ سلا دیں کیونکہ ماضیہ کے نیند اسکو خراب ہو جاوے گی۔ اور جس مکان میں بچہ سووے اسکو اندھرا اور شور وغل سے محفوظ رکھنا چاہئے اور جب تک اس زچہ خانہ میں ہو یعنی ایک مہینہ تک بچہ کو تنگ اپنے ساتھ نہ سنانا چاہئے کسلنے کہ اس عمر کے بچہ نہیں حرارت غریبی کم پیدا ہوتی ہے اگر ایسا ہو کہ کسی رات اسکو

ادنیٰ تعلیم و تربیت میں کب بقدروخل ہوا اور ایسا ہرگز نہ سمجھیں کہ کہلائی کو
 بچونکی کہلائی یا بڑائی کا اختیار صرف عہد طفولیت ہی تک ہی نہیں بلکہ
 اوس عورت کو اوس بچہ کی ساری عمر کی کہلائی یا بڑائی کا اختیار ہے
 کیونکہ جیسی عادت وہ بچہ پن میں ڈالی گئی ویسی ہی عادت اوس بچہ کی جوانی میں
 بھی رہی گی پس جس عورت کو اتنا بڑا اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو بچہ کو سارے
 عمر خوشی یا رنج میں رکھ سکے اوسکے نوکر نہ کہنے سے پیشتر والدین کو کس قدر اندیشہ
 اور احتیاط چاہئے۔ اب ہم اس عورت کی بھی مختصر تعریف کرتے ہیں چنانچہ
 کہلائی کو خوش مزاج ہونا چاہئے اسکا اثر بچہ کی صحت اور عادت پر بڑا ہونا ہی
 کہلنے کہ کیا ہی۔ نہا بچہ ہو جب وہ اپنے نوکر و نکاح پر دیکھتا ہے تب
 اوسکو اونکو دلونکا حال فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر کہلائی چیت و جالاک
 خوش و خورم اور خوش مزاج ہو اور محبت سے پیش آوے اور بچہ کی
 اشارات کی باتوں کو جلد سمجھ لے تو ایسی عورت اوس بچہ کو بھی خوش
 مزاج بنا سکتی ہے لیکن باوجود ہونے خوش مزاج کے اگر وہ بودے اور
 بیوقوف ہو تو ہرگز بچونکی قابل نہیں ہو سکتی ہے اور اگر وہ بی پرواہ غافل
 اور غصہ ور ہو تو اس سے صرف بچہ کا مزاج ہی نہیں بگڑتا بلکہ اوسکی صحت میں
 بھی خلل واقع ہوتا ہے اگر ممکن ہو تو کچھ ایسی عورت کے سپرد نکرین جسمیں کوئی
 بہاری نقص تولیدی ہو مثلاً اندھے کو لے لنگرے اور خالص صورت
 یا اگر وہ ترش رو بھی ہو یا اوسکے زبان میں لگنت ہو نہیں بلکہ آواز بھی
 اوسکی اگر کڑھی اور سخت ہو یا اگر اوسکے سینے میں رنج کی عادت ہو تو یہی دیکھو
 بچہ کا ذمہ نہ دینا چاہئے +

کہلائی کی مزاج میں صفائی کا ہونا ضرور ہے کیونکہ اس بات کو ہونے سے

اور دروازہ ہونے چاہیے اور صبح اور شام جب بچے باہر نکلیں تب اس مکان سے
ساری دروازہ کو کھول دیں تاکہ متعفن ہوا اس سے نکل جاوے اور تازگی
ہوا کا اس کے اندر گزر ہو جاوے + اس مکان کے اندر نہ کھانا بکھانا جائے
اور نہ میلے پوتڑے وغیرہ دھونی چاہیے بچوں کے رہنے کا مکان خوشبو ہونا چاہیے
جس کے دیکھنے سے طبیعت بچہ کی جو ہمیشہ خوش و خرم و راحت والا کرتی ہے
گدڑ ہو جاوے پس اس لئے اس مکان کی دیواروں پر خوبصورت تصویریں
لٹکا رکھیں جس کے دیکھنے سے بچہ کی طبیعت خوش ہو جاوے اور اس مکان کے
صحن پر اگر توفیق ہو تو قالین کا ملائم فرش کر دیں تاکہ بچہ اگر گر بھی پڑے
تو اس کو ضرب نہ پہنچے اور اس کے اندر کوئی خالتو اسباب رکھ کر جگہ نہ رکھیں
کیونکہ بچوں کی کھیل کود کے لئے جگہ فراخ چاہیے اور جو چیز بچوں کی چھوٹے
قابل ہوا اس کو اس مکان کے اندر نہ رکھیں + چھوٹے بچوں کو رنگارنگ کھلونے
پر گز نہیں کیونکہ خاص کر جب دانت آتے ہیں تو وہ اس کو جو ستے ہیں جتنے
رنگ اور کھلونوں کا بچہ کھاتا ہے۔ اس میں یہ نقصان ہے کہ رنگ کے
اندر سفیدہ جو ایک سیسہ مرکب ہو کر رہتا ہے غرض جب یہ چیز معدہ میں داخل
ہوتی ہے تو قہقہے کا درد پیدا ہوتا ہے +

بچہ کی کھلائی۔ والدہ کو اس بات سے آگاہ کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ بچہ کی تعلیم
و تربیت و تہذیب اخلاق کی مالک وہی ہے تاہم کھلائی کا بھی ان باتوں میں
بڑا ذمہ ہوتا ہے کیونکہ والدہ ہمیشہ اور ہر ساعت اپنے بچہ کے پاس نہیں رہ
سکتی لیکن کھلائی اس کے ساتھ ہر ساعت ہو کر رہتی ہے چنانچہ شب و روز
بچے اسکے پاس رہتے ہیں اور وہ اس کا کھانا پینا پہنا کھینا کو دیا سوتا ہے
مکان وغیرہ سب کی نگہبانی کرتی ہے پس یہ بات ضرور ہوئی کہ اس کو بھی

مقالہ چھارم

عام اٹھ سام بچو نکا دوسری سال کی عمر تک
اور دوسرے سے آٹھویں برس کی عمر تک

فقہ ۵-۱۔ بچہ کی خدمت گزار اور مکان +

چونکہ ایک عرصہ دراز تک بچے کسی خاص مکان میں رہتے ہیں اور خاص گروہ
سپردہ کرتے ہیں اسلئے اس مکان کی تعریف اور ان خدمت گزاروں کی عادت
سودا لین کو واقفیت ضرور پیدا کرنی چاہئے +

اول تعریف مکانی

جس مکان میں بچہ ہوا دسکو فراخ اور ہوا دار ہونا چاہئے۔ عوام الناس
اس بات کو نہیں جانتے کہ تنگ اور بند مکان میں بود و باش کرنا کیسا صبر
پیدا ہو سکتا ہے پس واضح ہو کہ اگر مکان بند ہوا اور بذریعہ کھڑکی اور دروازے
اس میں ہوا کی آمد و رفت کا بندوبست نہ ہو تو اس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ آگے
دم گرم ہوا جو ہمیشہ میلی اور کثیف ہوتی ہے وہ اس مکان میں بند رہتی ہے
اور دم کنشی کی ہوا جسکو ہمیشہ صاف ہونا چاہئے اسکا گذر اس مکان سے
اند نہ ہونے کی وجہ سے یہی کیفیت اور میلی ہوا جو اس دم گرم ہوا کی وقت
جوڑی نہیں ہوتی ہر دم کنشی کی وقت اندر پہنچ لیتا ہے جو بخون و کاف بخون نہیں ہوتا اور یہاں سے اسکا زہ اور
وہ خود لاغر ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے۔ پس بچہ کے مکان میں ہر طرف سے کھریاں

معینہ سرپستان کھنچتی ہے اوس گردن کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے۔
 اور اوس کے اوپر چڑایا انڈیا ربکی ایک ٹہنی لگا دیتے ہیں کہ جبکہ وسیلہ سے بچہ پھر
 غذا کو چوس لیتا ہے۔ بعد غذا کے اس بوتل کو گرم پانی سے خوب دھو ڈالنا چاہیے
 کیونکہ اگر میلی بوتل میں غذا کھلائی جاوے گی تو اوس کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے
 اور بگڑی غذا کھلانے سے بچہ ضرور بیمار پڑ جاوے گا۔ کس مقدار اور کتنی کتنی عمر
 بعد غذا مصنوعی بچہ کو کھلانی چاہئے۔ یہ بات بچہ کی عمر اور اوسکی طاقت نامند بہ
 موقوف ہے مثلاً بعد ولادت کئی ہفتہ تک مقدار غذا کی چھبھچھ سے آٹھ تک
 ہونی چاہیے اور ماہین ہر غذا کے عرصہ ہی دراز نہ ہونا چاہیے بعد ازاں چون چون
 بچہ کی عمر دراز ہوتی جائے مقدار غذا کی بھی بڑھانی چاہئے۔ تھوڑی سی تجربہ سے
 بچہ کی والدہ کو یہ بات حاصل ہو سکتی ہے کہ جب بچہ کی عمر ایک ماہ کی ہو جاوے
 تو بعد چار چار گھنٹے کے اوسکو غذا کھلانی چاہیے۔ غذا کے اس ترکیب سے کھلانے کا
 فائدہ یہ ہے کہ بچہ کو اوسکے مضم کرنے کا وقت بخوبی مل جاتا ہے اور جو اس وقت
 کی تقلید نہ کی جاوے گی تو بچہ کے ماضی میں فرق پڑ جاوے گا اور اوسکو بیمار بھی جاوے
 اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بچہ مصنوعی غذا سے پرورش پاؤں میں وہ جب کبھی
 بیمار پڑے تو بی اعتدالی غذا کے باعث بیمار ہوتے ہیں۔ غذا کے وقت بچہ
 کو کس قاعدہ پر رہنا چاہئے۔ تاکہ ہرگز بچہ کو غذا نہ کھلانی چاہیے ہمیشہ غذا کے
 وقت بچہ کا سردائی کے ماثون پر اور سچا رہنا چاہئے کیونکہ اس ترکیب سے غذا
 کے خنجرہ میں جانے کا بالکل اندیشہ نہیں رہتا بعد بلانی غذا کے قریب آدھی
 گھنٹہ تک بچہ کو لٹا رکھنا چاہئے اوس وقت اسکو پالنے یا گود میں پلانے سے
 سر رہتا ہے کیونکہ یہ بات علم فریو کو جی سے ثابت ہے کہ بعد از غذا آرام
 کرنے سے وہ غذا جلد مضم ہو جاتی ہے +

چا دل کا استعمال کرنا چاہیو اور جب انہیں کسی کا استعمال کیا جاوے تو لازم ہے کہ اوسمین قدر دودھ کی ملائی آمیز کر دیوے مثلاً اگر ۲ چٹانک ساگو دانہ یا اراروٹ یا چا دل ہو تو اوسمین بمقدار ۳۳ ماشہ کے ملائی ملانا چاہیو اور ساتھ ہی قدر تک اور شکر ملانا بھی ضرور ہے جو بچہ ایسی اغذیہ مصنوعی سے بہتر دیش باقرہ میں اکثر انکے عضلے و ہیلی ہو جاتی ہیں اسلئے بعد چند مہینہ کے اونکی غذا سے ملائی کو موقوف کر دینا چاہئے اور اوسکو عوض ہر او ساگو دانہ یا دودھ کے آب بخنی ملا دینا چاہیو لیکن اس طرح کی اغذیہ تیار کرنے میں کمال احتیاط اور ہوشیاری کا ہر کیونکہ اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیو کہ قبل از نگلنے دانت کے بچہ دودھ کے اور کسی قسم کی غذا کا دنیا کچھ قاعدہ مقرر نہیں ہے بلکہ ایک استثنا ہو کہ سوا سٹو کہ جب کوئی غذا ایڈ دودھ کے بچہ کو قبل از نگلنے دانت کی دی جاتی ہے تو بلا چاری دی جاتی ہے اور کچھ اسلئے نہیں کہ وہی اغذیہ اوس عمر طفولیت میں دودھ سے نہ زیادہ مفید ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیو کہ جب ایسی مصنوعی اغذیہ ملائی جاوے تو قبل از پلانے کے اونکو بہت باریک صافی سے چھان لینا چاہیو۔

ترکیب غذا مصنوعی کہلا سنی - اس غذا کے کہلا سنی دو ترکیب ہیں ایک بذریعہ جھج کے دوسرے بوسلہ سنگت باٹل یعنی دودھ پلانے کی بوتل سے جو بازار میں اکثر نکالتی ہیں۔ ترکیب اول سے دودھ نہ پلانا چاہئے کیونکہ بچہ نکو اوس ترکیب سے غذا مضہم نہیں ہوتی۔ ترکیب دوم سے غذا کہلائی اسلئے بہتر ہے کہ اس ترکیب سے بچہ کو جو سننا بڑھتا ہو لہذا تھوڑے سی تھوڑے غذا معده میں جاتی ہو اور پہلے جو سننے سے بچہ کے منہ میں تھوک پیدا ہوتا ہے اور تھوک کا ساتھ غذا کے مکر معده میں جانی دودھ غذا اجلہ مضہم ہو جاتی ہے یہ فائدہ ہے۔ واضح ہو کہ سنگت باٹل ایک قسم کی بلور کی بوتل ہوتی ہے کہ جسکی گردن

جنہ و کم ہوتا ہے اور بعد گزرنے دس روز کے مہو زن گائی کا دودھ اور بانی ملائی
 اور بعد اوس مدت کے یعنی جب بچہ کی عمر چھ مہینہ کی ہو تب گائی کا دودھ خالص ملا
 جائیگی۔ مخفی نہ ہو کہ جطرح کی احتیاط گدہ ہی کے دودھ کی تیار کرنی میں جائیگی ویسی اس
 احتیاط گائی کے دودھ کے تیار کرنے میں بھی درکار ہو۔ بکری یا بھڑی کا دودھ
 اگر بلانا منظور ہو تو عہد طفولت کے ابتدائیں اوس دودھ میں بانی اور شکر ملائی
 جائیگی کیونکہ ان دونوں حیوان کے دودھ میں وسیت اور جنت زیادہ ہوتی ہے
 الغرض بیدائش سے دودھ کو دو یا تین دانہ نکلے تک اگر عورت کا دودھ میسر
 نہ ہو تو بچہ کو حیوانات کے دودھ سے پرورش کرنا جائیگی اور قاعدہ دودھ کی بلا سکا
 بھی ہے کہ ابتدائیں دودھ کو بہت تہلا بلانا جائیگی بعد ازاں جون جون بچہ بڑا ہوتا
 جاوے بانی کا جزو دودھ سے کم کرنا جاوے۔ یاد رکھنا جائیگی کہ اگر غذا مصنوعی کی
 ضرورت ہو تو ابتدا میں شیر حیوانات کے سوا اور کوئی مصنوعی غذا بہتر نہیں ہے
 اور یہ محض غلط فہمی اوں عورات کی ہے جو یہ بات سمجھتی ہیں کہ صرف دودھ
 میں اس قدر طاقت نہیں ہے کہ بچہ پرورش پاسکے اور اس لحاظ سے جو وہ نہیں
 بچہ کو ساگو دانہ یا اراوٹ یا شوربا بلاتے ہیں تو بچہ بیمار پڑ جاتا ہے ان غلیہ
 سے اوس عمر کے بچہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے حتیٰ کہ درد شکم اور اسہال شروع
 ہو جاتا ہے اور بد ہضمی کا ہونا تو ایک ادنیٰ سی بات ہے کیا سمجھئے کہ بچہ کو وہ
 غذا ہرگز مفید ہی نہیں ہوتی اور ہر وقت اور ہر ساعت دوا کی ضرورت
 پڑتی ہے لیکن جس ترکیب سے شیر حیوانات کا بلانا اوپر بیان ہو چکا ہے اگر اوس
 ترکیب سے نہیں بچہ نکلی پرورش کی جاوے تو بیماری کی کیا محسوس بچہ روز بروز
 تر و تازہ ہوتا جاوے گا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قسم کا دودھ بچہ
 کو موافق نہیں آتا اوس وقت مجبوراً بلایا جاری اراوٹ اور ساگو دانہ یا

چاہئے چینی کا ملانا اس دودھ میں کچھ ضرور نہیں کیونکہ شکراستین کافی ہے جیسا کہ اس سے
 صاف ظاہر ہے بعد دس روز کے دو تہائی گدہ ہی کے دودھ میں صرف ایک تہائی
 پانی کا ملانا کافی ہے اور جب بچہ کی عمر دو چار ہفتہ کی ہو جاوے تب گدہ ہی کا دودھ اس سے
 بلانا چاہئے یعنی نہ ہے کہ بچہ کے پیو کا دودھ اس قدر گرم ہونا چاہئے کہ جقدر کا دودھ
 ہوتا ہو یعنی تھوڑا میٹر کے ۹۶ یا ۹۸ - درجہ تک کی گرمی اس دودھ میں ہونے
 چاہئے اور یہ اس طور سے ہو سکتا ہے کہ وقت پلانے کو دودھ میں کہوتا ہوا پانی ملا
 دیوے اور جب شیر گرم ہو جاوے تب اس دودھ کو پلا دیوے جب خالص
 دودھ بلانا شروع کرے تب اس دودھ کو آب گرم پر رکھ کر گرم کر لیوے سو
 گرمین اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ دودھ بگڑنا چاہئے اور بہتر تو یہ ہے کہ
 بچہ دو دنوں کے گرم رہتے رہتے دودھ بچہ کو پلا دیا جاوے اور جو دودھ میں پانی ملانا
 منظور ہو تو اسی وقت ملاوے کہ جب بچہ کو پلانا ضرور ہوا اور وہ پانی بھی
 اوس قدر ملانا چاہئے کہ جقدر بچہ پی سکے اور جو باقی دودھ اور پانی بچے اسکو
 پینک دینا چاہئے کیونکہ بچہ کے پیو کا دودھ ہمیشہ پلانے ہی وقت تازہ تیار کرنا
 چاہئے۔ اگر یہ بات ممکن ہو تو بچہ کے لٹو ایک گدہ ہی گہر میں رکھنی چاہئے اور اسکو
 بچہ کا سنہہ باندھ دینا چاہئے اور اس گدہ ہی کی خوراک کی بھی بڑی احتیاط
 کرنی چاہئے ورنہ اسکا دودھ بچہ کے موافق مزاج نہوگا۔ اور جو یہ بات ممکن نہو
 تو صبح اور شام ایک گدہ ہی کو گہر میں سٹکا کر اسکا دودھ دو لیوے۔ عہد طفولیت
 کو اوائل میں بچہ کو گائے کا دودھ نہ بلانا چاہئے کیونکہ زیادہ صہیت کو باعث ہووے
 بچہ کو ہضم نہوگا۔ بالفرض اگر ضرورت ناگھائی کا دودھ پلایا جاوے تو دس روز
 کی عمر تک اس دودھ کی ایک تہائی میں دو تہائی آب گرم ملانا چاہئے اور
 اس دودھ میں قدری چینی بھی ملانی چاہئے کیونکہ گائے کے دودھ میں چینی کا

مقدار متناسبہ اقسام دودہ حیوانات کے
 سو حصہ مفروضہ میں نقشہ ذیل سے معلوم ہوتا ہے
 نقشہ

دودہ					اجزاء دودہ کے
بکری کا	بٹیری کا	گائے کا	گدھے کا	عورت کا	
۴۶۰۳	۳۶۵۰	۳۶۴۸	۱۶۸۳	۲۶۵۰	مکڑین - یعنی جبٹ
۳۶۳۲	۴۶۴۰	۳۶۱۳	۰۶۱۱	۵۶۱۸	بٹر یعنی دھنیت
۵۶۲۸	۵۶۰۰	۴۶۴۴	۶۶۰۸	۶۶۵۳	شوگر یعنی شکر
۰۶۵۸	۰۶۶۸	۰۶۶۰	۰۶۳۴	۶۶۵۳	اقسام طرح کے نمک
۸۶۶۸۰	۸۵۶۶۳	۸۴۶۰۳	۹۱۶۶۵	۸۵۶۸۰	داڑھ یعنی مائیت

نقشہ صدر سے صاف ظاہر ہے کہ بٹیری اور بکری کا دودہ عورت کے دودہ کے قریب
 متناسبہ ہے اتنا اور کسی حیوان کا دودہ نہیں ہے مگر انہیں ہم قباحت ہے کہ عورت
 دودہ کی نسبت انہیں جبٹ زیادہ ہے کہ جسکے باعث دودہ ثقیل ہو جاتا ہے اور
 بچہ کو مضہم نہیں ہوتا علاوہ ازین بکری کے دودہ سے ایک قسم کی بدبو آتی
 ہے کہ جسکو بچہ پسند نہیں کرتا اور گائے کے دودہ کی نسبت بھی قباحت
 عائد ہو سکتی ہے مگر چونکہ اس میں دھنیت کم ہے اسلئے اس دودہ میں بچہ
 پانی ملا کر بچہ کو پلانے سے وہ قباحت دفع ہو سکتی ہے۔ پر سبب اور اجزاء کے
 گدھے کا دودہ عورت کے دودہ کے بہت ہی مثل ہے۔ لہذا اہل طفولیت کے
 ابتدا میں گدھے کا ہی دودہ بچہ کو پلانا چاہئے۔ پس جب گدھے کا دودہ پتلا
 کیا جاوے تو بچہ کی دس روز کی عمر تک اس دودہ میں نصف آب گرم

زیادہ فرق نکریں اور اگر غذا اوسکی بدلی منطور ہو تو بتدریج بدلیں۔ شراب
و غیرہ گرم چیزوںکی کچھ ضرورت نہیں ہے

مقالہ سوم

غذا مصنوعی واسطی بچوں کے

پوشیدہ زہر کہ شیر خوارہ طفلوں کے موافق مزاج وہی غذا مصنوعی ہوتی ہے
کہ جو شیر مادر کے بہت مشابہ ہو چنانچہ حیوانات کا دودھ مثلاً گدھے یا گاٹی یا بکری
یا بکری کا دودھ تمام حیوانات کے دودھ کے اجزاء ایک ہی ہیں مگر انکے مقدار میں
فرق ہے اور اس تفریق کو جاننا ضرور ہے اسلئے کہ جب آدمی کا دودھ شیر
ہو تو ہم سب دودھ سے ایک ایسے حیوان کا دودھ واسطے پرورش بچہ کو انتخاب
کر سکیں کہ جو ماں کے دودھ کے بہت مشابہ ہو۔ عموماً ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہر
حیوان جو دودھ میں جتنے اجزاء ہیں وہی دس حیوان کے بچے کی پرورش کے لئے
کافی ہیں۔ مثلاً دودھ کا ایک جزو وہ ہے جسکو انگریزی میں - کر - زین بولتے
ہیں اور عربی میں جبن کہتے ہیں کہ جس سے شیر بنتی ہے اور دودھ کی اس جہت
سے پرورش اور بالیدگی بچہ کی ہوتی ہے دوسرا جزو دودھ کا وہ جزو کہ جسکو
انگریزی میں بٹر بولتے ہیں یعنی پکھائی اسی جزو سے شحم یعنی چربی پیدا
ہوتی ہے۔ بیشتر اجزاء دودھ کا شکر جو کہ جسے بچہ کے جسم کی حرارت قائم رہتی
ہے۔ چوتھا اقسام طرح کے نمک کہ جن سے نظام عطشی یعنی بچہ کی ہڈیاں بنی ہیں

بچہ فوراً ماندہ پڑ جاتا ہے برعکس اسکے بعض دفعہ ایسی بھی دائمی مل جاتی ہے جو بہ قوف اور بولدلی ہوتی ہے اور جبکہ پستانوں میں بہت سادودہ ہوتا ہے۔ اس دائمی کا ایسا ہی خیال ہوتا ہے کہ بچہ کو خوب ذریعہ کر دیکھو بہ انخیال اوسکو وہ سارے دن دودہ پلاتی رہتی ہے اور ما سوا اسکے کوئی اور چیز بھی چہا کر کہلا دیتی ہے نتیجہ جسکا یہ ہوتا ہے کہ سبب امتلا کے بچہ ماندا پڑ جاتا ہے اور اُسکو دست و قلم لگ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو کر آتا ہے کہ چند روز کے بعد دائمی کو حیض آنے لگتا ہے جس سے مقدار دودہ کی گھٹ جاتی ہے اور خاصیت اوسکی بگڑ جاتی ہے اگرچہ وہ بیان اسباب کو خوب جانتی ہیں تاہم جان بوجھ کر اُسکو چھانا چاہتی ہیں۔ اس صورت میں حیض کی تاریخ کو دریافت کریں اور یہ بات اگر عین ابتدا دودہ پلانے میں ہو جاوے اور بچہ بہت چھوٹا ہو تو اوسکو اس دودہ سے ضرور نقصان پہنچے گا پس اس دائمی کو بدلنا چاہیے لیکن حیض اگر بعد ساتویں یا آٹھویں مہینے کے آ جاوے تو اس صورت میں چونکہ بچہ کو چند ان ضرر نہیں پہنچتا تو ایسا کریں کہ جب تک دائمی کو حیض آتا ہے جتنک ممکن ہو بچہ کو اُس کا دودہ نہ پلا دیں بلکہ اوسکی عوض میں اس یام تک غذا مصنوعی سے اس بچہ کی پرورش کریں +

دائمی کو ہرگز اسباب کا اختیار نہ دیں کہ جب اوسکا جی چاہے وہ بچہ کو دوا پلا دی اور والدہ کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہئے کہ انہی آرام دہ لہو دایان بچہ کو اکثر افیون کہلا دیتی ہیں تاکہ وہ رات کو وقت صند نہ کر سکے۔ اگر دائمی رات کو جاگنے سے تھک گئی ہو تو دن کے وقت ایک یا دو گھنٹہ اوسکو سو فی کی اجازت دیں اور اس وقت تک بچہ کو کہلائی کے سپرد کر دیں + دائمی کی غذا کے باب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس غذا کی اوسکو پہلے سے عادت تھی اس سے

جنکا بیان نیچے کیا جاتا ہے کہ ناہایت ضرور ہے یعنی دائی کی عادتیں اور خصلتیں
کیسی ہیں آیا وہ فحش ہے یا صاحب نیر اور عزت والی ہے اگر دائی فحش اور
بدنیز ہو اور ہمیشہ میلی کچلی ہے اور بچوں کی اسکو محبت نہ تو ہرگز اسکا دودھ بچہ
بچہ کو نہ بلاوے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ دائی کی عادتیں اور اسکی خصلتیں
اور مزاج وغیرہ بچہ کو سرائت کر جاتی ہیں +

فقہہ ۲۔ چند اشارات درباب نظام دائی دودھ پلائی کے +

صبح و شام دائی کو ہوا خوری کرا دین اس سے دودھ اوسکا بڑھے گا اور
تازہ ہو جاوے گا ورنہ گہرے اندر بند رکھنے سے دودھ بگڑ جائیگا۔ ہر روز
اوسکو غسل کرا دین جس سے اوسکو طاقت ہوگی اور جسم اوس کا صاف
ستھرا رہے گا + دائی کو علی الصباح اٹھنا چاہئے اور گہرے کاروبار میں بھی
کیقدر مصروف ہونا چاہئے کیونکہ صرف بچہ کی خدمت اوسکی طبیعت کو درست
رکھنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ بچہ کو جب دائی کے سپرد کریں تو اوسکی والدہ
کو لازم ہے کہ چند روز تک دائی کی نگران حال رہے اور اوسکو روز بہ روز
ہدایت کریں اور چپکے سے بچہ کو کمرے میں جا کر دیکھیں کہ دائی اون ہدایتوں
معمیل کرتی ہے یا نہیں اور مزاج میں اوسکے خوشی اور محبت کے آثار باہر
جاتے ہیں یا نہیں + اس موقع پر ہمکو دو یا تین بچہ یاد آتی ہیں جو ان فرقوں کے
لوگوں کے سبب حال میں دعوئے میں کہ یہ بات ممکن ہے کہ بعد ایک یا دو
چھینے کو دائی کا دودھ کم ہو جاسکتا ہے اگر وہ عورت ایماندار نہ تو سچائی
والدہ سے اس امر کو پوشیدہ رکھے گی (کیونکہ اوسکو اپنی نوزک پکا خیال ہوئی)
اور بچہ کو کوئی شے خراب طور سے پوشیدہ تیار کر کے کھلا دیوے گی جس سے

ہو جائے گا کیونکہ اس وقت دودھ پلانا ہوتا ہے اور استین مائیت یعنی بالی اسقدر زیادہ اور دہنت یعنی چکنائی اسقدر کم ہوتی ہے کہ اس دودھ سے تم یا چھوڑ کر بچہ کی پرورش نہیں ہو سکتی ہیں اس عمر کے بچہ کو ایسی دای کی دودھ پلانا چاہیے کہ جسکے لڑکے کی عمر اس بچہ کی عمر کے قریب ہو اور دای کی مقرر کرنے میں اس کا بھی خیال رکھو کہ وہ بڑھا ہوا چنانچہ اسکی عمر یا ۱۲ برس سے یا سال تک کافی چاہیے اور اگر وہ ایک یا دو لڑکے کی ماہو تو بہت خوب ہے کیونکہ ایسی عورتوں کا دودھ بہت ہوتا ہے اور بچہ کی پرورش میں اسے خوب تجربہ کار ہوتی ہیں +

پنجم - ایام دودھ پلانے میں دای کو حیض ہونا چاہیے یا نہیں + اگر دای کو دودھ پلانے کے ایام میں حیض ہوتا ہے تو اسکو ہرگز مقرر نہ کریں اور اسبابت کو دریافت کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ دایوں کا اکثر یہ قاعدہ ہے کہ جب اسے حیض کے بات ہو چئے تو وہ فوراً کچھ دہنتی ہیں کہ ان کو ایام دودھ پلانے میں حیض ہوتا ہے اسلئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حیض کے آئینہ دودھ انکا بڑھنا اور تازہ ہو جاتا ہے اور انکی سمجھ میں یہ دودھ نہیں بچونکے لئے بہت مفید ہے لیکن حقیقت میں یہ انکا خیال خام ہے چوٹے بچہ کو وہ دودھ ہرگز مفید نہیں ہوتا اور اسکے پینے سے انکو سبزدنگ کو بتلو دست آتی ہیں +

ششم - دای کا لڑکا کس حالت پر ہے - اس لڑکے کو ہر صورت تندرست ہونا چاہئے اور اسکے جسم پر کوئی مرض جلدی نہ ہونا چاہئے اسلئے اس لڑکے کا سر اور گلا اور دانتوں کے مسوڑوں کو بغور امتحان کرنا چاہئے اگر ان باتوں میں جھکاؤ ہو چکا ہے دای اور اسکے لڑکے کو کامل پاؤے تو بیشک حکیم اس دای کو قابل دودھ پلانے کے سمجھتا ہے اور حکیم کے سوا کسی بچہ کے والدہ کو بھی دای کا امتحان ان باتوں میں کہ

ہونا چاہیے بلکہ انہیں بستان کی اصلی ساخت کا زیادہ ہونا ضرور ہے کہ
 جسکی دبائے بستان سخت اور گرہ دار معلوم ہوتے ہیں اور اگر سب چربی
 کے بڑے ہوں تو ڈھیلی اور لٹک جاتے ہیں اور انکی بیٹیاں خوب نکمے
 ہوں۔ **سیوم**۔ دائی کا دودھ اچھا ہے یا نہیں۔ اسکی مدد ساخت
 ہے کہ اگر دودھ اچھا ہوگا تو وہ پتلا ہوگا اور رنگ اسکا سفید اور تھوڑا سیلا
 اسکا شیریں ہوگا اور جب اس دودھ کو چند عرصہ کے لئے رکھ دیا جاوے
 تب اسپر ملائی تیرنے لگے گی اور اس دودھ کو بائیمین ڈالنے سے وہ بانی
 قدر رکھ لایا ہو جاوے گا اور وہ دودھ بانی میں ڈالو تو ہی دفعتاً بانی کے
 نیچے نہیں بیٹھ جاوے گا۔

چھارم۔ بچہ کی عمر کس قدر ہونی چاہیے اگر بچہ ہنوز چھٹی سے بائیمین
 نکلا ہے تو اسکو دودھ ایسی دائی کا بلانا چاہئے کہ جس کا بچہ تین یا چار
 ہفتہ سے زیادہ عمر کا نہو اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ دائی
 کو لڑکوں کی عمر اس بچہ کی عمر کی جتنی قریب ہوگی اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ بعد
 وضع حمل کے تھوڑی سی مدت تک دودھ پتلا رہتا ہے اور بعد اسکے گاڑا
 ہو جاتا ہے۔ پس اگر بہت نہیں عمر کے بچہ کو دودھ پلانے کے لئے کوئی ایسی
 دائی مقرر کی جاوے کہ جسکے لڑکے کی عمر تین یا چار مہینے کی ہو تو اسکا
 دودھ ہرگز اس بچہ کو موافق نہوگا۔ کیونکہ دودھ اس دائی کا گاڑا
 ہوگا اور چونکہ بچہ بہت چھوٹا ہے اسلئے اسکو وہ گاڑا دودھ مضم نہوگا
 اور نتیجہ اسکا یہ ہوگا کہ بچہ بیمار ہو جائے گا اور برعکس اسکے اگر بچہ کی
 عمر ۴ یا ۵ مہینوں کی ہو اور اسکو کسی ایسے دائی کا دودھ پلایا جاوے
 کہ جسکو لڑکا جننے تھوڑی سی روز ہوئے ہوں تو وہ بچہ کمزور اور بیمار

مقرر کرنے کسی دای دودہ ہلائی کے اس عورت کو بنظر دقیق و تحقیق خوب
استحان کرنا چاہئے کہ وہ قابل دودہ ہلانے کے ہے یا نہیں تاکہ بچہ انہی کے
کے غم میں خون جگر پیانا نہ پڑے اور خصوصاً حکیم کو قابلیت دای دودہ ہلائی
کی سعی و اقصیت کا احتساب کرنی پر ضروری کیونکہ اسکو اکثر انہی راہی سبب پر
دینی پڑتی ہے اور خدا خواستہ اگر اسکی راہ ناقص ہوئی اور بچہ کو دودہ سے
نقصان ہوا تو اس بچارہ کی مٹی خراب ہو وقت استحان دای دودہ ہلائی
کے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہئے۔

اول یہ دیکھیں کہ اس عورت کو سبط حسو صحت ہو یا نہیں۔

دوم اسکے بتانے کا حال دریافت کریں۔

سوم اس کا دودہ اچھا ہے یا نہیں۔

چہارم عمر دیکھی ہو اور بچہ کی دریافت کریں۔

پنجم ایام دودہ ہلانے میں دای کو حیض ہوتا ہو یا نہیں۔

ششم دای کا بچہ کس حالت پر ہے۔

اول یعنی دای کو سبط حسو صحت ہو یا نہیں۔ اگر وہ عورت موٹی تازی ہو

اور اس میں مرض اسکا اقبولا یا اور کوئی موروثی مرض مثلاً تب دق یا

کھٹیا یا آتشک وغیرہ کا اشتباہ نہ ہو اور زبان اسکی صاف ہو اور ماضی میں

کسی طرح کا خلل نہ ہو اور دانت اور مسوڑے اسکے مضبوط ہوں اور اسکو

کوئی مرض جلدی بھی نہ ہو اور اسکے تنفس سے بد بو نہ آتی ہو تو اس دای

دودہ ہلائی کو تندرست کہیں گے۔

دوم یعنی دای کے بتانے کا حال۔ دای کو بتان سخت اور بڑی

اور ابھرے ہوئے ہونی چاہیے لیکن بڑا بچہ سبب زیادہ جلدی کے

شکم کریں اگر تشنگی کا غلبہ ہو تو بانی کم پلا دین بلکہ بانی سے صرف کلی ہی کر دین
 تاکہ دہن تازہ ہو جاوے یا دو چار دانے انگور کر یا دو چار قاشقین رنگتر جو
 کی کھلا کر تسکین بخشیں اور جوستانوں میں دودھ کا غلبہ ہو یا
 پھول کر تن جاوے اور اس میں بہت درد ہونے لگے تو وہ دودھ دو ہکر
 ہینک دین اور پانچ سے اسیٹ تک چار چار یا پانچ پانچ گھنٹہ بعد روغن زیتون
 کی مالش کریں +

منسخہ

کباؤنڈ سوپ لینی منٹ ————— دیرہ آنوس
 لاؤنم ————— ۳ ڈرام
 دو لون کو ملا لیں +

مقالہ دوم

+ خدمتِ امی دودھ پلائی کی +

فقہہ - ۱ + تعریف مرضہ یعنی دای دودھ پلائی کی +

واضح ہو کہ احتیاج دودھ پلائی دای کی تہی ہوتی ہے کہ جب والدہ بچہ کی
 سبب مرض یا کسی اور باعث اپنی شیرخواری کو دودھ پلانے سے معذور ہو
 یا اور یہ بات بارنا دیکھنے میں آتی ہے کہ دودھ پلائی دای کے ناقص ہونے
 کے باعث سیکڑوں بچوں کی جان ہن آئی جاتی ہے اور انہیں ایسویکی
 طفیل سے ہزاروں کو ایسی ایسی سخت مرض ہو جاتی ہیں کہ ابام شباب
 بہتر ہی دے مسافر راہ عدم کے ہو جاتے ہیں پس یہ بات ضرور ہوئی کہ بوقت

بلانا پڑتا ہے لیکن ہم یہ ایک قاعدہ عام بتلاتے ہیں کہ جس صورت میں بچہ اور بچائی دونوں تندرست ہوں اور اس حالت میں ۹ مہینے سے کم اور ایک برس سے زیادہ بچہ کو دودھ نہ بلانا چاہیے اور یہ کہ جب بچہ اور اسکی مادہ دونوں تندرست ہوں اور بچہ کو کئی دانت بھی نکل آئے ہوں اور اسکو کسی قدر عادت مصنوعی غذا کی بھی پڑی ہو تو نو مہینے سے بتدریج دودھ پھلانا شروع کر دیں اور برعکس اسکی اگر بچہ کمزور اور لاغر ہو اور دانت اسکو دیر سے نکلین اور اسکی تندرست ہو اور دودھ بھی اسکا خوب زیادہ ہو اور خاصکر اگر وہ موسم جاڑ لگا ہو تو کئی مہینے اور بھی دودھ بلانا بہتر ہے۔ اس صورت میں دانت کا نہ نکلنا دلیل اس بات کی ہے کہ بچہ مہنوز سوا شیر مادر کے کسی اور غذا سے پرورش پا سیکر قابل نہیں ہو اسکی۔ دودھ پڑنا ہی اس وقت ہرگز نکرین کہ جب بچہ کو دانت نکلے ہوں اس میں سعدہ کے بگڑ جانے اور تشنگی ہو نیکا خوف ہو اور جو بچہ ایسی عورت کو شکم کا ہو جسکو سل کی بیماری ہو اور وہ بچہ کسی تندرست دائمی کا دودھ پتیا ہو تو وقت معمولی سے زیادہ مدت تک اسکو دودھ پینا چاہیے۔

ترکیب۔ دودھ چڑا سیکر یہ ہے کہ دودھ بتدریج چڑانا چاہیے اکثر ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ بچہ کی عمر جب چھ مہینے کی ہوتی ہے تبھی سے اسکو شیر مادر کے دھین دودھ اور بھی کچھ غذا کھلایا کرتے ہیں پس اس وقت سے گو یا بچہ کو دودھ پڑنا ہی کا سامان کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ جب اسطور سے بچہ کو کھلانا شروع کریں تو اس غذا کی خاصیت اور مقدار کا لحاظ ضرور رکھیں نہیں تو بچہ بیمار پڑ جائے گا۔ جب بچہ کی دودھ پڑنا ہی کج جاتی ہے تو بعض دفعہ بچہ ولی کا دودھ خشک کر دینا پڑتا ہے۔ اسکی ترکیب سہل ہے چنانچہ عورت کی غذا کم کر دیں۔ اور سوا خشک چیزوں کے اور کچھ ندین گاہے گاہے تخمین جلاب بھی صلاح

پھیکا پڑ جائیگا اور وہ مریض ایسا نظر آئے گا کہ جیسا اس پر بڑا باطن ہوتا ہے
گوشت اوس کا نیم اور ڈھیل پڑ جائیگا مانتہ باؤن و بلو پڑ جائیں گے پیٹ نکل
آوی جائیگا اور اوسکو دست بد بودار آتے رہیں گے اور چند ہفتہ کے بعد چیرہ تر و تاری
چہرہ پر سابق مین تھی وہ بالکل جاتی رہیگی اور طفل مریض جڑ پڑا اور ایسا لڑ
ہو جائے گا۔ کہ جبکا جینے سے مرنا ہی بہتر ہو۔ علاج ایسی سچہ کا صرف یہی ہے
کہ اوسکو فوراً کسی دوسرے تندرست دائی کے حوالہ کر دیں کیونکہ بالفرض
اگر سچہ اس حالت کو نہ پہنچا اور جیتا ہی رہا تو طبیعت اوسکی کسی مہلک مرض
مثلاً اسکرافیا یا سیل کی بیماری میں مبتلا ہو نیکیو مایل رہیگی جس میں لان بچہ
کو اوسو بینک اپنی ماسح حاصل کیا ہے ہمیں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کتنی
مدت تک عورت کو دودھ پلانا چاہیے اگرچہ اوس مدت کو حد ہم نہیں بتا سکتے
تاہم اس سوال کا جواب ہم یوں دے سکتے ہیں کہ خواہ کوئی عورت کتنی
اپنی صحت کو وہ اپنی سچہ کو ایک برس یا ۱۸ مہینے سے زیادہ مدت تک دودھ
نہیں پلا سکے۔ ایک برس یا چودہ مہینے بعد وضع حمل کے حیض اکثر شروع ہو جاتا
کرتا ہے پس جب حیض بدستور آئے لگے اور مقدار دودھ کی روز بروز گھٹتی
جاوے اور خاصیت اوسکی بگڑ جائے اور اوس دودھ سچہ کی پرورش
بخوبی نہو سکے تب سچہ کا دودھ فوراً چھڑا دینا چاہیے جسکی ترکیب یہ ہے *

دودھ بڑ مائی *

فقہ ۵-۶

چونکہ دودھ بڑ مائیک وقت کئی حالتوں پر موقوف ہے پس اسکا کوئی خاص
وقت مقرر نہیں کیا جاسکتا مثلاً بعض عورت کو بسبب ضعف کہ چھ مہینے میں
دودھ چھڑانا پڑتا ہے اور بعض کو بسبب ضعف اپنی سچہ کے ایک سال تک دودھ

تو ایسی عورت اگر اپنے پہلے بچہ کو دودھ بلا سیکا قصد کرے گی تو بیشک اسکو ضعف
 زیادہ ہو جاوے گا۔ اور بیماریاں آن گھیریں گی۔ پس چونکہ یہ بات درست ہے
 کہ دودھ کو بلا سیکر بعض دفعہ عورت نہایت ضعیف اور ناتوان ہو جاتی ہے۔
 لہذا اول کو واقفیت پہلے علامات ضعف سے ضرور ہونی چاہئے جو یہ ہیں کہ بچہ
 جب دودھ پینے لگتا ہے تو پہلو اسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت اوسکی گری
 جاتی ہے اور بعد ازاں معدہ کے مقام پر غلو اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ
 مقام دبا جاتا ہے بعد اسکے بہو کہ اس عورت کی مر جاتی ہے باخانہ قبض ہوتا ہے
 اور بایں سبلی میں درد معلوم ہوتا ہے تب سر اوس کا گھومنے لگتا کانوں میں
 شن شن کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ عورت نہایت بہت ضعیف
 ہو جاتی ہے بعد ازاں انرا اس ضعف کا سینہ میں یوں خایان ہوتا ہے کہ
 دم لینے میں اسکو تکلیف ہوتی ہے خنک گھاسنی ہوتی ہے اور ذرہ سی حرکت
 کی طلب اسکا دھڑکنے لگتا ہے اور چون چون ضعف زیادہ ہوتا جاتا ہے چہرہ مرصعہ کا
 ہینکا پڑ جاتا ہے اور وہ دبلی ہوتی جاتی ہے رات کو وقت پسینہ سر مہا جاتی ہے
 کمال ضعف عاید حال ہوتا ہے باؤں کو گھنیر سوچ جاتی ہیں اور دست دبا کا ہنر لگتو
 ہیں اور بعض دفعہ ضعف بصارت بھی ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے علاج کو با سبیل
 سوا اسکو اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جبکہ راجلہ ہوسکے بچہ کا دودھ چڑھا دین
 کیونکہ جب والدہ کا یہ حال ہو جاوے اور اوس حالت میں بھی بچہ دودھ پیتا رہے
 تو اسکو بڑا ضرر یہہ پہنچتا ہے کہ فرض کیجئے کہ قبل از بیماری اپنی والدہ کے بچہ
 فریہ اور توانا ہوا اور بعد اوس بیماری کے اپنی ما کا دودھ پیتا رہے تو روز بروز
 وہ گھٹتا جائے گا کسل ہوگا اوسکی والدہ کا دودھ جو اس حالت میں پیدا ہوگا
 اوس دودھ کی نتو خاصیت اور نہ مقدار بچہ کی پرورش کو قابل ہوگی لہذا چہرہ

اور پشت میں اوسکے درد ہوتا ہے علاوہ اسکو اسبات کو بھی یا در کہیں کہ ایک پستان کو بہ نسبت دوسرے کے زیادہ نہ پلا دین دونوں کو باری باری سے برابر پلاؤں کیونکہ اسکے خلاف کرنے سے ایک پستان بہ نسبت دوسرے کو زیادہ بڑھ جاوے گا اور اوس میں دودھ جمع ہو کر دہنل پیدا ہو جاوے گا کہ جس مرض کو ہندسی کہتے ہیں بولتے ہیں اور جسکی علامات اور علاج نہایت تشریح کے ساتھ پرچہ بحکمت نمبر ۱۱ جلد اول آئندہ عین دہج ہو (دیکھو اوس پرچہ کو) علاوہ اس برائی کے صرف ایک ہی پستان کو زیادہ پیڑ سے بچہ کو بھی ضرر پہنچتا ہے چنانچہ کبھی اوسکو ایک آنکھ بینگی ہو جاتی ہے اور کبھی جسم اوسکا اوس جانب کو بل کہا جاسکتا ہے۔

فقہ ۵۔ زیادہ دن تک دودھ پلانے پر بچہ اور بچہ والی دونوں کا نقصان اسبات کا ذکر اوپر کیا گیا ہے کہ عورت ایسی تندرست کبھی نہیں رہتی جیسی ایام دودھ پلانے میں اکثر رہا کرتی ہے لیکن اس قاعدہ کے مستثنای میں مثلاً ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ پلانے کی خدمت بعض صحت بخش ہونے کے عورت کو اختیار لاغراور ناتوان کر دے سکتی ہے کہ جب وہ مر ہی جاسکتی ہے۔ یہ بات دوسرے ہو سکتی ہے یا تو زیادہ دن تک دودھ پلانے سے یا نہایت ضعیف اور لاغری ملت میں دودھ پلانے سے۔ سب اول کے نظائر روزمرہ دیکھنے میں آتے ہیں مثلاً اکثر غریبوں میں یہ قاعدہ ہوا کرتا ہے کہ ان پر بچہ کو ۱۸ مہینہ یا دو برس با آہی زیادہ مدت تک بھی دودھ پلاتے ہیں تاکہ حمل نہ ٹھہر جاوے نتیجہ جکا یہ ہوتا ہے کہ عورت جلد کم زور اور ناتوان ہو جاتی ہے کہ جس باعث وہ صد طرہ کو استقام و آرام میں مبتلا ہو جاتی ہے اور دوسرے کی نظیر یہ ہے کہ عورت اگر ابتدا ہی سے کم زور اور لاغر ہو اور اوسکے دو یا تین بچہ ہی ہو گئے ہوں۔

ان بانو نکا علم بچہ والیوں کو ہونا چاہیے تاکہ جب دے اپنے بچہ کو دودھ بلاوین تو
 اسے محفوظ رہیں۔ علاوہ ان اسباب کو دودھ کی مقدار اور خاصیت اور سببوں سے
 بھی بدل جاسکتی ہے مثلاً بعض دفعہ جب ایام دودھ بلانے میں حوصلہ آجاتا ہے
 تو خاص اوس مدت حوصلہ میں دودھ بگڑ جاتا ہے اور جس بچہ والی کو ایام دودھ
 بلانے میں حوصلہ آیا کرتا ہے وہ عورت بہت دن تک دودھ نہیں بلا سکتی۔ اور
 اوس دودھ کے پنی سے بچہ کا مزاج بڑبڑا ہو جاتا اور اوس کو دست و قی شروع
 ہو جاتی ہیں۔ اگر حوصلہ وضع حل کے تھوڑی ہی دن بعد آئے لگے تو دودھ اوس
 عورت کا اس قدر بگڑ جاتا ہے کہ بچہ نہایت ماندہ پڑ جاتا ہے اور تب اوس کو دوسری
 دوا کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اگر حوصلہ چھ یا سات مہینے کے بعد آوے تو اس میں
 بچہ کو چند ان ضرر نہیں پہنچتا پس اس قاعدہ کو یاد رکھیں کہ جہاں تک ممکن ہو
 ایام حوصلہ میں بچہ کو دودھ نہ بلاوین اور اوس ایام تک غذائے مصنوعی سے
 اوسکی پرورش کریں۔ دودھ پر دوا کا اثر بھی ہو جاتا ہے جہاں سے جہاں سے
 کہ باب میں ہم نے اوپر ذکر کیا۔ ایام دودھ بلانے میں اگر حمل ٹھہر جاوے تو بھی
 دودھ بگڑ جاتا ہے۔ بعض عورتوں کو دودھ بلانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا جہاں سے
 کہی تو وہ کھڑی ہو کر بلاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ بیٹھ کر اس دھنگ سے
 بلاتی ہیں کہ بچہ کو نہ میں پر بیٹھلا کر اور اپنے کو جھکا کر اوس کے منہ میں بیٹھان
 لگا دیتی ہیں جس سے ناحق کی تکلیف اور نگو ہوتی ہے۔ پس ہم کو دودھ بلانے کی
 ترکیب بھی ضرور بتلانی پڑی وہ یہ ہے کہ جب بچہ لیٹا ہے تو اوس وقت لیٹو
 لیٹو اوس کو دودھ بلاوین اور جب نہ میں پر کہیلتا ہو اور اوس کو دودھ کی
 اشتہا ہو تب بچہ والی کو چاہیے کہ دوزانوسٹڈ بیٹھ کر اور بچہ کو اپنی گود میں
 لیٹا کر دودھ بلاوے تاکہ اوس کو جھکنا نہ پڑے جس سے وہ جلد تک جاتی ہے

کہ جب بچہ والی کی مزاج میں کسی طرح کا فرق پڑتا ہے۔ تب دودھ فوراً بڑھ جاتا ہے
 اور اس دودھ کے پنی سے بچہ بیمار پڑ جاتا ہے چنانچہ اس موقع پر دوسرے بچہ کا
 حال بیان کرتے ہیں جنکو ہمیں بچہ خود دیکھا کہ نہایت تندرست تھا اور اپنی ما
 کا دودھ پیکر دفعتاً بیمار پڑ گئے۔ انہیں سے ایک بچہ کو دفعتاً تشنج ہو گیا جس سبب
 اسکا دریافت کیا تو یہ معلوم ہوا کہ اس بچہ کے باپ کو مرگی ہو گئی تھی جس کے کچھ
 سو اسکی ما نہایت متوجش اور گہر لگی تھی ایسی حالت بر جنی میں جیسا دوسرے
 اپنی بچہ کو دودھ بلایا تو فوراً اس طفل کو تشنج ہونے لگا۔ ہمیں بتایا علاج کیا
 پر وہ تشنج رفع نہوا۔ پر جب دوسری ایک تندرست عورت کو سہ دودھ بچہ کیا گیا۔
 تب اسکو فوراً شفا ہو گئی دوسرے بچہ کو بھی اسی طور پر تشنج ہوتی دیکھا لیکن
 سبب کا چند مہینے تک دریافت نہو سکا بعد اس مدت کو یہ معلوم ہوا کہ
 جس روز اس بچہ کو تشنج ہوا تھا اس روز اسکی والدہ نے ایک خبر غریب
 یہ سنی تھی کہ اس کے خاوند کا دیوالا بھل گیا اس خبر کو سنتے ہی وہ نہایت کھڑے
 اور ایسی حالت میں اپنے بچہ کو دودھ بلایا جسکو وہ بچہ تشنج میں مبتلا ہو گیا۔
 پس ان حالات کو بیان کر میں ہمارا یہ مطلب ہے کہ عوام الناس کو معلوم ہو جاوے
 کہ دودھ پر طبیعت کا اثر نہایت جلد ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ والی کسی بات سے
 خوف کیا جاوے تو پہلے اس کے دودھ کی خاصیت بدل جاتی ہے اور بعد ازاں وہ
 دودھ اکثر نبد ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچہ والی کا مزاج چڑچڑا ہو تو دودھ گرم اور
 تپلا پیدا ہوتا ہے جس کے پنی سے بچہ کو دست لگ جاتے ہیں یا قبض ہو جاتا ہے
 اگر غصہ کے وقت دودھ بلایا جاوے تو اس دودھ سے بچہ کو شکم میں مروڑ
 ہوتا اور اسکو سبب زنگ کے دست آتی ہیں۔ اور رنج یا غصہ سے یہ بات
 ہوتی ہے کہ دودھ اس قدر کم ہو جاتا ہے کہ دوسری دایہ کی ضرورت پڑتی ہے

اور وقت ہم آگے بیان کریں گے +

فقہ - ۴ - قواعد واسطی قیام صحت بچہ والی کے

یہ بات ظاہر ہو کہ جب تک بچہ والی تندرست نہ ہوگی تب تک اوس کا دودھ ہی صحیح پیدا ہوگا ہر عوام الناس اس بات کو نہ سمجھ کر جو چاہتی ہیں بچہ والی کو کہلاؤ اور بلائے میں نتیجہ اس بدنظمی کا یہ ہوتا ہے کہ دودھ اوسکا بگڑ جاتا ہے اور بچہ اوس دودھ کو پیکر جا رہا ہوتا ہے پس اس فقرہ میں ہم چند قواعد ایسے بتلاوین گے جنکے پابند رہنے سے بچہ والی کا دودھ صحیح اور زیادہ پیدا ہوگا اور بچہ بھی تندرست اور توانا رہیگا۔ دیکھ لیں کہ بچہ والی اگر ہمیشہ تندرست رہے تو غذا اوسکی وہی رہتی دین جو وضع حمل سے پیشتر تھی اور جو اشتہا اصلی زیادہ ہو جاوے تو ایسی قسم کی غذا بڑا دین جو ملکی اور سیرع الہضم ہو۔ اجابت ایک مرتبہ کھل کر ہونی چاہئے اور اگر سہل کی ضرورت ہو تو اوسکو پسند کرنے میں عقل کو کام فرماوین۔ مثلاً اگر یہ بات منظور ہو کہ بچہ بڑھ رہی اوس حلاب اثر ہو جاوے تو ممکن مسہلات مثلاً۔ ایسے سالٹ یا گلاب سالٹ جسکو ہندی میں کہاری نمک کہتے ہیں اوس کا استعمال کریں اور جو یہ مطلوب ہو کہ صرف بچہ والی کو دست آجاوین اور بچہ کو نہیں تو بناتے مسہلات سے حاجت رفع کریں مثلاً روغن بیدانجیر یعنی کشر ایل شحم حنظل یعنی اکٹر اکٹ اف کا لوسنتہ ۵۔ گرین اہرہ ۲۔ گرین اکٹر اکٹ اف۔ ہین۔ بن کے یا سنا کا حلاوا۔ آب سرد یا گرم سے ہر روز غسل کریں اور ہر روز پیادہ پا ہوا خوری کریں کہ ان ترکیبوں سے دودھ صحیح اور کثرت پیدا ہوتا ہے۔ رات کو سویری سووین تاکہ علی الصبح نیند ٹوٹ جاوے خوش و خرم رہیں تاکہ دودھ زیادہ اور صحیح پیدا ہو کیونکہ یہ بات ظاہر ہے

دودھ کم ہو جاوے تو شیر گاؤ میں بانی ملا کر یا خالص اگر بچہ کو موافق آوے
 بذریعہ بوتل کے دودھ کے دانت نکلنے تک بلا دین جب دودھ کی دانت سارے
 نکل آویں اوس وقت تک بھی اگر والدہ کا دودھ ہو تو چند ہفتہ تک اور بھی
 بلا دین لیکن عموماً جب بچہ اس عمر کو پہنچتا ہے تو غذا مصنوعی کی اوسکو ضرور
 پڑتی ہے پس اوس وقت اگر کوئی غذا سواء شیر مادر کے دیوین تو کچھ مضائقہ
 نہیں مثلاً شیر گاؤ خالص یا سہراہ بانی کے جیسا مناسب سمجھیں یا ساگو دانہ یا
 اراروٹ یا سو جی دودھ میں بکھا کر یا آب بخنی جس میں صرف تھوڑا سا نمک
 ہو اور چربی نہ ہو غرض ان میں سے جو ہنسی غذا بچہ کو موافق پڑے دیوین +

واضح ہو کہ چونکہ یہ پہلا ہی دفعہ ہے کہ جس میں ہم غذا مصنوعی کے استعمال
 کریں گے اجازت دیجئے کہ لہذا اسکے پسند کرنے اور تیار کرنے میں اور اوسکی مقدار
 اور ترکیب اسکے استعمال کرنے میں جو جو احتیاطیں درکار ہیں اونکا بتانا ہم
 عین مناسب ہے چنانچہ غذا کا پسند کرنا بچہ والی پر چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ اوسکو
 اس بات کا تجربہ بخوبی حاصل ہو سکتا ہے کہ فلاں غذا بچہ کے موافق ہے +
 مصنوعی غذا اگر تیار کریں گی ترکیب یہ بھی بتلا دیں گے اس جگہ پر ہم
 صرف بھی کہتے ہیں کہ جس ظرف میں وہ غذا بکھا دیں اوسکو خوب صاف ہونا
 چاہئے اور غذا تھوڑی تھوڑی کھلاوین تاکہ امتلا نہ ہو جاوے کہ جسے صدقہ
 طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں +

ترکیب استعمال کریں یہ ہے کہ چھوٹے تھوڑا تھوڑا اور آہستہ آہستہ کھلاوین
 بعد چھ ہفتہ یا دو مہینہ کے دن رات کئی اندر تین یا چار دفعہ کھلاوین اور شیر
 مادر کم بلا دین اس ترکیب سے بچہ کو دودھ چھوڑنے کی عادت پڑتی ہوگی
 اور جب وہ وقت آئے گا تب دودھ چھڑاؤ میں وقت نہوگی جسکی ترکیب

کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ مرض کے سبب کو کوئی نہیں دیکھتا۔ بعد گزر جانے
 ایک مہینہ کے رات کو دودھ بلا نئے کے اوقات کو یا تو بدل دین یا رات کو بالکل
 دودھ نہ بلا دین چنانچہ طفل کو ابھر رات کے وقت دودھ بلا کر سلا دین اور پھر
 بھر صبح تک اوسکو نہ بلا دین۔ پہلے پہل تو اس بات پر کریں وقت ہوتی ہے لیکن
 دو چار روز کے بعد بچہ کو خود ہی عادت پڑ جاتی ہے۔ مگر اس بات کو یاد رکھیں کہ
 اگر بچہ نازک مزاج اور ضعیف الجسم ہو تو اس ترکیب کے شروع کرنا تاخیر کریں
 ورنہ ہمیشہ جو قاعدہ کہ سنہرا اور بتلا یا ہے اوسکے باندھ رہیں کیونکہ اس میں فائدہ
 میں ایک تو اس ترکیب سے بچہ کو بد بھنی نہیں ہونی باقی کہ جو ایک عام مرض
 زچہ خانہ کا ہے اور دوسرا یہ کہ بچہ والی کو سونا نصیب ہوتا ہے حقیقت کو
 اندر میں اس بات کو ایسی اہم سمجھتا ہوں کہ جہاں میرا بس جاتا ہے وہاں
 جب بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے میں اوسکی والدہ کے ساتھ کہی اوسکو
 سونے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اوسکو علیحدہ بنگ پر سلواتا ہوں تاکہ
 بچہ والی کو ہیٹ بہ سونا ملے اور سارے دن کا تھکاؤ رفع ہو جاوے
 زچہ کے لٹو کئی گھنٹہ آرام سے سونے میں یہ فائدہ ہے کہ اوسکی طاقت قائم
 رہتی ہے اور دودھ بڑا ہر اور اچھا پیدا ہوتا رہتا ہے اور جب اوسکی نیند
 خراب ہو جاتی ہے تب دودھ کم پیدا ہوتا اور اوسکی خاصیت بدل جاتی ہے
 اور جو اوسکو بالکل سونا نہ ملے تو دودھ بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ اس کیب
 کو دودھ کے دانت نکلنے یعنی چہ یا سات مہینہ کی عمر تک جاری رکھیں اور وقت
 اگر بچہ والی تندرست اور طاقت ور ہو اور اس کا دودھ بھی بچہ کی پرورش
 کے لٹو کافی پیدا ہو تو صرف اسی دودھ پر بچہ بل سکتا ہے اور غذا مصنوعی کے
 ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن جب کئی مہینہ اور بھی گزر جاوے اور اوسوقت

ساتھ مل جاتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کو مدد ہوتی ہے پر سب سے بڑا مسئلہ ہے جب دودھ پلایا جاتا ہے تب یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ اسی واسطے ایسی بچہ مرض اسہال اور درد شکم میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب پستان نو عین کافی مقدار دودھ کے پید ہونے لگے تب فوراً غذا مصنوعی کو موقوف کر کے بچہ کو صرف اپنی والدہ ہی کو دودھ پر ہر درش کرین۔ ہفتہ یا دس روز تک تو جب بچہ مانگو اس وقت دودھ دینا چاہئے مگر بعد اوس مدت کے ایک مہینہ تک اس وقت دودھ کے اندر برابر چار چار گھنٹہ بعد دودھ پلانا چاہئے۔ اس ترکیب سے کافی وقت غذا کے مضام جانیکا مل جاتا ہے اور بچہ کو بہوک بھی لگتی ہے اور باخانہ بھی بدستور آتا ہے اور اس قاعدہ کے باندھ رہنے سے ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بچہ کا مزاج جڑ جڑا نہیں ہونے پاتا اور نہ وہ بار بار روتا ہے کہ جسکے موقوف کرنے کے لئے والدہ کیا بلکہ ساری گھر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بچہ بہوک کو باعث روتا ہے پر یہ خیال اور غلط ہے کیونکہ بچہ بہوک کو سبب نہیں روتا بلکہ بقاعدہ دودھ پلانے کے باعث جب اسکو بد مضمی ہو کر درد شکم ہوتا ہے تب وہ رونا لگتا ہے لیکن والدین باعث جوش محبت کو جب بچہ ذرہ بھی بڑھتا ہے تب ہی اسکو دودھ پلا دیتی ہے حتیٰ کہ دس پانچ منٹ بھی نہیں گزرنے پاتا کہ اس عرصہ میں بچہ کو کئی مرتبہ دودھ پلا دیتی ہے اس بری بات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ میں تداخل ہو جاتا ہے اور غذا جو ن کی تون معدہ کے اندر بڑی رہتی ہے باخانہ قبض یا دست لگ جاتے ہیں بچہ رچرچہ آتا ہے و بچہ سخت بیمار پڑ جاتا ہے اور اخیر میں مر ہی جاسکتا ہے۔ جو اس قاعدہ کے باندھ نہیں رہتے انکی بچہ کو اکثر بد مضمی ہو جایا کرتی ہے اور تب دوا پر دوا دی جاتی ہے کہ کسی طرح وہ بد مضمی رفع ہو جاویں لیکن اون دواؤں

ترکیب کو ساتھ دودھ بلانا چاہئے کیونکہ ننھی بچہ جو اکثر بیمار پڑ جائے یا کرتے ہیں تو صرف
بدانظامی غذائے باعث دوسری مرض میں زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں۔ علاوہ اسکے بچہ
کو باقاعدہ دودھ بلانے کی بجائے والی کی صحت بھی قائم رہتی ہے۔

ترکیب دودھ بلانے کی یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسکو کپڑے پہنا کر
ہنگ پر ایک ایسی مکان کے اندر سلا رکھیں کہ جہاں سرد ہو گا گذر نہ ہو اور نہ
اوسکے انگھون کو روشنی سے تکلیف ہو غرض چند گھنٹہ تک اسی طور پر اسکو
سلا رکھیں اور جب اوس عرصہ تک اوسکی ماہی سوچو کہ بچہ کو جہاں تونے
لگا دین تاکہ قبل از سخت ہو جائے پستانوں کے بچہ پھٹنوں کو کھینچ کر پڑے
اور اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ جب بچہ پھٹنوں کو چوستا ہے تو پستانوں کو دودھ
پیدا کرنے کی اشتعالک ہوتی ہے اور دودھ پیدا ہونے لگتا ہے۔ پس جہاں تک ممکن ہو
بچہ کو پہلو ہی سے اپنی والکھ پھلادین پر اکثر اوقات اور خاصکر پہلوئی زچہ میں
اکثر یہی قاعدہ ہے کہ تیسری یا چوتھی روز بعد وضع حمل کے دودھ پیدا ہوتا ہے
اس صورت میں بچہ کو ایسی غذا مصنوعی سے پرورش کریں جسکی خاصیت کا
دودھ کے برابر ہو مثلاً یا تو خرمادہ کا دودھ اور کھولتا ہوا آب گرم ہوزن لڑ
لین یا گائے کا دودھ ایک تھائی اور کھولتا ہوا آب گرم دو تھائی ملا کر آٹھین
تھوڑی سی شکر ڈالکر بذریعہ ایک بوتل کے جو دودھ بلانے کے لئی بکارتی ہیں
بچہ کو بلا دین یا ایک پیالہ میں اوس دودھ کو رکھ کر اوسمیں کپڑے کی ایک
موٹی سی تیلی چھوڑ دین اور بچہ کے منہ میں اوس تیلی کو لگا دین اس ترکیب
سے دودھ بلانے میں دو فائدہ ہیں ایک تو یہ کہ بچہ تبھی تک اوس بوتل یا تیلی
کو چوستا رہتا ہے جب تک اوسکو اشتها ہوتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ
کودت بچہ کے دہن کے اندر جو تھوک پیدا ہوتا ہے اور وہ اوس دودھ کے

علاج کروانا چاہیے جو جو ترکیبیں اور دیکھی گئیں مین۔ اگر ان ترکیبوں سے بچہ پرورش پاوے گا۔ تو غالب ہے کہ بنیاد امراض اسکا آفیولا اور تھائی سس یعنی تپ دق کی اسکو خوشی جاتی رہیں گی۔ معنی نہ ہو کہ اگر بچہ نے مزاج اسکا آفیولس اپنے باپ سے پایا ہو تو اسکی ماکو لازم ہے کہ خود ہی اپنی بچہ کو دودھ پلاوے +

دوم۔ وہ بچہ والی عورت جو دینی سی بات سے خوف کرتی ہو یا ستم جاتی ہو یا ایک مزاج غصہ ور ہو اسکو بھی اپنے بچہ کو دودھ پلانا چاہئے کیونکہ ایسی عورتوں کا دودھ بچوں کی پرورش کو قابل نہیں ہو سکتا اور تغیرات مزاج کے ساتھ دودھ کی صفت بھی بدل جاتی ہے چنانچہ ایسی عورتوں کا دودھ کبھی کم پیدا ہوتا ہے اور کبھی کبھی خاصیت ایسی بدل جاتی ہے کہ بچہ اسکو پیڑ سے بیمار پڑ جاتا ہے +

سیوم۔ اگر والدہ کو جنون ہو یا مرض پراسس یعنی فالج یا اور کوئی ٹھونکنا مرض ہو تو اس کا دودھ بچہ کو نہ پلانا چاہئے بلکہ دائمی دودھ پلائی کو مقرر کرنا چاہئے تاکہ بچہ کی طبیعت جو اسکی والدہ کی مزاج کی طرف مائل رہی ہے تندرست ہو جاوے +

چھارم جو عورت بسبب عیش و عشرت کو اپنے بچہ کو صرف فرصت ہی کیوقت دودھ پلاوے اسکو ایسی ہم خدمت سے دست بردار ہونا چاہیے کیونکہ جب تک وہ اپنی عیش و خوشی کو ترک کر کے ارادہ مصمم دودھ پلانا نہ کرے تب تک بچہ اس کا ہرگز اس دودھ سے پرورش نہیں پاسکتا اور اسکا نتیجہ آخر کار یہ ہوتا کہ لڑکا بیمار ہو جاتا ہے اور تھوڑی ہی مدت کے بعد مر جاتا ہے +

قواعد بچہ کو دودھ پلانے کے

فقہہ - ۳ -

لیحا ایک کہ بچہ کی تندرستی مین کسی طرح کا فوری نہ ہونے پاوی اور کو پہلی ہی روز

فقہہ ۲-

جن بچہ والیوں کو دودھ نہ پلانا چاہیے اور نکاح بیان +

اول- ایسی عورتیں جن کا مزاج اسکرافیولس ہو اور جس کو خون میں بنیاد مرض

سل کی موجود ہو ایسی عورتیں اپنے بچہ کو نکال دودھ پلانی کی نہیں ہیں۔ خاصہ مومنہ رسک

فیولس اس مزاج کو اکثر میں جس میں مریض کا خون قحط خراب ہو جاتا ہے کہ تمام جسم

کی گلیاں خصوصاً گلو کی پھول جاتی ہیں اور اس میں سب پڑ جاتی ہے اور زخم انگا

مشکل یا مطلق خشک نہیں ہوتا آخر کار بیمار بہت لاغر اور دائم المرض ہو جاتا ہے

اور ایسی مریضوں کو اکثر سل کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ پس ایسی عورت اگر اپنے

بچہ کو دودھ پلاوین گی تو بوسیلہ دودھ کی امراض مذکور اس بچہ کو سرت کر جائے

اور بچہ زمین مبتلا ہو جاوے گا۔ کیونکہ امراض پہلے خصوصاً سل والدین سے

فرزندوں کو اکثر سرت کر جاتی ہیں اور ایسی والدین کے بچے وقت معمولی سے

پیشتر ہی لاپرواہی ہو کر کاروبار و دیوی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر

کم سنی میں شادی بیاہ کر لیتی ہیں۔ چند روز تک تو انہی خوب گذرتی ہے لیکن

دفعاً ہنگام خوشی میں سامان غم موجود ہو جاتا ہے یعنی ایام شباب ہی میں

ویر کمزور اور ہنرمند ہونے لگتی ہیں اور آخر میں انکو سل ہو جاتی ہے اور دیکھتی

ہی دیکھتی انکا مرغ روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتا ہے اور پچھلے جو اولاد

واحفا در ہتھ میں ان بچاروں کا بھی وہی حال ہوتا ہے۔ پس ایسی بچہ والی

عورت کو ہرگز اپنی بچہ کو دودھ نہ پلانا چاہئے صرف اسکی نہیں کہ دودھ پلانے

خود اسکے جسم کو صدمہ پہنچے گا بلکہ اسکی بچہ کو وہ دودھ موافق نہوگا اور اپنی

والدہ کی مرضوں میں وہ بھی مبتلا ہو جاوے گا۔ پس ایسی بچہ کو بارہ یا پندرہ مہینے

تک کسی تندرست دای کا دودھ پلانا چاہئے اور ان بچہ کو ایسی جگہ رکھنا چاہیے

کہ جہانگی ہو اوصاف اور تازہ ہو اور بچہ دماغہ میں خلل واقعہ ہو نہی حکیم کا

سر اوسکی پرورش کرے۔ جن عورتوں کو دودھ بلانیکی تکلیف کی برداشت نہیں
 ہر باجو واسطے حصول لذائذ دنیاوی کے اس خدمت پر فائدہ سوا انکار کرتے ہیں
 انکو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ دودھ کا نہ بلانا گویا اپنی جان پر کھانا ہے۔ کچھ
 تو حیوانات جو نہایت خوشخوار ہوتے ہیں وہی اپنی بچہ کو کیسی محبت کرتے ہیں
 کبھی کسی نے دیکھا یا سنا ہو کہ وہی بھی اپنے شیرخوارہ بچہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور
 انکو دودھ نہیں بلاتی۔ پس جن عورتوں کو خدا تعالیٰ نے ذرہ بھی عقل بخشی ہے
 انکو حیوانوں سے تو بدتر ہونا چاہیے۔ لیکن ان ایسی بھی حالات ہیں جو مانع
 اس خدمت کی ہو سکتی ہیں۔ اس صورت میں عورت اون پر ایمون میں مبتلا
 نہیں ہوتی جبکا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے
 کہ بہ باعث ضعف کے عورت اس خدمت سے محروم رہ جاوے اس صورت میں حکیم
 کی صلاح لین اور اگر وہ اجازت دے تو منگ دودھ بلانے کی کوشش کرنی
 چاہیے اور جب یہ بات ہو کہ بستانوں یا بیٹیوں کے کسی نقص کے باعث دودھ
 پیدا نہوتا ہو تب لاچار اس خدمت دودھ بلانیسے دست بردار ہونا پڑتا ہے۔
 لیکن جب صرف بیٹی ہی میں ایسا نقص ہو کہ وہ بچہ ٹو یا دبی ہوئے ہوں یا
 وہ بہت گھٹ گھٹیا یا جمل گھٹیا ہوں اور دودھ بلانے کے وقت اون میں نہایت
 درد ہوتا ہو تو علاج مناسب سے ان ساری باتوں کو رفع کر کے دودھ بلانا
 چاہیے کہ جس علاج کو ہم نے بار بار چہ جات بحر حکمت میں نہایت تشریح کیے
 ساتھ لکھا ہے لیکن شاذ و نادر ایسی بھی حالات ہو جاتے ہیں کہ جو قطعی مانع
 دودھ بلانے کے ہوتے ہیں اب ہم ان حالات کا ذکر فقیرہ دوم میں کرتے ہیں۔

نہ ماننا ہے کہ جبکہ پتہ دنیا ہی میں ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جو تندرست عورت اپنے بچہ کو
 دودھ نہیں پلاتی وہ صد ماسقم کی اسقام والام میں مبتلا ہو جاتی ہے مثلاً بہا نوغین
 جب دودھ کے طغیانی ہوتی ہے اور بسبب نہ بلانے کی وجہ سے وہ دودھ جمع ہوتا ہے
 تب بہا ن کیسے بھول جاتے ہیں اور انہیں کیسی شدت کا درد اور جکب پیدا ہوتا ہے
 کہ جبکہ بیان احاطہ امکان سے باہر ہے اور جب وہ بہا ن پک جاتا ہے اور اس میں
 پیپ پڑ جاتی ہے اور وہ دُنبل ہوٹ جاتا ہے تب سیکڑون ناسورا دھین پیدا
 ہو جاتے ہیں جن کا اندمال مہینوں بلکہ برسوں تک نہیں ہوتا۔ پس یہ بھی ایک
 سزا ہے اور بچہ والیوں کے لئے جو کہ اپنے طفل شیرخوارہ کی محبت نہیں ہے۔ علاوہ
 اس فائدہ کے کہ دودھ بلانے سے بچہ والی کے نزدیک نہیں آسکتی
 دودھ کے بلائیں اور بھی بہہ فائدے ہیں کہ مثلاً اس ایام کے ایسا کوئی ایام نہیں
 ہے جس میں عورت زیادہ تر تندرست رہتی ہو اور جو عورتیں ایسی ہیں کہ جنکو حمل
 بار بار ٹھہر جاتا ہے اور انکے لئے دودھ بلانا تو نہایت مفید پڑتا ہے کسٹم کہ بار بار
 حمل کے ٹھہرنے سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور انہیں پڑنا یا جلد آن پڑتا ہے۔
 مزید بریں دودھ کے بلائیں یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے کہ بہا ن میں سرطانی
 بیماری اکثر نہیں ہونے باقی کیونکہ اگرچہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں
 فی سبب خبر میں اور انکو یہ بیماری ہو گئی ہے تاہم بقول مشہور۔ سر۔ اسلی کو پڑنا
 کے یہی قاعدہ درست ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر انہیں عورتیں منکوحہ کو ہو جایا
 کرتی ہے جبکہ بچہ نہ ہو جن اور انکو بھی جو مجروح ہوں۔ یہ بات صاف ظاہر ہے
 کہ شیرخوارہ بچہ کو سوکھ شیرانی مادر کے اور کوئی غذا ایسی موفی نہیں پڑتی کہ
 جسکے کہانی یہ وہ تندرست رہ سکے۔ پس کون ایسی بے رحم ماہو کی کہ انہیں شکم
 کی بیماری بچہ کو بلا کسی وجہ معقول کے کسی اور کا دودھ پلاوے یا کسی اور غذا

حصہ اول

باب اول

انتظام بچوں کا حالت صحت میں

مقالہ اول

خدمات مادری

فقہہ - ۱ - والدہ کو لازم ہے اپنی بچہ کو دودھ پلانا اور اسکی خدمت میں سرور رہنا۔
اسکو بھی خدا کا ایک حکم جانتا چاہئے کہ جتنی تندرست عورات میں دمی اپنی شکم کی
بچہ کو دودھ پلایا کریں کیونکہ دیکھئے کہ جب تک بچہ شکم کے اندر رہتا ہے تو تک وہ
نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن بمجرد تولد ہونے بچہ کے دودھ پیدا ہو کر بہنے لگتا ہے کہ
جس میں کل اجزاء جو بچہ کی پرورش کو لئے چاہئیں موجود ہونے میں اس سے خدا
کریم کا مطلب صاف ظاہر ہو جس میں مطلب کے برخلاف کرنا گو یا خدا تعالیٰ کا حکم

ہو چکی اور ثابت ہو کہ بچہ بیمار ہے تو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اونکا علاج
 مان باپ خود کر سکتے ہیں۔ اور اونکی شناخت رونی اور بلکنی اور تر پی اور رنگ
 بول و براز وغیرہ سے ہو سکتی ہے اور بعض امراض ایسی ہوتی ہیں کہ بدون بلا
 طبیب کے دفع نہیں ہو سکتی۔ اسلئے جو امراض کہ جنکا دفعیہ مان باپ کر سکتی
 ہیں اونکا بیان ایسی طور پر کیا گیا کہ والدین خود کر سکیں۔ اور جنکا دفعیہ بحسن
 علاج حکیم کے نہیں ہو سکتا۔ اونکا بیان صحیح قرابادین صیان کے مبسوط لکھا جائیجہ
 باب سیوم و چہارم میں اونکا ذکر ہے مثلاً میسرے باب میں صرف انہیں بیماریوں
 ذکر ہے جنکا علاج طبیب ہی سے ہو سکتا ہے اور چوتھی میں وہی امراض ہیں جنکا
 تعلق جراثیم سے ہے اور انہیں طبیب کی کچھ بیش نہیں جلتی +

پس اب اہل عقل اور نہر سے یہ عرض ہو کہ بندہ نے جو یہ کتاب نہایت سلیس و
 زبان میں لکھی ہے اور مطلب بندہ کا صرف رفعا ہے تاکہ ہر ایک شخص اپنی اولاد
 کی حالات صحت اور مرض سے بخوبی واقف ہو کر کسی بیماری کی شروع ہوتے ہی
 عین ابتدا میں حکیم کی صلاح لے سکے کیونکہ بچوں کی بیماریاں ایسی ہیں کہ
 اگر بروقت اونکا علاج نہ کیا جاوے تو آن کی آن میں بڑھ جاتی ہیں تو اس آسانی
 اور کم ہمارے دنیو اس علم پر طعنہ زنی نفس راوین کیونکہ عذر بندہ کا ظاہر ہے +

کہ کس عورت کا دودھ مضر صحت ہے اور کس کا نہیں اور کس مقدار تک اور کیونکر
 پلانا چاہیے لکھوں اور اگر حاجت غذا مصنوعی کی ہو تو کس طور پر اس قسم کی غذا
 بچہ کو مفید ہوگی۔ اور ویج کو نسو قواعد میں جسے بچہ والیوں کی صحت قائم رہ سکتی ہے
 اور کتنی دن تک دودھ پلانا چاہیے اور کیونکر چھڑانا چاہیے پھر اگر ماخود دودھ نہ پکے
 اور غیر عورت کو دودھ پلانے کے واسطے نوکر رکھو تو اس دودھ پلائی میں کیا کیا
 وصف کا ہونا ضرور ہے اور جب تک کہ وہ دودھ پلاتی ہے اس پر کیا بات واجب ہے
 بچہ کی حفظ صحت کو واسطے کیسا مکان اور کیسی خدمتگار چاہیں پھر غسل صفائی۔
 پوشاک ہو اور ویج ریاضت بدنی کس طور پر اور کس قدر ہونی چاہیے یہ سب امور
 مفصل بیان کئے جاویں۔ اور دو برس کی عمر سے آٹھ برس کی عمر تک جو جو کچھ کرنا چاہیے
 وہ سب اسی بیان میں شامل ہو بعد ازاں بچہ کی دانت نکلنے کے وقت کیا انتظام
 کرنا چاہیے اس کے بعد تعلیم و تہذیب اخلاق صبیان کا بیان کرنا نہایت ضرور ہے
 کیونکہ اس عمر میں بچہ کی عکس حسنہ بر اثر بدی اور نیکی کا جلد تر ہو جاتا ہے اور
 جو خلق اس وقت پیدا ہوتا ہے وہ موت تک تا وقتکہ بڑی محبت نہ کی جاوے
 جاری رہتا ہے اور اگر غفلت رہی تو ساری عمر وہ بد خلق دفع نہیں ہوتا یہ سب
 درمیان حالت صحت بچہ کے درج کرنی واجب جانکر یہ حصہ بتوفیق خدا پورا کیا او
 جس قدر کوشش بندہ سو ہو سکی انتخاب کتب انگریزیہ اور تجربات حکماء یورپ
 ہند اور اپنی تجربات ہی اسمیں درج کئے بعد ازاں فرض کیا کہ بچہ بیمار ہے تو اول
 اس کا بیان کرنا واجب جانا کہ حالت بیماری میں بچہ کی کیا کیا احتیاط والدین پر واجب
 ہے یہ سب سے مقدم اس امر کا بیان کرنا واجب جانا کہ کس طرح ہر درمیان بیماری اور
 صحت کو تیز کر سکیں۔ ہنری انار جو صحت کے ہیں اور ویج بیمار ہی بہر حال میں
 دونوں کا مقابلہ کر کے اچھی طرح پر شناخت مرض کی بتلائی گئی۔ اب چونکہ شناخت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

حمد ہے اوس خالق کو جس نے بچہ سی جوان اور جوان سی بوڑھا بنایا اور مدار اس حرکت
مدارج عمری کا صحت کو بٹھرایا۔ اور ہر ایک حیوان خصوصاً انسان کے دل میں اولاد
کی محبت ایسی پیدا کی کہ تا وقتیکہ وہ حالت صبا میں ہے اوسکی حفظ صحت اور دفع
مضار میں جہانتک اوسکی مقدور میں ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں پر آجتک کوئی
کتاب اردو میں ایسی نظر نہ آئی جو کہ حاوی حبلہ تجربات اور معالجات اطباء سابق
اور حال کو ہو اور جس سے والدین بھی واقف ہو کر اپنی بچوں کا علاج جو اونکا کر سکی
لائق ہو کر سکیں اسلئے بندہ پیچیدگان رحیم خان نے جو ایک روز دیہان کیا اور
اپنی تجربات کو خیال کیا تو معلوم ہوا کہ ایسی کتاب کا لکھنا نہایت محظور ہے اور یہ
امر تجہی سہرا انجام ہو سیکے گا۔ بناءً علیہ عقل سے ترتیب کتاب کا خوانمان ہوا۔ اس
بندہ کی عقل نے یوں رہبری کی کہ مثل جو انون کے بچہ میں بھی دو حالت ہوتی ہے
ایک حالت صحت اور دوسری حالت مرض۔ پس چونکہ صحت سب سے مقدم ہے اسلئے
پہلے صحت کا بیان کرنا چاہیے۔ اور یہ بتلانا پُر ضرور ہے کہ پیدائش سے لیکر آٹھ برس
کی عمر تک کہ جس ایام کو عہد طفلی بولتی ہیں۔ بچہ کی پرورش کیونکر کرنی چاہیے لہذا
اوسکے بیانات کی یہ تجویز کی کہ سب سے اول دودھ بلانینکی ترکیب اور بیان اس کتاب

نذر

قبلہ و کعبہ بندہ جناب اکر تمیز خان صاحب درس علم طب غیرہ جماعت ہندوستانی
مڈکل کالج کلکتہ دام امتیالہ +

آپ کے احسانات و الطاف بندہ پر حالت صبا سے لیکر آج تک اس قدر ہیں کہ اولاً
شکر یہ کس زبان سے آدا کروں۔ اس کم بضاعتی پر بہت نادم ہوں پر
دل نہ است منزل چین بھی لینے نہیں دیتا۔ ناچار مجھ چند اوراق جو آپ کی استعداد
اور لیاقت کے سامنے بموجب ان اشعار کے مثل خند ریزہ کے ہیں +

لایق بنو قطرہ بجان بردن + خار و خس صحرا بگلستان بردن
اما چه کنم کہ رسم موآن باشد + پای ملخے نزد سلیمان بردن
آج نام نامی سوزین کر کے بطور نذر پیش کرتا ہوں در دل میں خوب جانتا ہوں شحر
این تحفه چنان است بسوی تو کہ آرد خزا بسوی بصرہ و گوہر سوی آن
بر فخر امید قبولیت فی جزات بخشی ہے گزرت قبول افتد زہی عز و شرف +

نیاز مند

رحیم خان

لاہور ۱۰ جنوری ۱۳۳۶ھ

مضمون

صفحہ

۲۶۸ ہنسی کی جوڑ کا اکثر جانا
ایضاً کان کو نہ کسی چیز کا گھس جانا
۲۹۹ خود پر اسبقہ کی سورج کا

بحر حکمت

یہ اختیار مبینہ میں ایک بار لاہور میں چہا کرتا ہے اس میں تو نئے مضامین حکمت کے ہر ایک فن کے درج ہوا کرتے ہیں مثلاً طب جراحی فن قابلہ کسٹری وغیرہ۔ قیمت پستی سالیانہ اسکی مع محصول ڈاک سے روپیہ ہے ۶

اشتہار

کارخانہ بحر حکمت میں کتب مفصلہ ذیل واسطے فروخت کی موجود ہیں جن صاحبوں کو خریداری انکی منظور ہو قیمت نقد ہیجکے منگالین +
 کتاب زچہ اور حاملہ عورتوں کی مع محصول ڈاک ۴
 نقشہ زہر و نکاح کا نقد پر چہا ہوا ایضاً
 ایضاً ایضاً وارنش کیا ہوا ۶

صفحہ

مضمون

مفقاہ ششم
امراض جلدی

۲۸۵	ارسی ہنما۔ انٹر شراچی گو
۲۸۶	ار۔ پی۔ کے۔ ربا۔
ایضاً	اسکی بنز
۲۸۷	کر سٹا۔ کلڈیا
۲۸۸	ہر پس۔ سر۔ سی۔ پی۔ شس
۲۸۹	ٹیٹینا کے۔ پی۔ شس۔ یعنی ہولڈی گو

حصہ چہارم
امراض متعلقہ جراح

۲۹۱	کسی چیز کا ناک کو اندر گھس جانا
۲۹۲	تکسیر
ایضاً	لہبار لب
۲۹۳	ٹنگ۔ ٹامی
ایضاً	کسی چیز کا ہوا کی تالی کو اندر گھس جانا
۲۹۵	کسی چیز کا حلق یعنی مری کو اندر گھس جانا
۲۹۶	کانچ نکلتا
۲۹۷	تی۔ دوش
۲۹۸	ہڈی کا ٹوٹ جانا

مضمون

صفحہ

۲۵۱	امراض معدہ ۲
۲۵۲	بد ہضمی
۲۵۳	جائڈس یعنی یرقان
۲۵۴	ڈا بار یا یعنی اسہال
۲۵۶	ڈمی - سنٹری یعنی جیش
۲۵۸	ٹی - بس - می - سن - ٹریکا
۲۵۹	کیجوی

مقالہ سوم

امراض جدری

۲۶۲	چچک
۲۶۸	چکن - پاکس یعنی ننگوٹی
۲۶۸	می - زلس یعنی گھسرا
۲۷۱	یٹکا دنیا - یعنی ویکسی - نی شین

مقالہ چہارم

۲۷۷	آتشک
-----	------

مقالہ پنجم

امراض چشم

۲۸۲	پیو - ریو - لیت - اقبہال میا
۲۸۴	اسکر افیولس - اقبہال میا

باب دوم

مقالہ اول

امراض آلات تنفس

۲۰۴	بھونکنی پھپھونکنی مختصر شرح
۲۰۵	سکھو - رانی - زرا
۲۰۶	کھل - یعنی زکام
۲۰۸	مرض براکھائی - کش - اول ایکوٹ پیہہ دو قسم کا ہوتا ہے
۲۱۶	مرض نیو - مونیا یعنی ذات الریہ
۲۲۳	مرض پوری - سی - یعنی ذات الجنب
۲۲۴	کروپ
۲۳۵	ہونگ کان یعنی کوکر کھانسی
۲۴۲	بل کی بیماری

حصہ سوم

مقالہ اول

امراض گوا اور دہن

۲۴۶	اسٹومی - ٹامی - ٹش یعنی سوزش دہن
۲۴۹	ٹان - سی - ٹامی - ٹش - یعنی خناق
۲۵۰	ہی - رو - ٹامی - ٹش - یعنی - کن پٹرا

مقالہ دوم

امراض شکم

۱۲۲ تفصیل و تصویل یعنی غسل بہا برا و غیرہ

۱۲۵ مسہلات یعنی جلاب

۱۳۳ حصہ یعنی ان - جبک شن

حصہ سوم

امراض صبیان متعلقہ طبیب

۱۳۵ بچوں کی بیماریوں کی پیدا ہونے کے اسباب

۱۳۶ تشخیص بچوں کی بیماریوں کی

۱۵۳ پیشین گوئی بچوں کی بیماریوں کی یعنی - ہراگ - نوئس

۱۵۶ ترکیب بیماریوں کے امتحان کرینکی

باب اول

امراض دماغ و اعصاب

۱۶۶ ام الصبیان یعنی بیان کنواشن کا

۱۶۱ کن جنش جن - افدی - برین - یعنی دماغ میں غم کا جمع ہونا

۱۶۶ اکیوٹ - ٹائیڈرو کفلس

۱۶۱ اسپورٹس - ٹائیڈرو کفلس

۱۵۹ کرائنگ ٹائیڈرو کفلس میں سر کا اندر پانی بہ جانا

۱۹۳ صرع یعنی مگی

۱۹۳ کوریا یعنی عرشہ

۱۶۶ پی - را - لی - سس یعنی فالج

۲۰۲ فرغ النور یعنی رات کو ڈر جانا اگر ذی بین میں اس میں کونایت ٹی - رس ہو تو بین

صفحہ	مضمون
	مقالہ اول
۵۸	احتیاط والدین امراض صبیان میں
	مقالہ دوم
۶۳	آثار امراض الصبیان
۶۳	فقہہ - ۱ - آثار صحت صبیان
۶۴	فقہہ - ۲ - آثار مرض
	حصہ دوم
۷۶	قرابادین صبیان
۷۷	نفسہ خوراک ادویات
۸۱	سیما ب
۸۵	ادویات مسکن یعنی سی - ڈی - ٹیو - دوا
۹۱	کہار دوائیں یعنی الکلی
۹۳	ادویات قاطع ریح یعنی - کار - می - فی - ٹیو
۹۶	مفرحات یعنی اسٹی - سیولنٹ دوائیں
۹۸	ادویات مقوی یعنی ٹانک دوائیں
۱۰۴	تقیہ واسطی رفع انفادیشن یعنی سوزش کے اول خون کا نکالنا
۱۰۸	بلستر یعنی ادویات آبلہ انگیز
۱۱۳	ادویات مقنی یعنی - امی - ٹک - دوائیں
۱۲۰	ایضاً سرق یعنی - ڈایا - فورٹیک دوائیں
۱۲۱	ایضاً ... بارد - زفری - جی - رنٹ - دوائیں

مضمون

صفحہ

فقہ - ۱ - تعریف مرصعہ یعنی دائمی دودہ پلائی کی ۴۱

فقہ - ۳ - چند اشارات در باب دائمی دودہ پلائی کو ۴۵

مقالہ سیوم

غذا مصنوعی واسطی بچوں کے ۴۷

مقالہ چہارم

- عام انتظام بچہ نکادوس سال کی عمر تک در دوسرے آٹھویں تک

فقہ - ۱ - بچہ کی خدمت گزار اور مکانی تعریف ۴۳

بچہ کی کہلائی ۴۴

فقہ - ۳ - سونا پیدایش سو دو برس کی عمر تک ۴۶

فقہ - ۴ - غسل اور صفائی ۴۷

فقہ - ۴ - پوشاک ۴۹

فقہ - ۵ - ہوا خوری اور ریاضت بدنی ۵۰

مقالہ پنجم

انتظام بچوں کا دانت اگلنے وقت

فقہ - ۱ - دودہ کے دانت ۴۳

فقہ - ۳ - بچے کے دانت ۴۹

مقالہ ششم

تعلیم و تہذیب صبیان ۵۱

باب دوم

انتظام بچہ نکاحات بیماری میں

فہرست

کتاب امراض البیان

صفحہ	مضمون
۵	فقہہ - ۱ - والدہ کو لازم ہے اپنی بچہ کو دودھ پلانا اور اسکی خدمت میں مصروف ہونا۔
۸	فقہہ - ۳ - جن بچہ دالید نکود دودھ نہ پلانا چاہی اور نگاہ بیان
۹	فقہہ - ۳ - قواعد بچہ کو دودھ پلانے کے
۱۳	مسنوعی غذا کے تیار کرنے کی ترکیب
۱۳	ایضاً..... ایضاً..... استعمال کر سکی ترکیب
۱۳	فقہہ - ۳ - قواعد واسطی صحت بچہ والی کے
۱۷	فقہہ - ۵ - زیادہ دن تک دودھ پلانی بچہ اور بچہ والی دونوں کا نقصان ہے
۱۹	فقہہ - ۶ - دودھ بڑھائی یعنی دودھ چھڑانا بچہ کا
	مقالہ دوم
	خدمت دہائی دودھ بڑھائی کی

RJ
390
R33
1881



اس کتاب کو سرشتہ یونیورسٹی کالج یعنی دارالعلم بلجواب نے خرید کر
اپنی طرف سے واسطے فایده عام اہل طب و غیرہ کے شایع کیا

Rahim Khan, Karan Bahadur

امراض الصبا

Amraz al-sibyan
مولفہ

رحیم خان - جی - ام - سی - بی
سب ہسٹریجن

سابق ماوس - فی - زسی - شین - ڈیکل کلج کلکتہ

حال

سپرٹنڈنٹ

و
درس علم طب و غیرہ جماعت ہندوستانی ڈیکل کلج کلکتہ

مہتمم اخبار بحر حکمت

در مطبع محمدی باہتمام محمد بخش طبع شد ۱۲۸۶ھ

RJ
390
R33
1881

Raheem Khan, Khan Bahadur
Amraz al-sibyan

BioMed

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
